

本草衍義

四

善甲



嘉祐本草石蜜收蟲魚部中又見果部新華取蘇恭說直將石字不用石蜜旣自有本條煎練亦自有法今人謂之乳糖則蟲部石蜜自是差誤不當更言石蜜也本經以謂白如膏者良由是知石蜜字乃白蜜字無疑去古既遠亦文字傳寫之誤故今人尚言白沙蜜蓋經久則陳白而沙新收者惟稀而黃次條蜜蠟故須別立目蓋是蜜之房政治亦別至如白蠟又附于蜜蠟之下此又誤矣本是續上文叙蜜蠟之用及注所出州土不當更分之爲二何者白蠟本條中蓋不言性味止是言其色白爾旣有黃白二色今止言白蠟是取蠟之精者首尾盡蜜直置而不言黃則蠟陳白則蠟新亦是蜜耳陳蠟取新也唐注云除蜜字爲佳今詳之蜜字不可除除之即不顯蠟自何處來山蜜多石中或古木中者經二三年或一得而取之氣味醇厚人家糞櫈中蓄養者則一歲春秋二取之取之旣數則蜜居房中日少氣味不足所以不逮陳白者日月足也雖收之纔過夏亦駁壞若籠於井中近水處則免湯火傷塗之痛止仍擣薙白相和雖無毒多食亦生諸風

牡蠣須燒爲粉用兼以麻黃根等分同搗研爲極細末粉盜汗及陰汗本方使生者則自從本方左顧經中本不言止從陶隱居說其酉陽雜俎已言牡蠣言牡非爲雄也且如牡丹豈可更有牡丹也今則合於地人面白半位以牡蠣頂向子視之口口在左者爲左顧此物若

無目如此焉得更有顧盼也

自採者眞市中所售者恐不得盡皆桑中者蜀本圖經浸炮之法不若略蒸過爲佳隣家有一男子小便日數十次如稠米泔色亦白心神恍惚瘦瘠食減以女勞得之令服此桑螵蛸散未終一劑而愈安神魂定心志治健忘小便數補心氣桑螵蛸遠志菖蒲龍骨參茯神當歸龜甲醋炙已上各一兩爲末夜卧人參湯調下二錢如無桑上者即用餘者仍須以炙桑白皮佐之量多少可也蓋桑白皮行水意以接螵蛸就腎經用桑螵蛸之意如此然治男女虛損益精陰痿夢失精遺溺疝瘕小便白濁腎衰不可闕也

東坡器所說是今海中無鷓鴣有食蛤糞出老若蛤殼中有肉時尚可食肉既無焉得更有糞中過數多者必爲其皆無廉稜乃有是說殊不知風浪日夕淘汰故如是治傷寒汙不溜搐却手腳海蛤川烏頭各一兩川山甲二兩爲末酒糊爲丸大一寸許捏褊置所患足心下擘葱白蓋藥以帛纏定於暖室中取熱水浸脚至膝上久則水溫又添熱水候遍身汗出爲度凡一二日一次浸脚以知爲度

宋明經云味鹹即是肉也人採肉以供饌及乾致都下北人遂爲珍味肉與殼兩可用方家宜審用之然皆治目殼研水飛點磨外障瞖聳萊州甚多

靈珠小兒羸熱中多用河北塘潔中亦有圍及寸者色多微紅珠母與廉州珠母不相類但清水急流數粒

色光白水濁及不流處其色暗餘如經

即生於秦若秦地山中多老龜極大而壽龜甲即
非止秦地有四方皆有之但取秦地所出大者爲勝今
河北獨流釣臺甚多取龜筒治療亦入衆藥止此二種
各逐本條以其靈於物方家故用以補心然甚有驗
鑑道治心經風熱生者入藥蓋性味全也旣入湯火中
即不堪用爲器物者是矣與生孰乖其義同

鯉魚至陰之物也其鱗故三十六陰極則陽復所以素
問曰魚熱中王叔和曰熱即生風食之所以多發風熱
諸家所解並不言日華子云鯉魚涼今不取直取素問
爲正萬一風家更使食魚則是貽禍無窮矣

今人謂之黑鯉魚道家以謂頭有星爲厭世有知
之者往往不敢食又發故疾亦須忌爾今用之療病亦
止取其一端耳

形少類獺有四足腹重墜如囊身微紫色嘗剖之
中有二小鱗又有四五小石塊如指面許小魚五七枚
然無鱗與鮀鮀相類今未見用者

鱗腹下黃世謂之黃鱗此尤動風氣多食令人霍亂
嘔見之向在京師鄰舍一郎官因食黃鱗遂致霍亂吐
利幾至委頓又有白鱗稍麤大色白二者皆亡鱗大者
長尺餘其形類蛇但不能陸行然皆動風江陵府西有
湖曰西湖每歲夏秋沮河水漲即湖水滿溢冬即復涸
土人於乾土下掘得之每及二三尺則有往來蟬行土
路中有泥水水涸又下水至復出

開其腹內藥燒之治齒

鵝皮取乾皮兼刺用刺作刑治紩帛絕佳此物兼治胃逆開胃氣有功從虫從胃有理焉膽治鷹食病世有養者去而復來久亦不去當縮身藏足之時人溺之即開合穿山甲等分燒存性治痔入肉豆蔻一半末之空肚熟米飲調二錢服隱居所說跳入虎耳及仰腹受啄之事唐本注見擯亦當然

金龍子蜥蜴也今人但呼爲蜴蜥大者長七八寸身有金碧色仁廟朝有一蜥蜴在右掖門西藩溝廟中此真是蜥蜴也鄭狀元有詩有樵者於澗下行見一蜥蜴自石罅中出飲水訖而入良久凡百十次尚不已樵者疑小免罿石覘之有水雹一二升樵人訝而去行方三五

至大雨至良久風雹暴作全之州縣依法用此祈雨經云治五癃破石淋利水道亦此義乎

露蜂房有兩種一種小而其色淡黃巢長六七寸至一尺者闊二三寸如蟹脾下垂一邊是房多在叢木鬱翳之中世謂之牛舌蜂又一種或在高木上或屋之下外作固如三四斗許小者亦一二斗中有巢如瓠之狀由此得名蜂色赤黃其形大於諸蜂世謂之玄瓠蜂蜀本圖經言十一月十二月採者應避生息之時也今人用露蜂房兼用此兩種

鵝鶴東西京界尤多形類蠶蛾但頭足微黑翅兩重外一重灰色下一重深紅五色皆具腹大此即樓雞也今人又用之行瘀血月閉

夏月身與聲皆大者是始終一般聲仍皆乘昏夜方出土中昇高處背殼坼蟬出所以皆夜出者一以暑人二畏日衆乾其殼而不能蛻也至時寒則墜地小兒糞之雖數日亦不須食古人以謂飲風露信有之蓋不糞而溺亦可見矣西川有蟬花乃是蟬在殼中不出而化爲花自項中出又殼治目腎翳又水煎殼汁治小兒出瘡癰不快甚良

白僵蠍然蠍有兩三番惟頭番僵蠍最佳大而無蛆治小兒驚風白僵蠍蝎梢等分天雄尖附子尖共一錢微炮過爲細末每服一字或半錢以生薑溫水調嚥之其蟬蟬則第二番者以其敏於生育

大小有三種蟹蠍今人多用之大如蜜蜂瘦凹褊俗名黃綠色雄蟲州順安軍洪塘灘界河甚多以其惟食牛馬等血故治瘀血血閉

此蟲諸葛木根下有之構木津甘故根下多有此蟲其木身未有完者亦有生於糞土中者雖肥大但肉中黑不若木中者雖瘦而稍白生研水絞汁瀝漬飲之

此物矣蛤蝓其身肉止一段蝎牛背上別名蛤蝓蝎牛二物矣蛤蝓其身肉止一段蝎牛背上別名蛤蝓蝎牛二物矣若爲一物經中焉得分爲二條也其治瘉亦大同小異故知別類又謂蛤蝓是蝎牛之老者甚無謂蛤蝓有二角蝎牛四角兼背有附殼肉蟲等爲一物也

陳藏器曰華子所說備矣大者京師又謂之馬鱗
服薑者謂之馬黃畏鹽然治傷折有功經與注皆不言
脩製宜子細不可忽也今人用者皆炒

醫忌九肋者佳煮熟者不如生得者仍以釀醋炙黃色
用經中不言治勞惟蜀本藥性論云治勞瘦除骨熱後
人遂用之然甚有據亦不可過剝頭血塗脫肛又燒頭
灰亦治

烏頭乾置四方久食之又取骨鏤爲鉏研細水飛
澄下比去水日乾之熟蜜和得所點目中翳緩取效
伊洛絕少今多自京師來京師亦自河北置之今河
北沿邊滄瀛州等處所出甚多徐州亦有但不及河北
一、九解臚以蟹并白及蠣搗塗顛上臚含此物極動
風體有風疾人不可食屢見其事河北人取之當八九
月解浪之時直於塘灘岸上伺其出水而拾之又夜則
以燈火照捕始得之時黃與白滿殼凡收藏十數日不
死亦不食此物每至夏末秋初則如蟬蛻解當日名蠅
之意必取此義

原蠅蠅有原復敏速之義此則第二番蛾也白蠅蠅條
中已具采餉牛代穀又以三升醇酒拌蠅屎五斗用瓶
蒸熟於暖室中鋪於油單上令患風冷氣閉及近感癱
風人就所患一邊卧看溫熱罩蓋覆汗出爲度若虛人
須常在左右防大熱昏冒仍令頭面在外不得壅覆未
全愈間再作

蠅退治婦人血風此則眠起時所蛻皮是也其蠅退紙

謂之蠶蠶連亦燒灰用之治婦人血露

生剖曬乾取少許火上微炙候油出塗白乳
以指擦之即時色轉凡如此五七次用即愈仍先於白
廸微微擦動

沙魚皮一等形稍異今人取皮飾鞍劍餘如經
而經言無毒此魚實有大毒味雖珍脩治不如法
食之殺人不可不謹也厚生者不食亦好蘇子美云河
狹于此時貴不數魚蝦此即詩家鄙諷之言未足全信
也然此物多怒觸之則怒氣滿腹飄浮水上漁人就以
物擦之遂為人獲橄欖并蘆根汁解其毒

紫金大二三寸背上深紫有點但黑本經以此燒存性

點眼藥

鵝脣益肝腎補五臟和腸胃食之宜人不甚發病宜然
張翰思之也

多在人家渠塹下大腹品類中最大者是遇陰雨
或昏夜即出食取眉間有白汁謂之蟾酥以油單裹眉
裂之酥出單上入藥用有人病齒縫中血出以紙紝子
蘸乾蟾酥少許於血出處按之立止世人收三足枯
蟾以罔衆但以水沃半日盡見其偽蓋本無三足者
謂其色青腹細觜尖後腳長故善躍大其聲則曰蛙
小其聲則曰蛤月令所謂雀入大水化為蛤者也唐韓
退之詩一夜青蛙啼到曉若是此食之性平解勞熱
蛤粉補肺虛勞嗽有功治久嗽不愈肺間積虛熱久則
成瘡故嗽出膿血暎久不止喉中氣塞冒膈噎痛蛤

阿膠生犀角鹿角膠羚羊角各一兩除膠外皆爲膏次
入膠分四服每服用河水三升於銀石器中慢火熬至
半升濾去滓臨卧微溫細呷其滓候服盡再搘都作
一服以水三升煎至半升如前服若病人久虛不喜水
當沸減水張刑部子皇病極困樞密况送此方遂愈

錢鯉甲沉山而居亦能水燒一兩存性肉荳蔻仁二箇
同爲末米飲調二錢服治氣痔膿血甚者加蠅皮一兩
燒入中病即已不必盡劑

蘇耽品亦多皆有毒經不言用是何種今人多用人家
簷角籬頭陋巷之間空中作圓網大腹深灰色者遺尿
着人作瘡癬

以上中一種最大京師名爲馬大頭者是身綠色

周易一遭碧色用則當用雄者陶隱居以謂青色大

眼一類之中元無青者眼一類皆大此物生化於水中
故多飛水上唐杜甫云點水蜻蜓款款飛
金匱謂之爲草則繆矣經言肉解結氣注中更辨不定
此物在處有附生水中石上作絲蠶如釵股長寸許以
蔽其身色如泥蠶在其中此所以謂之石蠶也今方案
用者絕稀此亦水中虫耳山河中多

從口齦退出眼睛亦退今含眼藥多用取此義也
入藥洗淨

本草椎破中間有如自然銅者佳治心悸動火燒赤酒
至酥二兩朱砂一兩與蛇黃同研水飛天麻二兩別
爲末與前一朱令日服以半錢少以薄荷湯調食後夜

卧服殊効

今方書往往不見用

鳥蛇尾細長能穿小銅錢一百文者佳有身長一丈餘者蛇類中此蛇入藥最多嘗於順安軍塘灘堤上見一烏蛇長一丈餘有鼠狼齒蛇頭曳之而去是亦相畏伏爾市者多爲以佗蛇燻黑色貨之不可不察也烏蛇脊高世謂之劍脊烏梢

白蛇諸蛇鼻向下獨此蛇鼻向上背有方勝花紋以此得名用之去頭尾換酒浸三日棄酒不用火炙仍盡去皮骨此物毒甚不可不防也

蠍蛇背光黑綠色足赤腹下黃有中其毒者以烏雞屎調調塗咬處效大蒜塗之亦效復能治丹毒瘤蠍蛇

一作乾者白蠍昆子大雷丸一箇百步一錢秤同爲末醋調塗之又畏蛤蝓不敢過所行之路觸其身則蛤蝓死人故取以治蛤蝓蛇桑汁白鹽亦效

馬陸即今百節虫也身如檣筋節有細蹙紋起紫黑色光潤自足死則側卧如環長二三寸尤者麤如小指西京上陽宮及內城博牆中甚多入藥至鮮

鰐蛇一作蝮諸家所論備矣然終不敢捨詩之意嘗析窠而視之果有子如半粟米大其色白而微黃所負虫亦在其中乃青菜虫却在子下不與虫相着又非葉虫及草上青虫應是諸虫皆可也陶隱居所說近之矣人取此房研細醋調塗蜂蠶

蠍多在棘枝上故又名棘剛子研其間虫汁唯小兒治驚癇

鴟蠭此濕生虫也多足其色如蚓背有橫紋蹙起大者

長三四分在廁有之博龜及下濕處多用廁絕少

螢常在大暑前後飛出是得大火之氣而化故如此明照也今人用者少月令雖曰腐草所化然非陰濕處終無也身有厚粉手擣之則落亦噉毳衣用處亦少其形稍似魚其尾又分二歧壯用以滅瘢痕

白蘋自死者良然亦應候而鳴此物有毒昔有病腹大夜聞蚯蚓鳴於身有人教用鹽水浸之而愈崇寧末年隴州兵士暑月中在猝廳前跣立廳下爲蚯蚓所中遂不救後數日又有人被其毒博識者教以先飲鹽与一五次以鹽湯浸足乃愈今入藥當上

牽蠻風下症病不可闕也仍須鹽湯送王荆公所謂牽蠻太牢俱有味可能蚯蚓獨清廉者也

蟻此蟲當立夏後至夜則鳴月令謂之螻蟻鳴者是矣其聲如蚯蚓此乃是五伎而無一長者

蛻蠅大小二種一種大者爲胡蛻蠅身黑光腹翼下有小黃子附母而飛行晝不出夜方飛出至人家庭戶中見燈光則來一種小者身黑暗晝方飛出夜不出今當用胡蛻蠅其小者研二十枚以水嚥牛馬治脹結絕佳亦遇而必盡食之

蠶須糯米中炒米黃爲度姪身人不可服爲能潰人肉治淋藥多用極苦人尤宜斟酌下條羌青其用與此不相遠故附于此

馬刀京師謂之煩岸春夏人多食然發風變性微冷又順安軍界河中亦出蟻大底與馬刀相類內頗澹人作魚以寄隣方又不能致遠亦發風此等皆不可多食今蛤粉皆此等衆蛤灰也

貝子今謂之貝齒亦如紫貝但長寸餘故曰貝子色微白有深紫黑者治目中翳燒用北人用之檀帽上爲飾及綴衣或作蹀躞下垂

甲香善能管香煙與沉檀龍麝用之甚佳

蝎大人小兒通用治小兒驚風不可闕也有用全者有只用梢者梢力尤功今青州山中石下捕得慢火逼或

口中噙蝎渴熱時乃與青泥食之既滿復以火逼殺其色多赤欲其體重而售之故也醫家用之皆悉

卷之二十一
金匱人還能禁止之自嘗被其毒凡長禁而止及令故蟄終不痛翰林禁科具矣

田靈脂行經血有功不能生血嘗有人病眼中翳往來不定如此乃是血所病也蓋心生血肝藏血肝受血則能視目病不治血爲督理此物入肝最速一法五靈脂一兩沒藥一兩乳香半兩川烏頭一兩半炮去皮同爲末滴水丸如彈子大每用一丸生薑溫酒磨服治風冷氣血閉手足身體疼痛冷麻又有人被毒蛇所傷良父之間已昏困有老僧以酒調藥二錢囁之遂蘇及以藥滓塗咬處良久復囁二錢其苦皆去問之乃五靈脂一兩雄黃半兩同爲末止此耳後有中毒者用之無不驗此藥雖不甚貴然亦多有僞者

本草衍義卷之十八

草豆蔻也氣味極辛微香此是對肉豆蔻而名之若作果則味不和不知前人之意編入果部有何意義美微苦必爲能消酒毒故爲果花乾則色淡紫

蜀國先朝西夏持師子來獻使人兼貢葡萄遺州郡比中國者皆相似最難乾不乾不可收仍酸漸不可食李白所謂胡人歲獻葡萄酒者是此瘡疤不出食之盡出多食皆昏人眼波斯國所出大者如雞卵非覆盆也自別是一種雖枯敗而枝梗不散今人不見用此即賈山策中所言者是此

長條四五月紅熟秦州甚多永興華州亦有及

人採來賣其味酸甘外如荔枝櫻桃亦軟紅可變失採則就枝生蛆益腎藏縮便服之當覆其器如此取名食之多熟取時五六分熟便可採烈日曝仍須薄綿蒙之今人取汁作煎爲果仍少加蜜或熬爲稀湯點服治肺寒痰挾時暑水則不堪煎

今先青州次晉州此二等可曝入藥益脾胃爲佳餘止可充食用又御棗甘美輕脆後衆棗熟以其甘故多生虫今人所謂擗落酥者是又有牙棗先衆棗熟亦甘美但微酸尖長此二等止堪嚼不堪收曝今

將乾棗去核於鑄鍋中微火緩逼乾爲末量多少入生薑末爲湯點服調和胃氣又將煮棗肉和治脾胃丸施尤佳人青州棗去皮核焙乾爲棗圈達都下爲奇果

今天下皆有之河北弘塘灤居人採得春去皮
搗入爲粉蒸潔作餅可以代糧食多不益脾胃氣兼難
消化

鶴子就蓬中乾者爲石蓮子取其肉於砂盆中乾擦去
浮上赤色留青心爲末少入龍腦爲湯點寧心志清神
然亦有粉紅千葉白千葉者皆不實如此是有四等也
其根惟白蓮爲佳今禁中又生碧蓮亦一瑞也

今世俗謂之菱角所在有煮熟取仁食之代粮不益
脾又有水菱亦芰也但大而脆可生食和合治療未聞
其用有人食生芰多則利及難化是亦性冷

欲乾莫如曝欲生收莫如潤沙中藏至春末夏初尚
有小兒不可多食生者難化熟即帶氣隔食生

滯其氣爾湖北路有一種栗頂圓末尖謂之旋栗圖
經引詩言莘音榛栗者謂其象形也

孟詵以爲櫻非桃類然非桃類蓋其以形肖桃故
曰櫻桃又何疑焉謂如木猴梨葫桃之類亦取其形相
似尔古謂之吟桃可薦宗廟禮云先薦寢廟者是此唐
王維詩云纔是寢園春薦非干御苑鳥嚮殘小兒食之
纔過多無不作熱此果在三月末四月初間孰得正陽
之氣先諸果熟性故熱今西洛一種紫櫻至熟時正紫
色皮裏間有細碎黃點此最珍也今亦上供朝廷藥中
不甚須

自是兩種故曰一名橘皮是元無抽字也豈有橘

等之物而治療無一字別者即知柚字爲誤後人不深求其意謂柚字所惑妄生分別亦以過矣且青橘與黃橘治療尚別矧柚爲別種也郭璞云柚似橙而大於橘此即是識橘柚者也今若不如此言之恐後世亦以柚皮爲橘皮是貽無窮之患矣去古既遠後之賢者亦可以意逆之耳橘惟用皮與核皮天下甚所須也仍湯浸去穰餘如經與注核皮二者須自收爲佳有人患氣嗽將朞或教以橘皮生薑焙乾神麴等分爲末丸桐子大食後夜卧米飲服三十九兼舊患膀胱緣服此偕愈然亦取其陳皮入藥此六陳中一陳也腎疰腰痛膀胱氣痛微炒核去殼爲末酒調服愈

橘子皮今人止以爲果或取皮合湯待賓未見入藥宿酒未醒食之速醒

橘實食梅則津液泄水主末也津液泄故傷齒腎屬水外爲齒故也王叔和曰膀胱腎合爲津慶此語雖鄙然理存焉燻之爲烏梅曝乾藏密器中爲白梅

琵琶江東西湖南北二川皆有之以其形如琵琶故名之治肺熱嗽有功花白最先春也子大如彈丸四五月熟色若黃杏微有毛肉薄性亦平與葉不同有婦人連肺熱久嗽身如炙肌瘦將成肺勞以枇杷葉木通

冬化紫苑杏仁桑白皮各等分大黃減半各如常製訖同爲末蜜丸如櫻桃大食後夜卧各噙化一丸未絳劑而愈

有着蓋柿於帶下別生一重又牛心柿如牛之心蕊餅柿如今之市買蒸餅華州有一等朱柿比諸品中最深紅色又一種塔柿亦大於諸柿性皆涼不至大寒食之引痰極甘故如是去皮掛大木株上使風日中自乾食之多動風火乾者味不佳生則澁以溫水養之需澁去可食遠至自然紅爛澁亦自去乾則性平

木瓜得木之正故入筋以鉉霜塗之則失醋味受金之制故如是今人多取西京大木瓜爲佳其味和美至熟青白色入藥絕有功勝宣肺者味淡此物入肝故益

卷之三十一

八

腰腎腳膝無力此物不可闕也

桔梗今川廣湖南北二浙江東西皆有自八九月已堪食收至三四月方酸壞石蜜沙糖糖霜皆自此出惟川浙者爲勝

川浙最佳其味厚其他次之煎煉成以鉗象物達京都至夏月及久陰雨多自消化土人先以竹葉及紙裹外用石灰埋之仍不得見風遂免今人謂乳糖其作餅黃白色者今人又謂之捻糖易消化入藥至少

沙糖又次石蜜蔗汁清故費煎煉致紫黑色治心肺大腸熱兼噉駝馬今醫家治暑熱多以此物爲先導川浙多食則損齒土制水也及生蟻虫裸虫屬土故因甘遂生所在有之江浙二川者最大而長京洛者差圓小方

惟東西京者佳他處味不及也當心出苗者爲芋頭乃邊附芋頭而生者爲羊子八九月已後可食至時掘出置數日却以好土勻埋至春猶好生則辛而涎多食滯不困脾唐杜甫詩曰園收芋栗不全貧者是此以梗

擗蚌熬處愈

今人謂之勒臍皮厚色黑肉硬白者謂之猪勒臍皮薄澤色淡紫肉軟者謂之羊勒臍正二月人採食之此一等藥罕用荒歲人多採以充糧

藥品中今未見用惟崔元亮方中收之果實中爲上品多食亦令人發虛熱此物喜雙實尤可愛宋朝有蔡君謨荔枝譜其說甚詳唐杜牧詩云一騎紅塵妃子笑無車口是荔枝來此是川蜀荔枝亦可生置之長安七以核燒火中燒存性爲末新酒調一枚末服治心痛及小腸氣

大傷人量所傷大小爛嚼沃破處以帛繫定至差無苦又湯去皮研一升以水一升半翻復絞取稠汁入生蜜四兩甘草一莖約一錢銀石器中慢火熬成稀膏羹器盛食後夜卧入少酥沸湯點一匙匕服治肺燥喘熱大腸祕潤澤五藏如無上證更入鹽點尤佳

李寶本經別無治療日華子言多食傷神有數種皆熱小兒尤不可食多致瘡癰及上鬲熱勝蓄爲乾果其深赭色核大而褊者爲金杏此等須接其他皆不逮也如山杏輩只可收仁又有白杏至熟色青白或微黃其味甘淡而不酸

赤點斑而光如塗油山中一種正是月令中桃始華者但花多子少不堪啜惟堪取仁唐文選謂山桃發紅華者是矣又太原有金桃色深黃西京有崑崙桃肉深紫紅色比二種尤甘又餅子桃如今之香餅子如此數種入藥惟以山中自生者爲正蓋取走泄爲用不取肥好者如傷寒八九日間發熱如狂不解小腹痛有瘀血用桃仁三十箇湯去皮尖炒川大黃一兩同爲末再與桃仁同擣令匀煉蜜丸如小豆大每服二十丸桃仁湯下利血惡物便愈未利再服

今永興軍南山甚多食之解實熱過多則令人血崩血惡物便愈未利再服

胡桃發風陝洛之間甚多外有青皮包之胡桃乃核也核中穰爲胡桃肉雖如此說用時須以湯剝去肉上薄皮過夏至則不堪食有人患酒癥風臯上赤將橘子核子枝條柔弱高二三丈多附木而生淺山傍道則有存者深山則多爲猴所食

以知爲度

胡桃其窠大者高及丈余醫家少用實含漿水食令人霍亂澁氣而然今畿內小窯鎮一種最佳堪入貢又有御李子如櫻桃許大紅黃色先諸李熟此李品甚多然天下皆有之所以比賢士大夫盛德及天下者如此

李無處不芬芳也別本注云有野李味苦名郁李子仁入藥此自是郁李仁別是一種在木部第十四卷著野李也

食則動脾少則不及功用梨之意須當斟酌惟病酒頹渴人食之甚佳終不能却疾

西洛甚多亦梨之類也其狀亦梨先諸梨熟七八前後已堪嚼色黃如鵝梨纔熟便鬆軟入藥絕稀用枝甚多秋後經雨則自坼列道家謂之三尸酒云二尸得此果則醉河陰縣最多又有一種子白瑩澈如水詰者味亦甘謂之水晶石榴惟酸石榴皮合斷下藥仍須二斤告及枝之陳久者佳饑火大爲末以燒粟米飯爲

寒滑加附子赤石脂各一倍

味澀食久則甘嚼汁嚥治魚鱠

食之須淨去上浮毛不爾損人肺花亦香白色諸果中惟此多生虫少有不艸者圖經言欲卧噉一兩枝而寢如此恐太多痞塞胃脘

本草衍義卷二十九

瓜子
宴冬瓜仁也服食中亦稀用

一二斗許大冬月收爲菜壓去汁蜜煎代果串
發物及一切癰疽削一大塊置瘡上熱則易之分敗熱
毒氣甚良

此即甜瓜蒂也去瓜皮用蒂約半寸許曝極乾不
很多少爲細末量疾每用一二錢匕膩粉一錢匕以水
半合同調勻灌之治風涎暴作氣塞倒卧服之良久涎
自出或覺有涎用諸藥行化不下但如此服涎即出或
服藥良久涎未出含沙糖一塊下咽即涎出此物甚不
貴又全勝石碌硝砂輩

夏月服之求未中暑氣多食未有不下利者資下
多食至秋作痢爲難治爲其消損陽氣故也亦可以
如白冬瓜煎漬收

冬葵子
葵菜子也四方皆有而性滑利不益人患癰疽
毒熱內攻未出膿者水吞三五枚遂作竅膿出

蜀葵
四時取紅單葉者根陰乾治帶下排膿血惡物極
有驗

蜀葵子也與蜀葵別種非爲蜀葵中黃者也葉心下有
紫檀色摘之剔爲數剗就日乾之不爾即浥爛瘡家爲
要藥子臨產時取四十九粒研爛用溫水調服良久產
競實入藥亦稀苗又謂之人見人多食之莖高而葉紅
黃二色者謂之紅人見可淹菜用

繫桑
四方皆有在北道則南方則冬夏常

青此月令小滿節後所謂苦菜秀者是此葉如苦苣更
狹其綠色差淡折之白乳汁出常常點痕子自落味苦
花與野菊相似春夏秋皆旋開花去中熱安心神

醫言今菜中惟此自初生便堪生嚼四方皆有多食者
人眼蛇亦畏之虫入耳以汁滴耳中虫出諸虫不敢食
其葉以其心置耳中留虫出路虫亦出有人自長立禁
此一物不敢食至老目不昏苦苣擣汁傳于瘡殊驗青
苗陰乾以備冬月爲末水調傅亦可

醫書蘆菔二菜也蘆菔即蘿菔也蕪菁今世俗謂之蔓
菁夏則枯當此之時蔬圃中復種之謂之雞毛菜食心
止在春時諸菜之中有益無損於世有功採擗之餘收
而由良過食動氣河東太原所出極大他處不及也
複從爾雅爲正

爾雅根即前條所謂蘆菔今人止謂之蘿菔河北甚多
薑萊亦好服地黃何首烏人食之則令人鬚髮白世皆
言草木中惟此下氣速者爲其辛也不然如生薑芥子
又辛也何止能散而已薑菔辛而又甘故能散緩而又
下氣速也散氣用生薑下氣用薑菔

本草張仲景傷寒論凡用甘草皆禁菘菜者是此菘菜
也葉如蕪菁綠色差淡其味微苦葉嫩稍閱不益中虛
人食之覺冷

五松葉上紋皺起色尤深綠爲異子與苗皆辛

九其多食動風一品紫芥與此無異紫色可愛人多食
然亦動風又白芥子比諸芥稍大其色白入藥用
唐李白詩云天馬常嚙苜蓿花是此陝西甚多翁
牛馬嫩時人兼食之微甘淡不可多食利大小腸有宿
根刈訖又生

蘿蔔卽神農本經第十一卷中水蓼之子也彼言蓼則
用莖此言實卽用子故此復論子之功效分爲二條春
初以葫蘆盛水浸濕高掛於火上晝夜使煖遂生紅芽
取以爲蔬以備五辛盤又一種水紅與此相類但苗莖
高及丈取子微炒碾爲細末薄酒調二三錢服治癰癧
入創効效則已

薑亦生名葱針至夏則有花於秋月植作高溝壠
壅起以備冬用曰冬葱其實一也又有龍角葱每莖
上出歧如角皮赤者名樓葱可煎湯涼下部子皆辛色
黑有皺紋作三瓣此物大底以發散爲功多食昏人神
經葉如金燈葉差狹而更光故古人言薤露者以其光
滑難近之義千金治肺氣喘急用薤白亦取其滑潤也
與蜜同搗塗湯火傷效甚速

明春食則香夏食則臭多食則昏神子止精滑甚良未
出糞土爲韭黃最不益人食之則滯氣蓋吟嚼鬱之
氣故如是孔子曰不時不食正爲此輩花食之動風
白蘿蔔八九月間淹貯之以備冬月作蔬果治療只用

生者

鹽此紫蘇也背面皆紫者佳其味微辛甘能散其氣香

今人朝暮湯其汁飲爲無益醫家以謂芳草致蒙翳著此有一焉脾胃寒人飲之多泄滑往往不覺手治肺氣喘急

氣味與紫蘇不同辛而不和然一如蘇但面不紫及周圍槎牙如鴈齒香少

荆芥也只用穗治產後血暈及中風目帶上四肢強直爲末二三錢童子小便一小盞謂下嚥良久即活甚有驗又治頭目風荆芥穗細辛川芎等爲末飯後湯點一錢風搔遍身濃煎湯淋涼或坐湯中

荆芥生山野荆湖南北二川皆有兩京作圃種暑月亦鍊菜治霍亂不可闕也用之無不効葉如茵陳花蕎在一毫成穗凡四五十房爲一穗如荆芥穗別是

香餚如經

薄荷出謂之南薄荷爲有一種龍腦薄荷故言南以別之小兒驚風壯熱遺此引藥猶食之即醉物相感爾治骨蒸熱勞用其汁與衆藥熬爲膏

雞腸草音雞腸草一物也今雖分之爲二其雞腸草條中獨不言性味故知一物也雞腸草春開小花如菉豆大莖葉如園荽初生則直長大即覆地小戶收之爲蔬食之烏鵲髮

蒜天蒜也其氣極葷然置貞肉中掩臭氣中暑毒人爛齶三兩瓣以溫水送之下嚥卽知仍禁飲冷水又患鼻下血以葫五七枚去梗皮量多少入豆豉搗爲膏可丸丸九梧子大以不飲下五六十九無不愈者人鼻

研一顆塗兩足心下纔上便拭去又將紫皮者橫切作
片子厚一分初患瘡發於背脇間未辨癰疽者若陽瘻
於陰即爲癰陰滯於陽即爲疽癰即皮光赤疽即皮肉
紋起不澤並以葫片覆之用艾灸如已痛灸至不痛如
不痛灸至痛初覺即便灸無不効者仍審度正於中心
貼葫灸之廿人往往不晤此瘡初見其瘡小不肯灸惜
哉

蒜也小蒜又謂之萬苗如葱針根白木者如烏芋子兼根
煮食之又謂之宅蒜華佗用蒜鑿是此物

參臺不甚香經冬根不死辟蠹於諸菜中亦不甚佳
四子新羅國出一種淡光微紫色形長味甘今其子已

瓦圃中惟此無益並無所治止說損人後人雖

處汗之法然終與本經相半圃人又植於暖處厚加
糞壤遂於小滿前後求貴價以售既不以時損人益多
不時不食於可忽也

馬齒莧人多食之然性寒滑青黛條中已著

本草衍義卷之二十

諸家之說參差不一止是今脂麻更無他義蓋其種出於大宛故言胡麻今胡地所出者皆肥大其紋鵝其色紫黑故如此區別取油亦多故詩云松下食胡麻此乃是所食之穀無疑與白油麻爲一等如川大黃川當歸川升麻上黨人參齊州半夏之類不可與他土若更爲一物蓋特以其地之所宜立名也是知胡麻與白油麻爲一物嘗官於順安軍雄霸州之間備見之又二條皆言無毒治療大同今之用白油麻世不可一日闕也然亦不至於大寒宜兩審之

青囊

音箱即油麻葉也陶隱居注亦曰胡麻葉也胡地脂

鴻臚子頗大日華子云葉作湯沐潤毛髮乃是今人取胡麻葉以湯浸之良久涎出湯遂稠黃色婦人用之梳髮由是言之胡麻與白油麻今之所謂脂麻者是矣青囊節其葉無疑

大麻子海東來者最勝大如蓮實出毛羅島其次出上郡此地大如豆南地者子小去殼法取麻子帛包之沸湯中浸湯冷出之垂井中一夜勿令着水次日日中曝乾就新瓦上撒去殼簸揚取仁粒粒皆完張仲景麻仁丸是用此大麻子

大麻子與胡麻一等但以其色言之比胡麻差淡亦不全白今人止謂之脂麻前條已具炒熟乘熱壓出油而謂之生油但可點照須再煎煉方謂之熟油始可食惟火中點照亦一異也如鐵自火中出而謂之生鐵亦此

義耳

即楊是也多食動脾風今醫家用以和藥糯與粟米作者佳餘不堪用蜀黍米亦可造不思食人少食之亦使脾胃氣和唐白樂天詩一捺較牙糊者是此

卷之三
湖南北黑小者生他處今用小者力更佳炒熟以裹肉同搗之爲麩代糧又治產後百病血熱并中風疾瘳止痛皆強口噤但煩熱癆癰若渴身熱腫脹嘔逆大豆五升急水淘淨無灰酒一斗熬豆令微煙出傾入酒瓶中沃之經一日已上服酒一升取姜爲度如素未飲酒即量多少服若口噤即加獨活半斤微微椎破同沃仍增二斗二升暑月旋乍恐酸壞又可罐爲腐食之

卷之三
北京東西多食之花治宿酒渴病

卷之三
性平涼有人患纏喉風食不能下將此麩作稀糊令嚥之既滑膩容易下嚥以助胃氣三伏中朝廷作麩以賜臣下作羹造糊

卷之三
此三種麩之不及黃粱青白二種性皆微涼獨黃粱性甘平宜得土之中和氣多邪今黃白二種西洛間農家多種之尤佳餘用則不相宜然其粒尖小於他穀收實少且能種者亦稀白色者味淡

卷之三
粟利小便故益脾

卷之三
黍黍米黍皮赤其米惟可為糜不堪為餅粘着難飭然亦動風

此則粟糵也今穀神散中用之性又溫於大麥
初搗出淡黃白色經久色如糲用作酒者是此米
亦不堪爲飲最點故宜酒

今經與諸家注說皆不言是粳米爲復是粟米
然粳粟二米陳者性皆冷頻食之令人自利與經所証
稍戾前煮亦無膏膩入藥者今人多用新粟米至如春
杵頭細糠又復不言新陳粳粟然皆不及新稻粟二升
東則氣味已腐敗

酒呂氏春秋曰儀狄造酒戰國策曰帝女儀狄造酒述
之於禹然本草中已著酒名信非儀狄明矣又讀素問
首言以麥爲常以酒爲漿如此則酒自黃帝始非儀狄
古方用酒有醇酒春酒杜埴餘胙酒糟下酒白酒清
酒地黃酒今有糯酒黃酒小豆麴酒香藥麴酒鹿頭
酒羔兒等酒今江浙湖南北又以糯米粉入衆藥和今
爲麴曰餅子酒至於官務中亦用四夷酒更別中國不
可取以爲法今醫家所用酒正宜斟酌但飲家惟取其
味不顧入藥如何爾然父之未見不作疾者蓋此物損
益兼行可不謹歟漢賜丞相上樽酒糯爲上稷爲中粟
爲下者今入藥佐使專以糯米用清水白麵麴所造爲
正古人造麴未見入諸藥合和者如此則功力和厚皆
勝餘酒今人又以麥糵造者蓋止是醴爾非酒也書曰
古作酒醴爾往麴糵酒則須用麴醴故用糵蓋酒與醴
其氣味甚相遼治療豈不殊也

有黑白鵲公等皆於豆脊有白路白馬江漢

釋

白晚米爲第一早熟米不及也平和五藏補益氣其功莫逮然稍生則復不益脾過熟則佳此稻米乃糯稻無疑溫故可以爲酒酒爲陽故多熟令人大便堅非糯稻孰能與於此西域記天竺國土熟稻歲四熟亦可驗矣

粱今謂之穄米先諸米熟又其香可愛故取以供祭祀然發故疾只堪爲飴不粘著其味淡

粟其花亦有多葉者其子一艷數千萬粒大小如芥子其色白而重則佳研子以水煎之蜜爲餡

山脈石人

食

酒糟爲之乞鄰者是此必然有米醋麥醋棗醋米醋曲釀入藥多用穀氣全也故勝糟醋產婦房中常得醋氣則爲佳酸益血也磨薤黃塗蜂蠶亦取其收而不散也今人食酸則渴謂其水生木水氣弱木氣盛故如此造靴皮須得此不絞破故知其性收斂不負酸收之說

醫聖人以謂不得即不食意欲五味和五藏悅而受之此亦安樂之一端

麥暴淋前湯飲爲麯作糊入藥水調治人中暑馬

卒熱亦以水調嚙愈生嚼成筋可以粘禽蟲

圖書在版編目(CIP)數據

本草衍義/[宋]寇宗奭撰.—北京:北京圖書出版社,
2006.6

(中華再造善本)

ISBN 7-5013-3067-0

I. 本… II. 寇… III. 本草 IV.R281.2

中國版本圖書館CIP數據核字(2006)第033588號

ISBN 7-5013-3067-0



9 787501 330676 >

書名 本草衍義(全四册)
著者 [宋]寇宗奭 撰

出版 北京圖書出版社(100034北京市西城區文津街七號)
發行 Tel:(010)66151313 Fax:(010)66174391

E-mail:Btsfxb@nlc.gov.cn

Website:www.nlpress.com

印刷 金壇市古籍印刷廠

開本 八
印張 三十一·七五
版次 二〇〇六年六月第一版第一次印刷
印數 一一一〇〇

書號 ISBN 7-5013-3067-0/K·1344

定價 九九〇圓

