

新編婦人大全良方

十一

產後口乾痞悶方論第一

論曰產後口乾痞悶者何答曰產後榮衛大虛血氣未定
食麪太早胃不能消化麪毒結聚於胃脘上熏胃中是以
口乾燥渴心下痞悶醫者不識認爲胃腫壅滯以藥下萬
不得一但服見現圓則愈

見現元方

薑黃

三稜

車澄茄

陳皮

良薑

人參

義茂等分

右爲細末用蘿蔔浸煮爛研細將汁煮麪糊元如梧桐
子大用蘿蔔湯下三三拾元

評曰產後口乾痞悶未必只因食麪或產母內積

煩外傷燥熱飲食甘辛使口乾痞悶當隨其所因

之可也煩心宜四物湯去地黃加入人參烏梅煎若外

傷燥熱看屬何經當隨經爲治難以備舉飲食所傷

見現元却能作効

四物湯

方見本卷第二論

產後血渴方第二

產寶療產後大渴不止

蘆根切壹升括樓

人參

甘草

茯苓各參兩大棗貳拾枚麥門冬生肆兩

右以水玖升煮取參升分參服頓服四劑即差色淡菜

楊氏家藏方黃苓散治產後血渴飲水不止

黃苓

麥門冬等分

右以咀每服參錢水錢半煎至捌分去滓溫服無時
集驗療產後血渴 （補遺）

括樓根肆兩 麥門冬 人參 各參兩 生乾地黄
甘草 各貳兩 土瓜根伍兩 大棗貳拾枚

右以咀以水捌升煮取貳升半分參服 去滓 溫服 無時
千金療產後虛渴少氣力 **竹葉湯**

竹葉 參升 甘草 人參 茯苓 各壹兩
小麥 伍合 生薑 半夏 各參兩 麥門冬 伍兩
大棗 拾伍枚

右以咀以水玖升先煮竹葉小麥生薑棗取柒升去滓
內藥再煎取貳升去滓壹服伍合日叁夜壹

博濟療產後血渴不止 **延胡散**

延胡索 蔚金 乾葛 桂心
青皮 枳殼 等分

右並以好醋浸一宿焙乾杵為細末每服壹錢冷橘七
湯調下不過叁服差

產後乍寒乍熱方論第三 產後癰疾附九九方

論曰產後乍寒乍熱者何答曰陰陽不和敗血不散能令
乍寒乍熱產後血氣虛損陰陽不和陰勝則乍寒陽勝則
乍熱陰陽相乘則或寒或熱若因產勞臟腑血弱不得宣
越故令敗血不散入於肺則熱入於脾則寒醫人若誤作
癰疾治之則謬矣陰陽不和宜增損四物湯敗血不散宜
奪命丹又問二者何以別之時有刺痛者敗血也但寒熱
無它證者陰陽不和也增損四物湯不一皆隨病加減

增損四物湯方

人參

當歸

芍藥

川芎

乾薑 各壹兩 小章 肆錢重

右咬咀每服肆錢水壹錢薑錢參片煎至柒分去滓熱服無時候

評曰乍寒乍熱榮衛不和難以輕議若其敗血不散豈止脾肺二藏邪大抵一陰閉一陽即作寒熱陰勝故寒陽勝故熱只可云敗血循經流入閉諸陰則寒閉諸陽則熱血氣與衛氣解則休遇再會而復作天調經散五積散入醋煎佳

大調經散

治產後血虛惡露未消氣為敗濁凝滯榮衛

調陰陽相乘增寒發熱或自汗或腫滿皆氣血未平之

為也

大豆壹兩炒去皮茯神壹兩

真琥珀壹錢重

右為細末濃煎烏豆紫蘇湯調下

五積散

方見局方

產寶瘕產後惡寒壯熱壹夜參伍度發惡語口中生瘡時乾嘔困乏悶絕

人參

獨活

白鮮皮

葛根

防風

青竹茹

遠志各陸分茯神捌分

白斂拾分

玄參拾貳分竹瀝貳升半

右銀壹斤水壹斗伍升煎取柒升下諸藥重煎取參升分溫參服心魚酒麩等物

產後乍寒乍熱心痛月候不來如何吞曰敗血充心痛遠

臍腹面色無采縱然得效暫時安痊不過三兩日又發服
局方黑神散六効

知母湯 治產後下寒乍熱通身温壯育心煩悶方

知母 參 兩 芍藥 黃芩 各 貳 兩 桂心

甘草 各 壹 兩

右伍味以水伍升煮取貳升半分參服壹方不用
桂心加生地黄

產後方論附

評曰郭稽中云產後乍寒乍熱者多是敗血為害或陰陽
不和所作若作瘧疾治之誤矣如陳無擇評曰只可云敗
血循經流入閉諸陽則熱閉 諸套則寒血氣與

衛氣解則休亦未盡善亦有產後病瘧而作寒熱有一

發或一日二三發或間日一發或二三日一發或先寒

後熱或先熱後寒或寒多熱少或熱多寒少或但寒但熱

者亦有產前病瘧而產後未愈者最難用藥如柴胡常山

信砒等斷不可用今有 經效草葉飲子生熟飲子用之

有效謾備檢閱如易簡方四獸飲亦可男用六法遺

治婦人產後瘧疾寒熱相半者或多熱者宜**良薑飲子**

半夏 湯 赤茯苓 甘草 炙 草果 炮去皮

川芎 陳皮 白芷 各 貳 錢 青皮 去白

良薑 紫蘇 各 壹 錢 乾薑 肆 錢

右咬咀每服參錢重水壹大瓊薑參片棗貳箇同煎至
柒分去滓當發日侵早連進參服無有不安

生熟飲子 治產後瘧疾多寒者

肉豆蔻

草薢仁

厚朴生去

半夏

陳皮

甘草

大蘇生去

生薑

右八味等分細剉和勻壹半生壹半用濕皮帛裹煨令香熟去帛與壹半生者和勻每服秤伍錢重水貳錢煎至柒分食前壹服食後壹服

產後尊勞方論第四

夫產後尊勞者此由生產日淺血氣虛弱飲食未平復不滿日月氣血虛羸將養失所而風冷客之風以搏於血氣則不能溫於肌膚使人虛乏勞倦乍卧乍起顏容憔悴食飲不消風冷邪氣而感於肺肺感微寒故於嗽口乾遂覺頭昏百節疼痛然衛受於風邪流注藏府須臾頻發時有盜汗寒熱如瘧背搏煩悶四肢不舉沉重者以此則尊勞之候也

又論曰婦人因產理不順疲極筋力憂勞心慮致令虛羸喘之寒熱如瘧頭痛自汗肢體倦怠咳嗽痰逆腹中絞刺名曰底勞

石子湯 瘧產後虛羸喘乏乍寒乍熱如瘧四肢疼痛面色痿黃名爲底勞

諸賢 言藥去胸腹四破

晉鼓 壹方無此有知母

葱白

粳米

當歸

芍藥 各貳兩

右以咀分爲兩劑用水叁升煮取壹小椀去滓分叁服 廣濟方無芍藥有人參

許仁則瘧產後日淺久坐視聽言語多或運用氣力遂覺頭膊肢節皮肉痛乍寒乍熱此爲尊勞

猪腎管雙去脂膜四破 當歸 芍藥

生薑各貳兩 葱白切 桂心各壹兩

右水八升煮膏取陸升下藥煎取貳升分溫為貳服

胡氏方 **人參驚甲散** 治婦人產後虛勞皆由在產內未滿

百日體中虛損血氣尚弱失於將理或勞動作傷致成虛

勞其狀虛羸乍起乍卧飲食不消時有咳嗽頭目昏痛發

歇無常夜有盜汗寒熱如瘧背膊拘急沉困在床服此效

人參 桂心 當歸 桑寄生

白茯苓 白芍藥 桃仁 熟地黄

甘草 麥門冬各半 續斷壹分 牛膝叁分

驚甲炙 黃耆各壹兩

右為細末每服先以猪腎壹對去筋膜以水兩大錢生

薑半分棗壹箇煎至壹錢去猪腎薑棗然後入藥末貳

錢入葱叁寸烏梅壹箇荆芥五穗煎至柒分去滓空心

晚食前溫服此藥神妙

老孫太保 **治產後虛羸發寒熱飲食少腹脹**
方 出養生必用

北柴胡 人參 甘草 半夏

陳皮 川芎 白芍藥各等分

右咬咀每服叁錢水壹大錢薑伍片棗貳枚煎柒分去

滓食後溫服日貳服

治產後虛勞皆由體虛氣力未復勞動所致四肢煩疼時

發寒熱不思飲食 **熟地黃散**

熟地黃 人參 白芍藥 白茯苓

白木 各壹兩 續斷

黃耆

桂心

五味子

當歸

麥門冬

川芎 各叁分

右咬咀每服肆錢水壹大碗薑叁片棗壹箇煎至柒分去滓溫服無時

治產後虛勞蓋緣生產日淺久坐多語運動用力遂致頭目四肢疼痛寒熱如瘧狀宜服

白茯苓 壹兩 當歸

川芎

桂心

白芍藥

黃耆

人參 各半兩

熟乾地黄 兩

右咬咀先以水貳碗入猪腎壹隻去脂膜細切以生薑叁片棗叁枚煎取壹碗去腎薑棗入藥半兩煮取柒分去滓食前分溫貳服

治產後虛勞寒熱進退頭目眩痛自骨節痠疼氣力羸乏

黃耆圓

黃耆

鱉甲

當歸 兩

桂心

續斷

白芍藥

川芎

牛膝

茯苓

沉香

栝子仁

枳殼 各叁分

北五味

熟地黄 兩

右為細末煉蜜元如梧桐子大食後粥飲吞下肆拾元

黃耆

白木

當歸

甘草

人參 各貳兩 七薑 肆兩

右先以白羊肉叁斤去膜以水壹斗致升煮肉取汁伍升後下諸藥更煎取叁升分溫叁服

療產後喘乏氣羸腹內絞痛白汗出

黃耆

人參

茯苓

甘草

白朮

五味子

芎藭

當歸各口切分

澤蘭葉

陳皮各陸分 麥門冬

何子各口切分

桂心

熟乾地黄各拾貳分

右為細末煉蜜元如梧桐子大空心溫酒下參肆拾元日再服

婦人產後虛羸方論

治婦人產後虛羸發熱自汗欲變虛勞或血

氣所搏及經候不調及發寒熱自汗羸瘦宜服之

白芍藥

當歸

五加皮

地骨皮

人參各半兩 沒藥

桂心各貳錢 牡丹皮各貳錢

右為細末每服貳錢水酒各半瓊如不飲酒只用水壹

瓊開通錢壹錢麻油煎之同煎柒分去滓通口服煎不

得攪喫不得吹

治產後羸癯肌膚黃瘦面無顏色或增寒壯熱四肢痠疼

心煩頭痛

黃耆

黃甲各陸分 桂心

當歸炒

桑寄生

白茯苓

白芍藥

人參

熟地黄

麥門冬去心

甘草各半兩

牛膝參分

右為細末每服用猪腰子壹對去脂膜先以水壹瓊入

薑半分棗叁枚煎至柒分去滓并腰子却下藥伍錢更

煎至肆分去滓空心晚食前溫服貳洋併煎

產後虛羸方論第五

產寶論曰產後虛羸者因產傷損藏府勞傷氣血輕者將

養滿日即差重者日月雖滿氣血猶不調和故患虛羸也

夫產後氣血虛竭臟腑勞傷若人年齒少盛能節慎將養
滿月便得平復如產後多因血氣虛弱雖逾日月猶常疲
乏或因飲食不節調適失宜為風冷邪氣所侵搏於氣血
流注於五藏六府則令肌膚不榮顏容瘦悴故曰虛羸
治產後虛羸脾胃之弱四肢無力全不思飲食心腹脹滿
人參散

黃耆

人參

草菓仁

厚朴

附子各壹兩

白朮

當歸

白茯苓

木香

川芎

桂心

甘草各半兩

陳皮

良薑

阿梨勒皮各叁分

右以咀每服肆錢水壹錢薑叁片棗壹枚煎至陸分去

滓無時溫服

治產後虛羸短氣不能食**熟乾地黄湯**

熟乾地黄

人參

北五味子

石斛

白茯苓

白朮

鹿角膠

附子各壹兩

桂心

當歸

川芎

澤蘭葉

黃耆

續斷各叁分

右以咀每服肆錢薑棗依前煎服

刪繁療婦人虛勞或本來虛寒或產後血脈虛竭四肢羸
弱飲食減少血脈斷絕血脈不通虛實依源**澤蘭補虛元**

澤蘭葉

石膏粉分

川芎

甘草

當歸各柒分

白芷

防風

白朮

藁本

川椒

厚朴

乾薑

桂心

細辛各伍分

右為細末煉蜜元如梧桐子大酒下貳叁拾元日再忌
海藻菘菜桃李生葱雀肉

治產後虛羸乏力短氣羊腎湯

羊腎青雙夫 麥門冬 羚羊角屑 北五味子

茯神 桂心 續斷 黃耆

川芎 當歸各半兩 人參 附子炮

乾薑各叁分 熟乾地黄壹兩

右以咀先以水貳大瓊煮腎至壹瓊去腎入藥伍錢椒
貳柒粒量錢貳片棗叁枚煎至伍分去滓空心温服

治產後虛羸之弱無力喘急汗出腹中疝痛羊肉當歸湯

肥羊肉貳斤 當歸 白芍藥酪 桂心

附子炮 川芎 黃耆 人參

龍骨 白木各叁分 熟地黄壹兩

右為粗末先以水伍大升煮羊肉取汁貳大瓊每服肆
錢汁壹中瓊薑叁片棗壹枚煎至柒分去滓温服

治產後虛羸腹痛宜服雞黃湯

小黃雌雞體大頭足 當歸 白木

熟地黄 桂心 黃耆各半兩

右以咀先以水柒升煮雞至叁升每服藥肆錢以雞汁
壹瓊煎至陸分去滓温服日叁

產實瘵產後經參膈諸疾退後身虛無力

澤蘭葉炒 細辛 熟乾地黄各伍分

黃耆 當歸 防風各拾分 麥門冬去心

石膏柒分 薑末 白芷 川芎

栢子仁 五味子 甘草 各肆分 桂心 叁分

右為細末煉蜜元如梧桐子大空心温酒下叁肆拾元
救急療產後羸之不復令肥白方

大烏豆淨拭皸熟如造豆黃法去皮擣為末以臘月猪
脂成煉者和元如梧桐子大酒下伍拾元日再服壹月
內肥白也無所忌

婦人方 **當歸散** 治產後補虛益血

當歸 羌活 各壹兩 延胡索 半兩

右為細末用猪腰子壹隻切作片以水壹瓊入藥末貳
錢同煎至茶分同腰子喫

併手散 治產後血虛勞倦盜汗多困少力咳嗽有痰

當歸 川芎 黃耆 各壹兩 北柴胡

前胡 各壹分

右以肉汁煮參味取貳升伍合分為肆服若覺惡露下
各壹枚薑叁片煎至陸分去滓温服如有痰去烏梅

許仁則療產後雖無疾狀但覺虛弱兼心腹痛欲得補氣

功當歸羊肉湯

肥羊肉 壹斤 去脂水壹斗 當歸 伍兩 黃耆 肆兩

生薑 陸兩

右以肉汁煮參味取貳升伍合分為肆服若覺惡露下
不盡加桂心叁兩惡露下多覺有風加芎窮叁兩有冷
加茱萸壹兩有氣加細辛貳兩有熱加生地黃汁貳合
療產後雖無餘苦但覺氣虛

當歸 拾貳分 乾地黄 拾分 澤蘭葉 捌分 地骨皮

芍藥 各柒分

防風

續斷 各陸分

人參

桂心 各伍分

右為細末煉蜜元如梧桐子大温酒吞下貳拾元

療產後虛羸

黃雌雞

壹隻去毛背

生百合

煨

白粳米

半升

右依尋常着五味調和縫背合五味汁煮令熟開腹取

百合并針相和汁作羹食之肉亦食令盡哈卧佳

產寶療產後虛羸不思飲食四肢皆倦心腹疼痛補虛氣

人參

芍藥

桂心

甘草

生薑 各壹兩

當歸 壹兩半

生地黄 貳兩

右以咀每服參錢水兩錢棗貳枚煎至壹錢去滓温服

日叁服

古今錄驗療產後諸疾羸瘦欲令肥白飲食和調

胎前方

生地黄 卅壹

生薑汁 五升

羊脂 貳斤

白蜜 伍升

右肆味先煎地黄汁令餘伍升下羊脂煎減半次下薑

次下蜜便以銅器盛着湯中煎令如飴狀空肚酒壹升

取煎如雞子大投酒中飲日叁良

產後風虛勞冷方論第六

夫產則血氣勞傷藏府虛弱而風冷客之冷搏於血氣血

氣不能温於肌膚使人虛羸之疲頓致羸損不平復若久不

平復若久不瘥風冷入於子藏則胞藏冷亦使無子謂之

風虛勞損也

治產後風虛勞損羸瘦不思飲食四肢疼痛

黃芩散

黃耆

白朮

木香

羚羊角屑

人參

當歸

桂心

川芎

白芍藥

白茯苓

各半

甘草 壹分

右咬咀每服參錢水壹瓊薑參片棗壹箇煎至柒分去滓溫服無時

治產後風虛勞損氣攻心腹四肢疼痛不思飲食木香散

木香

人參

陳皮

白茯苓

白芍藥

黃耆

川芎

各叁分

熟乾地黄

當歸

附子 各壹兩

甘草 壹分

桂心

白朮 各半兩

右咬咀每服參錢水壹瓊薑參片棗壹枚煎至柒分去滓溫服

治產後風虛勞損氣攻心腹四肢無力不思飲食人參散

人參

黃耆

熟地黄

各壹兩

羚羊角 壹分

桂心

川芎

防風

當歸

北五味子

白茯苓

白朮

各半兩

甘草 壹分

右為粗末每服參錢先用水貳大瓊攪猪腎壹雙切去

脂膜薑棗同煎至壹瓊去猪腎入藥煎至肆分去滓空

心溫服

治產後風虛勞損四肢疼痛心神虛煩不飲食枸杞子元

枸杞子

牛膝

白茯苓

人參

黃耆 各壹兩

當歸

漏蘆

防風

桂心

酸棗仁

羚羊角 壹分

羌活

五加皮

白朮

川芎 各叁分

熟地黄 貳兩

甘草 半兩

麥門冬 壹兩半

右為細末煉蜜元如梧桐子大温酒下參拾元荆芥湯亦可

治產後風虛勞損腹痛冷氣脚膝無力面色萎黃飲食減少日漸羸瘦補益白薇元

木香 當歸 桂心 澤蘭葉

牛膝 白薇 牡丹皮 枳殼

人參 川芎 厚朴 白朮

續斷 熟地黄 北細辛 赤石脂

龍骨 禹餘糧 黃耆各壹兩 白茯苓

附子各叁分 吳茱萸壹分

右為細末煉蜜為元如梧桐子大食前温酒下參拾元

產實瘵產後風虛羸瘦勞弱不生肌肉

黃耆 當歸 芍藥 人參各貳兩

桂心 甘草 川芎 生薑各捌分

大棗拾貳箇

右水柒升煮取參升分温參服

瘵產後虛勞骨節疼痛頭痛汗不出

當歸 人參 生薑各貳兩 黃耆叁兩

淡豉伍合 猪腎壹隻 粳米叁合 薤白叁合

右水壹斗伍升先煮猪腎取陸升後下諸藥煎至貳升

分為叁服

又方 律腎壹斤 煮入葱豉作臠如常食之

延年澤蘭葉 主產後風虛損瘦不能食令肥悅方

澤蘭葉 當歸 甘草各柒分 厚朴

藁本

食茱萸

蕪荑

白芷

乾薑

芍藥 各參分 石膏 捌分

人參

栝子仁

桂心 各肆分 白朮 伍分

右為細末煉蜜元如梧桐子大酒服拾伍元至貳拾伍元日貳服忌生冷鮓滑猪牛肉麩生葱桃李雀肉海藻菘菜

古今錄驗 產後風虛勞損羸弱百病必效方

澤蘭葉 陸分

白芷

川椒

蕪荑仁

藁本

北細辛 各肆分 人參

白朮

栝子仁

防風

桂心

厚朴

丹參 各伍分 川芎

當歸

甘草 各參分

乾地黄 拾分

右為細末煉蜜元如梧桐子大空心温酒下貳拾元至

參拾元日貳服忌如前

廣濟療產後患風虛冷氣腹內不調補益肥白悅澤方

澤蘭葉 柒分

厚朴

人參

石斛

蕪荑仁

續斷

防風

桂心 各參分

川芎

白朮

栝子仁

北五味子

黃耆

遠志 各肆分

赤石脂

甘草

乾地黄 各陸分

右為細末煉蜜元如梧桐子大酒下貳拾元至參拾元

日貳服忌如前

延年清損澤蘭元 主產後風虛勞損黃瘦方

澤蘭葉 柒分

防風

乾地黄

當歸

北細辛

桂心

茯苓

芍藥

人參

甘草

藁本

烏頭炮

麥門冬

石斛

紫苑

川芎各五分

乾薑

栝子仁

蕪荑仁

厚朴

川椒各肆分
白朮

黃耆各陸分
紫石英

石膏各別分

右為細末煉蜜元如梧桐子大酒下貳拾元或參拾元

產後腹脹滿悶嘔吐不定方論第七

論曰產後腹脹滿悶嘔吐不定者何咎曰敗血散於脾胃脾受之則不能運化精微而成腹脹胃受之則不能受納水穀而生吐逆醫者不識若以尋常治脹止吐藥治之病與藥不相干轉更傷動正氣疾愈難治但服抵聖湯則愈

抵聖湯方

赤芍藥

半夏

澤蘭葉

人參

陳皮各壹分
甘草壹錢

右以咀每服壹劑用水壹碗生薑焙乾半兩煎至半碗去滓分熱參服

產後嘔逆不食方論第八

夫胃為水穀之海水穀之精以為血氣榮潤藏府因產則臟腑傷動有時而氣獨盛者則氣乘腸胃腸胃燥溢其氣則逆故嘔逆不下食也
治產後脾胃氣寒心腎滿悶吐逆四肢少力不納飲食

抵聖散

丁香

人參

檳榔

白朮

桂心 當歸 厚朴 前胡 各二分

甘草 半兩 良薑 壹兩

右為粗末每服肆錢水壹瓊薑參片煎至柒分去滓溫服空心

治產後胃氣不和嘔吐不止全不納食宜服**開胃散**

阿子肉 兩半 人參 壹兩 甘草 半兩

右參味為細末別以半夏半分生薑壹分薤白貳柒莖水壹大瓊煎至陸分去滓分為兩服

療產後嘔逆不止 鄧知縣傳

橘紅 壹兩 半夏 麩 甘草 各半兩 藿香 參 兩

右為細末每服貳錢水壹瓊半薑參片煎至陸分無時

治產後更無它疾但多嘔逆不能食

白木 伍分 生薑 陸分

右細切酒水各貳升煎取壹升分參服

產後霍亂方論第九

夫產後霍亂氣血俱傷臟腑虛損或飲食不消觸冒風冷所致陰陽不順清濁相干氣亂於腸胃之間真邪相搏冷熱不調上吐下瀉故曰霍亂也經云渴而飲水者五苓散寒多不飲水者理中元大段虛冷者加附子來復丹亦妙見局方

白木散 治產後霍亂吐利腹痛煩渴手足逆冷

白木 橘紅 麥門冬 人參

乾薑 各壹兩 甘草 半兩

右為粗末每服肆錢生薑伍片水壹瓊煎至柒分去滓

温服

療產後霍亂吐利不止手足逆冷附子散

附子

白朮

當歸

吳茱萸

桂心

人參

丁香

橘紅

甘草各半兩

右為細末粥飲調下貳錢無時候

治產後霍亂吐瀉不止温中散

人參

白朮

當歸

草豆蔻仁

乾薑各壹兩 厚朴貳兩

右為粗末每服參錢水煎服

治產後霍亂吐利腹中疝痛高良薑散

良薑

當歸

草豆蔻仁

右等分為細末每服貳錢粥飲調下

詞子散胡椒湯亦妙方見第七卷第二論

新編婦人大全良方卷之二十二

產後傷寒方論第一

凡產後發熱頭痛身疼不可便作感冒治之此等疾證多是血虛或敗血作梗血虛者陰虛也陰虛者陽必湊之故發熱且以平和之劑與服必效如王露散方見十八卷或四物湯以生地黃易熟地黃加北柴胡等分煎服或人參當歸散秦艽鱉甲散人參輕骨散人參百解散逍遙散等

可選用 此等無聞 纔見產後發熱不退便以為熱入血室便以小柴胡湯竟不可救者亦有用竹葉石膏湯而死者亦有見前夫而投以溫劑其熱愈熾者諸如此等非不知罪福皆是不觀古典杜撰臆度枉傷人命殊不知此等疾狀是產後去血過多而發熱亦有寒極生熱但以上件之

藥以脈證選用無不獲安若是陰陽不和乍寒乍熱宜增

損四物湯如敗血不散者宜奪命丹大調經散五積散加醋煎却效詳見二十卷第二論

王子亨云婦人新產去血過多津液燥少陰陽俱虛如中風傷寒時氣之類雖當發汗如麻黃謹不可用取汗母令

過多以意斟酌

夫人觸冒寒氣而為病者謂之傷寒症婦血氣俱虛日月未滿而起早勞動為寒所傷則浙浙惡寒翁翁發熱頭項肩背骨節皆痛至七八日乃差也

婦人產後亡血汗多故令鬱冒其脈微弱不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故但頭汗出所以為產婦

無汗出者亡陰血陽氣獨盛故當汗出陰陽乃復所以便
堅者嘔不能食也方可用小柴胡湯加生乾地黄主之
秦元驚中散人參輕骨散神仙百解散並見和劑局方

人參當歸散治產後去血過多血虛則陰虛陰虛生內熱
內熱曰煩其證心骨煩悶吸吸短氣頭痛悶亂骨節疼痛
哺時輒甚與大病虛煩相類急宜治之

人參 當歸 生乾地黄 桂心
麥門冬 各半兩 白芍藥 貳兩

右以咀每服肆六錢水貳盞先將粳米壹合淡竹葉十
片煎至壹錢去米竹葉入藥并棗貳枚煎至柒分去滓
溫服虛甚者用熟地黄

治婦人草蓐中傷風四肢苦煩熱頭疼與小柴胡湯若頭
不疼但煩者**物黃令湯**

黃芩 半兩 苦參 壹兩 生乾地黄 貳兩

右以咀每服肆錢水壹錢煎至柒分去滓溫服
治婦人產後虛羸發寒熱飲食少腹脹等疾宜**柴胡湯**

柴胡 參 芍藥 半夏 炮
甘草 橘紅 川芎 各參三分

右以咀每服四錢水壹錢姜參片棗壹枚煎至柒分去
滓溫服

治婦人產後傷風發熱面赤喘而頭痛宜服**竹葉防風湯**

淡竹葉 半把 防風 人參 桂枝
苦梗 甘草 各半兩 葛根 壹兩半

右以咀每服參錢水壹錢姜參片棗壹枚煎至柒分去

淳温服使汗出頸項強用附子炮去皮劑剉如豆大抄壹錢同煎嘔者加半夏煎服

治婦人產後傷風十數日不解頭微痛惡寒時時有熱心下堅乾嘔汗出宜**陽旦湯**

桂枝

芍藥各參兩 甘草炙

黃芩各貳兩

右咬咀每服參錢水壹瓊姜參片棗壹枚煎至柒分去滓温服無時候自汗者去桂加炮熟附子一枚渴者去桂加栝樓根參兩下痢者去芍藥加乾薑參兩心下悸者去芍藥加茯苓四兩虛勞裏急者正陽旦湯主之前時入膠飴為佳若脉浮緊無汗發熱者莫與也

治產後惡露方下勿耳斷絕晝日明了暮則譫語寒熱往來如見鬼狀此由為熱入血室不即治之諸變不測宜服

柴胡地黃湯

方見第八卷十五論中

四物湯加北柴胡

千金翼療產後虛熱頭痛身體發熱兼治腹內拘急疼痛

芍藥湯

桂心 參兩

牡蠣

白芍藥 各伍兩

黃芩

貳兩千金翼云若頭痛身發熱方加黃芩

生乾地黃

伍兩

右咬咀每服伍錢水壹瓊半煎至壹瓊去滓温服

產後療虛熱往來心胃煩渴骨節疼痛及頭痛壯熱日晡加甚又如瘧狀**千金蜀漆湯**

黃耆 伍兩

生地黃 壹斤 蜀漆葉

桂心

甘草

黃芩 各壹兩

知母

芍藥 各貳兩

右咬咀每服伍錢水壹瓊半煎至壹瓊去滓温服

產後頭痛方論第二九三方

夫人頭者諸陽之會也凡產後五藏皆虛胃氣虧弱飲食不充穀氣尚乏則令虛熱陽氣不守上湊於頭陽實陰虛則令頭痛也。又有產後敗血頭痛不可不知黑龍丹言之甚詳

芎藭散 治產後頭痛

真天台烏藥皮

大川芎等分

右為細末每服參錢秤鎰滓酒調服

芎附散 治產後敗血作梗頭痛諸藥不効者

大附子壹枚醃醋壹碗用大四畔炙透蘸醋令盡去皮臍川芎壹兩並為細末每服貳錢茶清調下

奇散 治產後頭疼

取當歸川芎為細末每服貳錢水壹瓊煎茶分溫服

產後咳嗽方論第三九四方

夫肺者主氣因產後血虛肺經一感微邪便成咳嗽或風或熱或寒或濕皆令人咳嗽也。若產後喫鹽太早而咳嗽者難治

產後血氣不通咳嗽者何吞曰產後咳嗽多因食熱麪壅納或熱病或有氣塊發時充心痛氣急咳嗽四肢寒熱心悶口乾或時煩躁睡夢驚悸氣虛肢體無力宜服局方真黑神散五積散加棗煎服

二母散 治產後惡露上攻流入於肺經咳嗽宜服此藥如

傷風痰嗽却以尋常傷風藥主治

知母

貝母

白茯苓

人參各半兩

桃仁

杏仁並生去皮小大各壹分

右為細末每服參錢水壹錢半煎至八分無時溫服如
覺腹痛併服之立有神效

集驗療產後感風傷寒咳嗽多痰唾粘產實同

甘草 苦梗各陸分 款冬花四分 生麥門冬

生地黄各拾分 葱白壹握 豉貳合 舊方

右咬咀每貳升煮取八合去滓食後分貳服

經効療咳嗽多痰唾粘氣急

前胡 五味子 紫苑 貝母各陸分

桑白皮 茯苓各八分 淡竹葉貳拾片

右咬咀水貳升煎取八合去滓食後分兩服

療產後咳嗽氣喘

百部根 苦梗各陸分 桑白皮貳拾 乾百合

赤茯苓各一分

右咬咀水貳升煮取柒合去滓食後分兩服

產後喉中氣急喘促方論第四九四方

論曰產後喉中氣急喘促者何答曰榮者血也衛者氣也

榮行脉中衛行脉外相隨上下謂之榮衛因產所下過多

榮血暴竭衛氣無主獨聚肺中故令喘也此名孤陽絕陰

為難治若惡露不快敗血停凝上熏於肺亦令喘急但服

奪命丹方見拾捌卷 血去喘自定

評曰產後喘急固可畏若是敗血上熏於肺猶可責効

奪命丹若感風寒或因憂怒飲食鹹冷等奪命丹未可

均濟况孤陽絕陰乎若榮血暴絕宜大料煮芎藭湯亦

自可救傷風寒宜苾覆花湯性理齋發宜小調經散用

桑白皮杏仁煎湯調下傷食宜服見現元五積散

芎藭湯方見第貳卷第伍論又名佛手散

旋覆花湯治產後傷風感寒身溫咳嗽喘滿痰涎壅盛坐

卧不寧

旋覆花 赤芍藥 前胡 半夏麩

荆芥穗 甘草 茯苓 五味子

杏仁 麻黃各等分

右以咀每服四錢水壹瓊半姜伍片棗壹枚煎至柒分去滓食前溫服有汗者莫服

小調經散方見本草卷第十論五積散方見現元卷第壹論

參蘇散治婦人產後血入於肺面黑發喘欲死者胡氏

人參壹兩別為末 蘇木貳兩

右以水兩碗煮取壹碗以下去滓調參末隨時加減服神效不可言

產後口鼻黑氣起及鼻衄方論第五九貳方

論曰產後口鼻黑氣起及鼻衄者何答曰陽明者經脉之海起於鼻交頰中還出頰口交人中左之右右之左產後氣消血散榮衛不理散亂入於諸經却還不得故令口鼻黑起及變鼻衄此緣產後虛熱變生此證其疾不可治名胃絕肺敗此證不可治故不出方

經驗方云遇有此疾急取緋線一條并產婦頂心髮兩條緊繫中指節上即止無藥可療亦厭穢之壹端也

海上方治產後鼻衄中風以荆芥為末童子小便調下貳錢匕

產後咳癆方論第六九六方

夫肺主於氣五臟六腑俱稟於氣產後則氣血傷臟腑皆損而風冷搏於氣氣則逆上而又脾虛聚冷胃中伏寒因食熱物冷熱氣相衝擊使氣厥而下順則咳癆也脾者主中焦為二焦之關五臟之倉廩貯積水穀若陰陽氣虛使祭衛氣厥逆則致生斯病也經云吃噫者胃寒所生服藥無効者多期門二壯必愈期門穴乃胃之大絡九見六卷第十五論

丁香散治產後心煩咳癆不止

丁香

白豆蔻仁 各半兩

伏龍肝 一兩

右為細末煎桃仁吳茱萸湯調下一錢如人行五里服

石蓮散治氣吃噫又治吐逆心怔目暈可思飲食出婦人經驗方

石蓮肉炒兩 白茯苓一兩 丁香半兩

右為細末每服二錢米飲調下無時候

產室療產後咳逆二日不止欲死

桂心半兩

姜汁二合

右同煎取二合以火先炙背摩之背熱時塗藥汁及妙產後咳逆方

乾柿一个

右切碎以水一瓊煎至六分熱呷

又方古壁鏡窠三四個水一小瓊煎至一半熱服並出產室

石蓮散治欬逆出靈死方

羌活

附子炮

茴香炮各半兩

木香

白姜炮各一分

右五味為末每服二錢水一瓊鹽一捻煎一二下沸熱

服一服止

產後血崩方論第七九八方

論曰產後血崩者何答曰產時傷耗經脈未得平復而勞役損動致血暴崩淋瀝不止或因酸鹹不節傷靈榮衛氣血衰弱亦變崩中若小腹滿痛肝經已壞為難治急服固經元以止之

固經元方

艾葉

赤石脂煨

補骨脂

木賊各半兩

附子

个炮

方為末陳米飲和真如梧桐子大食前溫酒下二十負米飲亦可評曰血崩不是輕病况產後有此是謂重傷恐不止鹹酸不節而能致之多因驚憂恚怒臟氣不平或產後服斷血藥早致惡血不消鬱滿作堅亦成崩中固經元自難責効不若大料煮**芎藭湯**加芍藥候定續次隨證諸藥治之為得

芎藭湯加芍藥方

芎藭

當歸

芍藥等分

右咬咀每服四錢水椀半煮取七分出滓無時熟服治產後崩中頭目旋運神思昏迷四肢煩亂不知人事

熟乾地黄散

熟乾地黄

伏龍肝

黃耆

赤石脂各

阿膠

甘草

白朮

艾葉炒

川芎

人參各半兩當歸三分

右咬咀每服二錢姜三片煎至七分去滓溫服

治產後崩中下血淋漓不絕黃瘦虛損宜

白芍藥 牡蠣 乾薑 熟乾地黄

桂心 黃耆 烏賊骨 鹿角膠

龍骨 各膏兩

右為末食前溫酒調下貳錢

又方

熟地黄 赤石脂 鹿茸 牡蠣

當歸 各半兩

右為細末食前粥飲調貳錢

治產後崩中下血不止虛羸無力

阿膠 亦石脂 續斷 川芎

當歸 甘草 丹參 龍骨

鹿茸 烏賊骨 鱉甲 各貳兩

右為細末煉蜜元如梧桐子大空心溫酒下貳錢拾元

治產後崩中不止下血

當歸 壹兩半

右細對以酒貳錢煮取壹錢去滓分溫服食前

治產後惡血崩漏狀如泉水

瑞蓮 棕櫚 當歸 桂心 各壹兩

鯉魚鱗 川芎 各叁分 檳榔 貳枚

右為細末每服參錢煖酒調下如未止更進壹服或

時血崩無惡可治但進參服即止

產後月水不調方論第八

夫產後月水不調者由產傷動血氣虛損未復而風邪冷

熱之氣客於經絡乍冷乍熱冷則血結熱則血消故令血或多或少或在月前或在月後故名不調也

治產後經脈不調四肢煩疼飲食全少日漸羸瘦

琥珀

牛膝

生乾地黄

當歸 各壹兩

桃仁

赤芍藥 各半兩

右為粗末每服參錢水壹椀薑參片煎至陸分去滓

治產後虛乏不足胃心短氣腹內緊急腰背疼痛月水不

調食少煩滿四肢無力

養血元

薑黃

當歸

熟地黄

牡丹皮

厚朴

桂心

川芎

續斷

桃仁

白朮 各壹兩

赤芍藥

木香 各參分

羚羊角屑 壹分

右為細末煉蜜元如梧桐子大食前溫酒下參拾元

產後月水不通方論第九 無方

論曰夫產傷動於血氣其後虛損未復而為風冷所傷血

之為性得冷則凝結故風冷傷於經血結於胞絡之間故

令月水不通也凡血結月水不通則血結成瘕水血相併

復遇脾胃衰弱肌肉虛者則為水腫也

夫婦人衝任之脈為經絡之海皆起於胞內而手太陽小

腸之經手少陰心之經也此貳經上為乳汁下為月水若

產後月水不通者蓋新產之後易氣血或去血過多乳

汁通行自是不通若新產之後或壹歲之內而月經不行

此是常候即非病也何必通之諺云妳假是也若半歲而

行者或四五箇月便經行者皆是少壯血盛之人注受極

易產乳必瘰其子失乳必四肢疴羸壯大青筋頭大髮焦好啖泥土病名無辜若經血有餘者不可以藥止之若產後壹貳歲月經不通而無疾苦何必服藥或勞傷氣血衝任脉虛氣血衰少而不能行者但服健脾胃資氣血之藥自然通行若以牛膝紅花蘇木乾漆蚘虫水蛭等藥以通之則為害滋大經水枯竭則無以滋養其能行乎初虞世所謂譬猶索萬金於乞丐之手雖捶楚並下而不可得也後之學者更宜詳審而療之自明補註

產後四肢浮腫方論第十九方

論曰產後四肢浮腫者何荅曰產後敗血乘虛停積於五臟循經流入四肢留滯日深却還不得腐壞如水故令面黃四肢浮腫醫人不識便作水氣治之凡治水氣多用導水藥極虛人夫產後既虛又以藥虛之是謂重虛往往因致夭枉但服小調經散血行腫消則愈

小調經散方

沒藥 琥珀 桂心 芍藥

當歸 各半錢 細辛 麝香 各半錢

右為細末每服半錢七薑汁溫酒各少許調停服評曰產後浮腫多端有自懷妊腫至產後不退者亦有產後失於將理外感寒暑風濕內作喜怒憂驚血與氣搏留滯經絡氣分血分不可不辨要當隨所因脉證治之宜得其情小調經散治血分固効但力淺難憑不若異藥更湯枳朮湯奪魂散大調經散皆要藥也

經云產後肌浮掛皮酒服

加減承氣湯 治婦人藏氣本虛宿挾風冷胃腸滿痛腹脇絞刺嘔吐惡心飲食減少身面虛浮惡寒戰慄或泄不止少氣羸困及因生產藏氣暴虛邪冷內勝宿疾轉增

吳茱萸黃精兩 苦棟 乾薑 甘草

麥門冬 防風 半夏 細辛

當歸 赤茯苓 牡丹皮 桂心 各半兩

右為粗末每服肆錢水錢半煎至柒分去滓食前熱服

枳木湯 治心腹堅大如盤邊如旋盤水飲所作名曰氣分

枳實言兩半 白木參兩

右以枳實每服肆錢水壹錢半煎至柒分去滓溫服中乾即當散也

養氣散 治產後虛腫喘促利小便則愈

生薑取汁 白朮參兩 半夏柒箇

右以生薑汁搜麩裹半夏為柒餅子炙焦熟為末水調壹錢小便利為効

大調經散 最治產後腫滿喘急煩渴小便不利

又論曰夫產後勞傷血氣腠理虛則為風邪所乘邪搏於氣不得宣越故令虛腫輕浮是邪搏於氣氣腫也若皮膚如熟李狀則變為水腫氣腫者發汗即愈水腫者利小便差也

治產後風虛氣壅一攻頭面浮腫漢防已散

漢防已 豬苓 枳殼 桑白皮略壹

高陸 甘草各參分

右為粗末每服肆錢水錢半薑參片煎至柒分去滓溫

服空心

治產後遍身青腫疼痛產後血水疾出婦入經驗方

乾漆

大麥蘗等分

右各為細末以新瓦罐子中鋪壹重麥蘗壹重乾漆如此填滿用鹽泥固濟火煨通赤放冷研為散但是產後諸疾熱酒調下貳錢

張氏方治產後血虛風腫水腫

澤蘭葉

防已等分

右為末每服貳錢温酒調下不能飲者醋湯調亦可

產後腹痛及瀉痢方論第十一九七方

論曰產後腹痛及瀉痢者何答曰產後腸胃虛怯寒邪易侵若未滿月欲冷當風乘虛襲留於育膜散於腹脇故腹痛作陣或如錐刀所刺流入大腸水穀不化洞泄腸鳴或下赤白眩脇脹或起痛不定急服調中湯立愈若醫者以為積滯取之禍不旋踵謹之謹之

調中湯方

高良薑

當歸

桂心

芍藥

附子炮

川芎

各壹兩 甘草半兩

右為粗末每服叁錢匕水叁錢煎至壹錢去滓熱服

評曰產後下痢非止一證當隨所因而調之既云飲冷當風何所不至寒熱風濕本屬外因喜怒憂思還從自性况勞逸飢飽皆能致病若其洞泄可服調中湯赤白滯下非此能愈各隨門類別有正方今錄桃膠散白頭翁湯以備用餘從滯下門選之

桃膠散 治產後痢下赤白重急後重汚刺疼痛等證

桃膠尾上 沉香 蒲黃隔紙炒等分

右為末每服貳錢食前陳米飲調下

白頭翁湯 治產後下痢虛極

白頭翁 甘草 阿膠各貳兩 黃連

藥皮 秦皮各叁兩

右咬咀每服肆錢水椀半煎至柒分去滓空心服

張氏方的奇散治產後泄瀉惡露不行此餘血滲入大腸

為瀉分過則愈雖洞泄不禁下青黑色物亦驗因食傷動

用**調中湯**

荊芥大者四五穗於瓦內然火燒成灰不得犯油火入

麝香少許研泔湯一兩呷調下此藥雖微能愈大病宜

三壯 勿忽之

產後諸痢方

薤白食之

又方

羊脂炒薤白空腹食尤佳

又方

灸肥羊肉食之

產後赤白痢疾及虛羸氣痢方論第十二方三十

論曰產後痢疾者由產勞傷臟腑不足日月未滿虛乏未

復或勞動太早或誤食生冷若行起太早則外傷風冷乘

虛入於腸胃若誤食生冷難化之物傷於脾胃皆公洞泄

水瀉甚者變為痢也若血滲入大腸則為血痢難治泄謂

之產子痢是也得冷則白或如魚腦得熱則赤黃或為驟血若冷熱相搏則下痢赤白或膿血相雜若下痢青色則極冷也若飲食不進便利無常日夜無度產後本虛更加久痢不止無力瘦之愈見羸弱謂之虛羸下利又有產後氣宇不順而下痢赤白謂之氣痢治之之法熱則涼之冷則溫之冷熱相搏則調之滑者澁之虛羸者補之水穀不分者當利小便若產婦性情執着不能寬解須當順其氣未有不安者也治之各有方

深師療產後冷熱痢黃連元

黃連陸兩 烏梅參兩 乾薑貳兩

右為細末煉蜜元如梧桐子大空心米飲下參拾元忌猪肉

經效治產後赤白痢臍下氣痛

厚朴捌分 當歸 枳殼 呵子肉各陸

甘草五分 肉豆蔻伍箇 薤白參合

右水壹升煮取玖合空心分為參服

張文仲治產後赤白痢腹中絞痛不可忍

黃連肆兩 何膠 蒲黃 梔子仁各壹

當歸壹兩半 黃芩貳兩 黃蘗皮參兩

右為細末煉蜜元如梧桐子大飲陸拾元日夜壹立

定破血止痢

救急治產後赤白痢腹中絞痛

芍藥肆兩 阿膠 艾葉各貳兩 乾地黄肆兩

甘草 當歸各貳兩

右水貳升煮取捌合分兩服空心

必效療新產後赤白痢疾心腹刺痛

薤白切壹升當歸貳兩酸榴皮參兩地榆肆兩

粳米伍合阿膠人參甘草

黃連各兩半

右以咀以水陸升煮取壹升日參服壹方有厚朴壹兩

千金方只有前五味

又療產後赤白痢腹中絞痛不下食

當歸石榴皮地榆各貳分白蘘荷

黃連各貳分黃蘗壹分犀角角肆分黃芩

枳殼升麻各陸分西根捌分

粳米貳合薤白壹升

右為末煉蜜元如梧桐子大空心米飲下貳拾元

療產後赤白痢疾

黃連捌分阿膠陸分赤茯苓當歸

黃蘗各肆分

右為末煉蜜元如梧桐子大粥飲吞下貳拾元空心

療產後下痢赤白有血

赤石脂黃連地榆各陸分當歸肆分

乾姜甘草各參分厚朴拾貳分葱白柒莖

右水貳升煎取捌合空心分作兩服

廣濟療產後腹痛氣脹肋下妨滿不能食兼微痢方

茯苓人參厚朴各捌分甘草

橘紅當歸黃芩各陸分壹方無黃芩

右為細末以飲調下方寸匕至半日參

又療產後下痢赤石脂 **赤石脂** 各二兩 **甘草** 各二兩 **大治** 以 痢色青鴛鴦

赤石脂 各二兩 **甘草** 各二兩 **當歸** 各二兩 **白朮** 各二兩

黃連 各二兩 **乾薑** 各二兩 **秦皮** 各二兩 **川椒** 各二兩

附子 各二兩

右為細末煉蜜為元如梧桐子大酒下貳拾元日參良忌猪肉冷水海藻松菜

深師療產後下痢 **附子** 各二兩

何膠 各二兩 **當歸** 各二兩 **蠟** 各二兩 **糲米** 壹合

黃連 各二兩

右細切以水陸升先煮米令蟹目沸去米內藥煮取貳升入阿膠蠟煮令烱分溫參服

千金療產後下痢腹痛 **當歸** 各二兩

當歸 各二兩 **龍骨** 各二兩 **乾薑** 各二兩 **附子** 各二兩

甘草 各二兩 **熟艾** 各壹兩 **白朮** 貳兩 **川芎** 貳兩半

右捌味細切以水陸升煮取貳升半去滓分為參服日參壹日令盡忌猪肉冷水桃李雀肉毒物

廣濟療產後赤白痢臍下絞痛

當歸 各二兩 **芍藥** 各二兩 **地榆** 各二兩 **龍骨** 各二兩

黃連 各二兩 **艾葉** 各二兩 **甘草** 各二兩 **厚朴** 各捌分

黃芩 各二兩 **乾薑** 各陸分

右以咀以水捌升煮取貳升半去滓分溫參服即差忌生冷油膩海藻菘菜猪肉

又療產後赤白痢臍下氣痛

當歸別分

厚朴

黃連各拾分

肉豆蔻五枚

甘草陸分

右以咀以水伍升煮取貳升去滓分溫參服

千金療產後餘寒下痢便膿血赤白日數十行腹痛時時

下血續命湯

桂心

乾薑

甘草各貳兩赤石脂拾兩

當歸參兩

附子壹兩

蜜壹升

右細切以水柒升煮取參升入蜜再煎壹貳沸去滓分

服壹升日參

必效療產後痢日伍拾行者方

取木裏蠶虫糞炒令黃急以水沃之稀稠得所服之

差止獨孤祭酒酌方

三、十四

療產後虛羸下利膿血腹痛

黃連

芍藥

甘草

當歸

乾薑

人參各捌兩艾葉參分

右以咀水柒升煮取貳升分為參服忌猪鹿肉

治產後下痢不禁止因之氣欲絕無問赤白水穀不分

黃連

厚朴各參兩芍藥

黃蘗各貳兩

右水陸升煮取貳升分溫貳服

治產後羸困赤白痢疾心腹絞痛

薤白

石榴皮

黃連各參分當歸貳兩

地榆參分

右水柒升煮取貳升半分為參服

療產後氣痢不止方

青木香各三分 呵子各三分

右為細末空心米飲調下方寸匕壹方有縮砂仁參味等分為細末入蜜壹匙米飲調下貳錢

療產後水痢

枳殼肆分 厚朴 茯苓 黃連各陸分

當歸叁分

右水壹升煮取捌合空心分為叁服

療產後水痢

黃連陸分 烏梅伍分 石榴皮 赤石脂

當歸各肆分 乾薑叁分

右為細末煨蜜為元如梧桐子大空心米飲下叁拾元

療產後血痢

艾葉叁分 阿膠拾分 黃連柒分 芍藥

黃蘗 甘草各陸分

右為細末粥飲調下方寸匕

療產後下痢膿血相雜

赤石脂 五色龍骨 黃連各拾分 白木伍分

阿膠 黃耆各陸分 黃蘗肆分

右為細末飲服方寸匕

治壹切積滯化氣消食補益真氣調砂煎之 產後逐敗血

補虛至善

礪砂健明無石 金鈴子去皮核

天雄用無反酒浸 當歸各肆分 巴戟

檳榔 柏茴香炒 木香 附子炮

沉香 各壹兩 下鬼半兩米煎藥 肉從蓉 兩

右為細末以無灰酒煮白麩糊元如梧桐子大每服叁拾元空心日午温酒下此方家家有子家婦人常病尊中下痢日久甚困篤百方不差士人李潜善醫曰尊中痢與他痢不同常痢可用苦泄藥止之尊中痢生於血不足投泄藥則血愈不行痢當更甚為子作礪砂法云此藥最能治產後痢先以桂元小下之次投礪砂圓日致拾圓利頓減半次日遂愈礪砂圓產後雖無疾亦宜服之能養血氣去積滯

礪砂 方 沈內翰方

礪砂

桂心

甘遂

丁香

木香

元花 以礪砂炒焦

巴豆 去心皮不

右為細末麩糊元如菜豆大每服貳元叁元温水下加減更量虛實者各醫也云此元取積最勝不以久近皆能消化

又許仁則秘方

神麩末 蚶台 枳殼

白木 各壹分 人參 肆分

赤石脂 拾分

右為細末米飲調下方寸匕

療產後驟血不止 **續命湯**

白蜜 壹匙

小薑 壹斤

右同煎候蜜色赤投童子小便壹升去薑更煎兩沸分為叁次頓服之

療產後血痢小使不通臍腹痛

生馬齒莧

古擣取汁參大合煎壹沸下蜜壹合調頓服

療產後血痢不止

臭樗根陸分

右為末水和元如棗核大麩担作餛飩無度煮氣染箇
熱吞之

療產後下血不止

桑耳炙

芍藥炙

地榆

茜根

牛角鯁

阿膠各陸分艾葉

雞蘇各肆分

白龍骨拾貳分

右咬咀以水貳升煮取捌合分參服

