

重刊孫真人備急千金要方

十二



重子孫真人備急千金要方卷之十一 傷寒下

傷寒雜治第一 論一首 灸法一首 方五十一首

論曰凡除熱解毒無過苦酢等物故多用苦參青箱艾梔  
子葶藶苦酒烏梅之屬是其要也夫熱盛非苦酢物不解  
也熱在身中既不時治治之又不用苦酢等藥此如救火  
不以水也必不可得脫免也又曰今諸療多用辛甘薑桂  
人參之屬此皆貴價難得常有此行求之轉以失時而苦  
參青箱葶藶艾之屬所在盡有除熱解毒最良勝於向  
貴價藥也前後數參並用之得病內熱者不必按藥次也  
便以青箱苦參艾苦酒療之但稍與促其間無不解也  
鵠曰病在腠理湯熨之所及病在血脉針石之所及病在  
骨髓無可奈何而凡醫治病或言且待使病成乃頓去之  
此為妄矣當預約東家中及所部曲具語解此意使有病  
者知之為要

治溫氣病欲死方  
苦參一兩以酒二升煮取一升盡飲之當吐則除諸

毒病服之覆取汗皆愈 張文仲云後云治熱毒氣死破棺千金湯

苦參湯 治熱病五六日已上方

苦參 冬二兩 黃芩 貳兩 生地黃 兩

右三味以水八升煎取二升適寒溫服一升日再

疑雪湯 治時行毒病七八日熱積聚胸中煩亂欲死起死

人揭湯方

芫花一升以水二升煮取一升半漬故布薄膏上不

過二薄熱即除當溫暖四肢護厥逆也

傷寒雜治

**和胃湯** 治傷寒中風五六日已上但胃中煩乾嘔方

桔槩實 壹枚

黃芩

甘草 各叁兩

生薑 肆兩

大棗 拾貳枚

柴胡 半斤

右六味以水一斗一升煮取五升絞去滓適寒溫服一升日三

**薑根飲子** 治傷寒後嘔噦反胃及乾嘔不下食方

生薑根 切

青竹茹 各壹斤

生薑 叁兩

右四味以水七升先煮千里鞋底一隻取五升澄清下藥煮取二升半隨便飲不瘥重作取瘥

治傷寒後嘔噦方

通草 叁兩

生薑根 切壹斤

粳米 叁合

右四味以水五升煮取二升隨便稍飲不瘥重作

金方十一

取瘥止

治傷寒後虛羸少氣嘔吐方

石膏

麥門冬

半夏

各壹升

竹葉

貳把

人參

貳兩

右五味以水一斗煮取六升去滓內粳米一升米

熟湯成飲一升日二服一方加生薑五兩 此方止是仲景竹葉湯方

前卷汗後門中已有此方仍少甘草分兩不別

治熱毒攻手足赤腫焮熱及腫痛欲脫方

煮馬屎若羊屎汁漬之日二度

**又方** 濃煮虎杖根適寒溫以漬手足令至踝上一尺止

**又方** 稻穰灰汁漬之 **又方** 取酒煮苦參以漬之

**又方** 猪膏和羊屎塗之亦佳

**又方** 取常思草絞取汁以漬之一夕各著耳

**盧連翹湯** 治時行熱毒變作赤色癰疽丹疹毒腫及眼赤痛生障翳方

漏蘆

連翹

黃芩

麻黃

白欬

升麻

甘草

各壹兩

枳實

大黃

各叁兩

右九味以水九升煮取三升分三服相去如人行五里久更服執盛者可加芒消二兩

**猪膽湯** 治傷寒五六日斑出方

猪膽

苦酒

各叁合

雞子

壹枚

右二味合煎三沸強者盡服之羸者須煎六七沸分爲二服汗出即愈

治人及六畜時氣執病豌豆瘡方

濃煮黍穰汁洗之一莖是稔穰即不瘡瘡若黑者擣

蒜封之

**方** 煮芒臺洗之

治執病後發豌豆瘡方

黃連二兩以水二升煮取八合頓服之

**方** 真波斯青黛大如棗水服之瘡

**方** 青木香二兩以水二升煮取一升頓服之

**方** 若赤黑發如疥大疾一作者煎羊脂摩傳之

**方** 小豆屑雞子白和傳

**方** 婦人月水帛拭之

**方** 小兒著取月水汁和水浴之

**方** 灸兩手腕硯子骨尖上三壯男左女右

**木香湯** 治瘡煩疼者方

青木香

願薰陸香

礬石

各壹兩

麝香

半兩

右五味咬咀以水四升煮取一升半分再服熱毒盛者加犀角一兩無犀角以升麻代病輕者去礬石神驗

**又方**芒消和猪膽塗上勿動痂落無痕仍卧黃土末上良此病小便澀有血者內壞瘡皆黑靨不出膿者死不治也

治內發瘡盛方

酢肆合

大猪膽壹具

右二味合煎二沸服一合日五服之良驗

治疏日瘡初發覺欲作者方

煮大黃五兩服之愈

治時行病發瘡方

取好蜜徧身摩瘡上亦可以蜜煎升麻摩之并數數

食之

治傷寒臍胸肺間有餘熱故也熱因血自上不止用此方

牡蠣貳兩半

石膏壹兩陸銖

右二味治下篩酒服方寸匕日三四亦可蜜丸如梧子

大用治大病瘥後小勞便鼻衄者

治傷寒熱病喉中痛閉塞不通方

生烏菟壹斤切猪脂壹斤

右二味合煎藥成去滓取如半雞子大薄綿裹之內喉

中稍稍咽之取瘥

**又方**升麻

芍藥

羚羊角各叁兩

通草肆兩

射干貳兩

生薑根切壹升

右六味咬咀以水七升煮取一升半分二服

治瘡

治熱病口中苦下氣除熱喉中鳴煎方

石膏半升

蜜壹升

右二味以水二升先煮石膏取一升次內蜜復煎取如  
錫含如棗核許盡復含之大良

治傷寒熱病後口乾喜唾咽痛方

大棗貳拾枚

烏梅拾枚

右二味合搗蜜和含如杏核大咽其汁甚驗

傷寒服湯藥而下利不止心下痞堅服瀉心湯

竟復以他藥下之利不止醫以理中與之而利益甚理中  
治中焦此利在下焦治之方

禹餘糧

赤石脂各壹斤碎

右二味以水六升煮取二升分三服若不止當利小便

金方十一

五

治傷寒後下利膿血方

阿膠壹兩

黃蘗貳兩

黃連肆兩

梔子人拾肆枚

右四味以水六升煮取二升去滓內阿膠更煎令  
消分為二服甲乙方無黃蘗有黃芩

治赤白下膿小兒得之二三日皆死此有膿蟲在下部方

麝香

麝香

巴豆

附子

真朱

雄黃各等分

右六味治合取桑條如箭幹長三寸以綿纏頭二寸唾  
濡綿裹取藥著綿上內穀道中半日復易之日再神效

治傷寒六七日其人不大下後脉沈遲手足厥

逆下部脉不至咽喉不利唾膿血泄利不止為難治者方

麻黃

知母

萎蕤

一作黃芩

升麻

芍藥

當歸

乾薑

石膏

茯苓

白朮

桂心

甘草

麥門冬各貳兩

右十四味以水一斗先煮麻黃減一升去上沫次內諸藥煮取三升分服一升微取汗愈

治濕毒及傷寒內虛外熱攻胃下黃赤汁及爛肉汁赤滯下伏氣腹痛諸熱毒方

枳子

黃柴枝

豉青升

薤白青擇

右三味以水四升先煮枳子薤白令熟次內豉煮取二升半分二服頻服取瘥

治病後虛腫方

豉伍升

醇酒壹斗

右一味煮二沸及執頓服不耐酒者隨性覆取汗

金方十一

六

治汗不止方

地黃二斤切以水一斗煮取三升分三服

又方白朮葉作飲飲之

又方白朮方寸匕以飲服之

治卒得汗不止方

溫酒服牛羊脂

又方服桑亦止

治盜汗及汗無時方

韭根四十九枚水一升煮一升頓服

又方豉一升以酒一升漬二日服不瘥更合服不過二劑

即止

又方死人席緣燒灰煮汁洗身瘥

止汗方



杜仲

牡蠣各等分

右一味治下篩臨夜卧以水服五錢匕

又方牡蠣

雷丸

麻黃根各等兩

乾薑

甘草各壹兩

米粉貳升

右六味治下篩隨汗處粉之

治即盜汗風虛頭痛方

牡蠣

白朮

防風各等兩

右三味治下篩酒服方寸匕日一止汗無出此方一切

泄汗服之三日皆愈神驗

勞復第一論一首

食忌九條

論曰凡執病新瘥及大病之後食猪肉及羊血肥魚油膩等必當大下利醫所不能治也必至於死若食餅餌菜黍

方十一

七

詔哺鱸炙棗栗諸菓物脯脩及堅實難消之物胃氣尚虛弱不能消化必更結熱適以藥下之則胃氣虛冷大利難禁不下之必死下之復危皆難救也熱病及大病之後多坐此死不可不慎也

病新瘥後但得食糜粥寧少食冷飢慎勿飽不得他有所食雖思之勿與之也引日轉久可漸食羊肉白糜若羹汁雉兔鹿肉不可食 猪狗肉也新瘥後當靜卧慎勿早起梳頭洗面非但體勞亦不可多言語用心使意勞煩凡此皆令人勞復故督郵顧子獻得病已瘥未健詣華敷視脉曰雖瘥尚虛未得復陽氣不足慎勿勞事餘勞尚可女勞則死當吐舌數寸其婦聞其夫瘥從百餘里來省之經宿交接中間二日發熱口噤臨死舌出數寸而死病新瘥未

病後百日氣力未平復而以房室者略無不死有士蓋平病  
疾愈後六十日已能行射獵以房室即吐涎而死及乳病  
房室名爲陰陽易之病皆難治多死近者有一士大夫小  
得傷寒瘥已十餘日能乘馬行來自謂平復以房室即小  
腹急痛手足拘攣而死

時病瘥後未滿五日食一切肉麪者病更發大困

時病瘥後新起飲酒及韭菜病更發

時病新瘥食生魚鮓下利必不止

時病新瘥食生菜令顏色終身不平復

時病新汗解飲冷水者損心胞令人虛補不復

時病新瘥食生棗及羊肉者必膈上作熱蒸

時病新瘥食大羊等肉者作骨中蒸熱

時病新瘥食魚肉與瓜生菜令人身熱熱一木作腫

時病新瘥食蒜鱸者病發必致大困

**黃龍湯**治傷寒瘥後更頭痛壯熱煩悶方仲景名小柴胡湯

柴胡半斤 半夏半升 黃芩參三兩 人參

甘草各貳兩 生薑肆兩 大棗拾貳枚

右七味以水一斗煮取五升去滓服五合日三不  
嘔而渴者去半夏加栝蒌根四兩

補大病後不足虛勞方萬病虛勞同用

取七歲已下五歲已上黃牛新生者乳一升以水四  
升煎取一升如人體溫稍稍飲之不得過多十日服

不絕爲佳

治傷寒溫病後勞復或食或飲或動作方

梔子人

參朮枚

石膏

伍兩

鼠屎

尖頭大者 貳拾枚

香豉

壹升

右四味以水七升煮取三升分三服

治病後勞復或因洗手足或梳頭或食等勞復方

取洗手足汁飲一合又取頭中垢如棗核大吞一枚

**枳實梔子湯**

治大病已後勞復者方

枳實

參枚

梔子

拾肆枚

豉

壹升綿裹

右三味以水七升先煎減三升次內枳實梔子

煮取二升次內豉煮五六沸去滓分再服覆取汗如有

宿食者內大黃如博棊子五六枚

治病新瘥遇美飲食食過多食復者方

取所食餘燒為末飲調服一錢匕日三服

金方十一

水

治新瘥早起及食多勞復方

豉

伍合

鼠屎

貳拾壹枚尖頭者

右二味以水二升煮取一升盡服之溫臥令小汗愈崔氏

加梔子柒枚尤良肘後有麻子人內壹升加水壹升亦可內枳實參枚葱白壹升

治重病新瘥早起勞及飲食多致發欲死方

燒龜甲末飲服方寸匕

治食大飽不消勞復脈實者方

豉

壹升

鼠屎

貳拾枚

梔子

柒枚

大黃

參兩

右四味以水六升煮取二升分三服微取汗應小

鴨溲者止不溲者復作

治勞復垂死方

暖湯二合洗四五歲女子陰取汁內口中服即愈小

勞復

男兒亦得

**麥門冬湯**治勞復氣欲絕起死人方

麥門冬壹兩 甘草貳兩 京棗二拾枚 竹葉切壹升

右四味咬咀以水七升煮粳米一升令熟去米內諸藥煎取三升分三服不能服者綿滴湯內口中用之有效治食勞方

麩二升煮取汁服之

**又方**杏人五十枚以酢二升煎取一升服之取汗

**又方**燒人屎灰水服方寸匕

欲令病人不復方

燒頭垢如梧子大服之

治傷寒瘥後一年心下停水不能食方

生地黃伍斤 白朮壹斤 好麩貳斤

右三味合搗令相得曝乾下篩酒服方寸匕日三加至

二匕

論曰婦人溫病雖瘥未苦平復血脈未和尚有熱毒而與之交接得病者名為陰易之病其人身體重熱上衝鬢頭重不能舉眼中生眵一作膜四肢一作膝拘急小腹絞痛手足拳臂即死其亦有不即死者病苦小腹裏急熱上衝鬢頭重不欲舉百節解離經脈緩弱血氣虛骨髓竭便噓噓吸吸氣力轉少著牀不能動搖起止仰人或引歲月方死醫者張苗說有婢得病瘥後數日有六人姦之皆死治婦人得病易丈夫丈夫得病亦易婦人方

取女人中裨近隱處燒服方寸匕日三小便即利陰

頭微腫此為愈矣女人病可取男棍一如此法

治交接勞復陰卵腫縮腹中絞痛便欲死方

取所交接婦人衣裳以覆男子立愈

令病人不復方

取女人手足爪二十枚女人中衣帶一尺燒以酒若米飲汁服之

治男子新病起近旁內復者方

取女人月經赤帛燒服方寸匕亦治陰卵腫縮入腹絞痛欲死

治病後髮亂不可理通頭法

生麻油二升將頭髮解開安銅沙羅中用油淹漬之

細將叙子領髮斯須並自通

金方十一  
論一首 方七首  
百合病第二

論曰百合病者謂無經絡百脉一宗悉致病也皆因傷寒虛勞大病已後不平復變成斯病其狀惡寒而嘔者病在上焦也二十三日當愈其狀腹滿微喘大便堅三四日一大便時復小溏者病在中焦也六十二日當愈其狀小便淋瀝難者病在下焦也三十三日當愈各隨其證以治之百合之為病令人意欲食復不能食或有美時或有不用聞飲食臭時如有寒其實無寒如有熱其實無熱常默默欲卧復不得眠至朝口苦小便赤澀欲行復不能行諸藥不能治治之即劇吐利如有神靈所為也百合病身形如和其脉微數其候每溺時即頭覺痛者六十日乃愈百合病候之溺時頭不覺痛漸漸然寒者四十日愈百合病候

之滿時覺快然仰覺頭眩者二十日愈百合病證其人或  
未病而豫見其候者或已病四五日而出或病一月二十  
日後見其候者治之喜誤也依證治之

論曰百合病見在於陰而攻其陽則陰不得解也復發其  
汗為逆也見在於陽而攻其陰則陽不能解也復下之其

病不愈要畧云見於陰者以陽法救之見於陽者以陰法  
攻陽乃復下之此亦為逆其病難治

**百合知母湯**治百合病已經發汗之後更發者方

百合茶枝擘 知母參兩

右二味以泉水先洗漬百合一宿當沫出水中明日去  
水取百合更以泉水二升煮取一升汁置之復取知母  
切以泉水二升煮取一升汁合和百合汁中復煮取一

升半分再服不差更依法合服

**百合滑石代赭湯**治百合病已經下之後更發者方

百合茶枝擘 滑石參兩 代赭壹兩

右二味先以泉水漬百合一宿明日去水更以泉水二  
升煮百合取一升去滓又以水二升煮餘二味取一升  
內百合汁如前法復煎取一升半分再服

**百合雞子湯**治百合病已經吐之後更發者方

百合七枚擘浸一宿去汁以泉水二升煮取一升取  
雞子黃一枚內汁中攪令調分再服

**百合地黃湯**治百合病始不經發汗吐下其病如初者方

百合七枚擘浸一宿去汁以泉水二升煮取一升內  
生地黃汁一升復煎取一升半分再服大便當去

沫為候也

治百合病經月不解變成渴者方

百合根一升以水一斗漬一宿以汁先洗病人身洗  
身後食白湯餅勿與鹽豉也渴不瘥可用栝蒌根并  
牡蠣等分為散飲服方寸匕日三

治百合病變而發熱者方

百合根壹兩 乾之 滑石叁兩

右一味治下篩飲服方寸匕日二當微利利者止勿復  
服熱即除一本云治百合病小便赤澀臍下堅急

治百合病變腹中滿痛者方

但取百合根隨多少熬令黃色擣篩為散飲服方寸  
匕日二滿消痛止

傷寒不發汗變成狐惑病第四方論一首

論曰狐惑之病其氣如傷寒默默欲眠目不得閉起臥不  
安其毒在喉咽為惑病在陰肛者為狐病狐惑之病並惡  
食飲不欲食聞食臭其面目翕赤翕白翕黑毒食於上者  
則聲喝也作喝毒食下部者則乾咽也此由溫毒氣所為  
食於上者瀉心湯主之食於下者苦參湯淹洗之食於肛  
外者熏之并用雄黃二片稍置瓦餅中炭火燒向肛熏之  
并服湯也

治狐惑湯方

黃連

薰草各肆兩

右一味咬咀白酢漿一斗漬一宿煮取二升分為二服

其入脉數無熱微煩默默但欲臥汗出初

得之三四日眼赤如鳩眼得之七八日其四皆黃黑能令  
者膿已成也治之方

以赤小豆三升漬之令生牙足乃復乾之加當歸二  
兩為末漿水服方寸匕日二即愈

**心湯**其病形不可攻不可灸因火為邪血散脈中傷脈  
尚可傷藏則劇并輸益腫黃汁出經合外爛肉腐為癰膿  
此為火疽醫所傷也夫脈數者不可灸因火為邪即為煩  
因虛逐實血走脈中火氣雖微內攻有力焦骨傷筋血難  
復也應在瀉心瀉心湯兼治下痢不止腹中幅堅而嘔吐  
腸鳴者方 仲景名半夏瀉心要畧名甘草瀉心

半夏 半升  
黃芩 人參  
甘草 各參兩 黃連 壹兩 大棗 拾貳枚 乾薑

右七味以水一斗煮取六升分服一升日二

傷寒發黃第五方論一首 針灸圖二首

論曰黃有五種有黃汗黃疸穀疸酒疸女勞疸黃汗者身  
體四肢微腫胃滿不渴汗出如黃蘗汁良由大汗出卒入  
水中所致黃疸者一身面目悉黃如橘柚暴得熱以冷水  
洗之熱因留胃中食生黃瓜熏上所致若成黑疸者多死  
穀疸者食畢頭眩心忪怫鬱不安面發黃由失飢大食胃  
氣衝熏所致酒疸者心中懊痛足脛滿小便黃面發赤斑  
黃黑由大醉當風入水所致女勞疸者身目皆黃發熱惡  
寒小腹滿急小便難由大勞大熱而交接竟入水所致但  
依後方治之

黃汗之為病身軀洪腫發熱汗出不渴狀如風水汗流



已正黃如藥汁其脉自沈從何得之此病以汗出入水中  
浴水從汗孔入得之

**黃耆湯**治黃汗方

黃耆

伍兩

芍藥

叁兩

桂心

叁兩

右二味以苦酒一升水七升合煎取三升飲一升  
當心煩也至六七日稍稍自除心煩者苦酒阻故也

黃疸之病疸而渴者其病難治疸而不渴其病可治發於  
陰部其人必嘔發於陽部其人振寒而微熱

**桂枝黃耆湯**諸病黃疸宜利其小便假令脉浮當以汗解

桂枝

伍兩

芍藥

伍兩

生薑

各叁兩

甘草

貳兩

黃耆

伍兩

大棗

拾貳枚

右六味以水八升微火煎取三升去滓溫服一升  
金方十一 十九

覆取微汗須臾不汗者飲稀粥以助湯若不汗更服湯

**麻黃酒湯**治傷寒熱出表發黃疸方

麻黃二兩以醇酒五升煮取一升半盡服之溫覆汗  
出即愈冬月寒時用清酒春月宜用水

治黃疸方

瓜蒂

秫米

赤小豆

各貳柒枚

右二味治下篩病重者取如大豆二枚內著鼻孔中痛  
縮鼻須臾當出黃汁或從口中出汁升餘則愈病輕者

如一豆不瘥間日復用又下里間以筒使人極吹鼻中  
無不死大慎之

刪繁察天行毒熱通貫藏腑沈伏骨節  
黃等病喘息  
須臾不絕

**大黃**治同前

木黃

華藤子各二兩

右一味為末蜜和丸如梧子大未食服十九日二病瘥止

**又方**

大黃貳兩 黃連參兩 黃蘗各壹兩 黃芩各壹兩 麴衣伍合

右五味為末蜜和丸如梧子大先食服三九日二不知加至五九

**因黃湯**

治黃疸身體面目盡黃方

茵陳

黃連各參兩

黃芩貳兩

黃芩貳兩

大黃

甘草

人參各壹兩

梔子貳拾柒枚

右七味以水一斗煮取三升分三服日三亦治酒

疸酒癖

**黃散**

治同前

金方十一

十六

大黃

黃連

黃芩各肆兩

右三味治下篩先食服方寸匕日三亦可為丸

**五苓散**

治黃疸利小便方

猪苓

茯苓

澤瀉

白朮

桂心各壹兩

右五味搗篩為散渴時水服方寸匕極飲水即利小便

及汗出愈

此方與第九卷方相重以分兩不同故重出

**秦椒散**

治黃疸飲少弱多方古今錄驗

治膏瘕

秦椒陸赫

瓜蒂半兩

右一味治下篩水服方寸匕日二

**小半夏湯**

治黃疸小便色不異欲自利

腹滿而喘者不可

除執執除必噦方

半夏

生薑各半斤

右二味咬咀以水七升煮取一升五合分再服有人積氣結而死其心上暖以此湯少許汁入口遂活

治黃疸方

取生小麥苗搗絞取汁飲六七合晝夜三四飲三四日便愈無小麥種麥亦得用

治黃疸變成黑疸醫所不能治者方

土瓜根搗汁一小升頓服日一平旦服至食時病從

小便出先須量病人氣力不得多服力衰則起不得

治發黃身面目悉黃如金色小便如濃煮藥汁衆醫不能療者方

茵陳

梔子各肆兩 黃芩

大黃

柴胡

升麻各叁兩 龍膽貳兩

方十七

右七味咬咀以水八升煮取二升七合分三服若身體

羸去大黃加梔子延年秘錄無五六兩生地黃一升茵陳有梔子

肆兩括婁叁兩芒消貳兩近效方加枳實貳兩夫黃發已久變作桃皮色心下

有堅嘔逆不下飲食小便極赤色少四肢逆冷脉深沈

極微細遲者不宜服此方得下必變碗也宜與大茵陳

湯除大黃與生地黃五兩服湯盡消息看脉小浮出形

小見不甚沈微便可治也脉浮見者黃當明不復作桃

皮色心下自寬也大茵陳湯方出次後十一味者是

苦參

治人無漸忽然振寒發黃皮膚黃麴塵出小便赤

少大便時秘氣力無異食飲不妨已服諸湯散餘熱不除

又黃者宜吐下方

苦參

黃連

瓜蒂

茵陳

大黃 各壹兩

葶藶 貳兩

若六味治下諸飲服方寸匕當大吐吐者日一服不吐日再亦得下服五日知可消息不覺退更服之小折便消息之

治發黃方

茵陳

黃蘗

梔子

大黃 各叁兩

黃連 貳兩

右五味以水九升煮取三升分三服先服湯後服丸方

大黃 伍兩

茵陳

梔子 各叁兩

黃芩

黃蘗

黃連 各貳兩

右六味為末以蜜丸如梧子大白飲服二十九令微利

麻黃連翹赤小豆湯

治傷寒發熱在裏身體必發黃方

麻黃

連翹

甘草 各貳兩

生薑 叁兩

大棗 貳拾枚

杏仁 伍拾枚

赤小豆 壹升

生梓白皮 切貳升

右八味以水一斗先煮麻黃去沫次內諸藥煎取三升分三服

茵陳湯

治傷寒七八日內實發熱結身黃如橘小便不利

腹微脹滿宜下之方

茵陳 陸兩

大黃 叁兩

梔子 肆拾枚

右三味以水一斗一升先煮茵陳取五升去滓次內梔子大黃煎取三升分服一升日三小便當利如皂莢沫狀色正赤當腹減黃悉隨小便去也范注用煎散煎小品方用

石膏 壹斤

大黃黃腹滿小便不利而赤自汗出此為表

黃芩方

當下之方

大黃參兩 黃蘗

芒消各肆兩 梔子拾伍枚

右四味以水六升煮取一升去滓內芒消復煎取一升先食頓飲之

**因陳圓** 治時行病急黃并瘴癘疫氣及瘖瘡方

茵陳 梔子 芒消 杏仁各參兩 巴豆壹兩

恒山 鼈甲各貳兩 大黃 豉各伍兩

右九味為末以錫為丸如梧子大飲服三九以吐利為佳不知加一九初覺體氣有異急服之即瘥神方

治急黃熱氣骨蒸兩目赤脈方

芒消壹兩 生地黃汁捌合 大黃壹兩半末

右二味合和一服五合日二以利為度不須二服

治風疸小便或黃或白洒洒寒熱好臥不欲動方

三月生艾壹束燒取灰 大黃 黃連

凝水石 枯薑根 苦參 葶藶各陸銖

右七味六味為末以艾煎和丸如梧子大先食服五九日二可至二十九有熱加苦參渴加枯薑小便澀加葶藶

澀小便多加凝水石小便白加黃連大便難加大黃

濕疸之為病始得之一身盡疼發熱而色黑黃七八日後壯熱熱在裏有血當下去之如純肝狀其小腹滿者急下

之亦治一身盡黃目黃腹滿小便不利方

礬石 滑石各伍兩

右二味治下篩以大麥粥汁服方寸匕日二先食服之便利如血者已當汗出瘥

寸口脈浮而緩浮則為風緩則為痺非中風四肢不  
脾色必黃於熱以行跗陽脈緊而數數則為熱熱則消  
緊則為寒食則滿也尺脈浮為傷腎跗陽脈緊為傷脾  
寒相薄食穀即眩穀不消胃中苦濁濁氣下流小便不  
通陰被其寒熱流膀胱則故盡黃名曰穀疸

治勞疸穀疸九方

苦參

參三冊

龍膽

參二冊

右一味為末牛膽和為丸如梧子大先食以麥粥飲服  
五九日二不知稍加之

剛繁方加梔子人參  
淡粉以猪膽和丸

夫酒疸其脈浮者先吐之沈弦者先下之夫人病酒疸者  
或無熱靖言了了腹滿欲吐嘔者宜吐之方前苦參散七  
味者是酒疸必小便不利其候當心中熱足下熱是其證

也夫酒疸下之久久為黑疸目青面黑心中如啖蒜薑狀  
大便正黑皮膚爪之不仁其脈浮弱雖黑微黃故知之

治傷寒飲酒食少飲多痰結發黃酒疸心中  
懊懣而不甚熱或乾嘔方

枳實

伍枚

大黃

參兩

豆豉

半升

梔子

柒枚

右四味以水六升煮取一升分三服心中熱疼懊  
懣皆主之

治肉疸飲少小便多如白泔色此病得之從酒

凝水石

白石脂

枯薑根

桂心

各參拾銖

菟絲子

知母

各以拾銖

右六味治下節麥粥飲服五分已日二服五日知十日

**圓**治心下縱橫堅而小便赤是酒疸者方

茯苓

茵陳

乾薑

白朮

枳實

半夏

杏仁

甘遂

蜀椒

當歸

右十味為末蜜和丸如梧子大空腹服三九日二稍稍

加以小便利為度茵陳九拾黑身體開小便

**半夏湯**治酒癖陰脅心脹滿骨肉沉重逆害飲食乃至小

便赤黃此根本虛勞風冷飲食衝心由脾胃內痰所致方

半夏

生薑

黃芩

茵陳

當歸

枳實

甘草

大戟

白朮

右十一味以水一斗煮取三升分二服

**牛膽圓**治酒疸身黃麴瘰出方

牛膽

黃芩

羌活

瓜蒂

大黃

枳實

右五味四味以清酒一斗漬一宿煮減半去滓內

牛膽微火煎令可丸如大豆服一丸日移六七尺不知

復服一丸至八九丸膈上吐膈下下或不吐而自愈

**大茵陳湯**治內實熱盛發黃如金色脈浮大滑實緊數

者夫發黃多是酒疸發熱食少胃中熱或溫毒內熱者故

黃如金色方

茵陳

黃蘗

石膏

白朮

黃芩

甘草

茯苓

枳實

前胡

枳實

茯苓

枳實

右十一味以水一斗煮取三升分三服得快下消

息三四日更治之

圓治氣淋腫小腹大身體面有赤黃及酒疸短氣  
付真方

茵陳 天門冬 梔子 各肆兩 大黃

桂心 各叁兩 通草 石膏 各貳兩 半夏 半升

右八味熬大黃通草天門冬半夏梔子曝令乾合搗篩  
蜜丸如大豆服三九日三忌生魚以豆羹服不得用酒  
一方去石膏內滑石二兩不知加至十丸

黃家至日晡所發熱而又惡寒此為女勞得之當臍臑急  
小腹滿體盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹臙脹而滿  
如欲作水狀大便必黑時澹泔此女勞疸非水也腹滿者  
難治

石麥石龍 治女勞疸方

消石 滑石 各半兩

右二味治下節大麥粥汁服方寸匕日三重衣覆取汗  
病隨大小便出小便正黃大便正黑

黃疸之為病日晡所發熱惡寒小腹急身體黃額黑大便  
澹黑足下熱此為女勞腹滿者難治治之方

滑石 石膏 各等分

右二味治下節以大麥粥汁服方寸匕日三小便極利  
則瘥

針灸黃疸法

○正面圖第一  
黃門 上斷裏 俠人中 俠承漿 巨關 上唇裏

黃門穴從鼻頭直入髮際度取通絡穴為二斷繩取一分

黃門穴從鼻頭直入髮際度取通絡穴為二斷繩取一分



入髮際當繩頭針是穴治馬黃黃疸等病

上齒裏穴正當人中及脣針二鏗治馬黃黃疸等病

上腭穴入口裏邊在上縫赤白脉是針二鏗治馬黃黃疸

四時等病

舌下穴俠舌兩邊針治黃疸等病

脣裏穴正當承漿裏邊通齒斷針二鏗治馬黃黃疸寒暑

溫疫等病

顛顛穴在眉眼尾中間上下有來去絡脉是針灸之治四

時寒暑所苦疸氣溫病等

俠人中穴火針治馬黃黃疸疫通身並黃語音已不轉者

俠承漿穴去承漿兩邊各一寸治馬黃急疫等病

巨闕穴在心下一寸灸七壯治馬黃黃疸急疫等病

金華方十一

廿三

上管穴在心下一寸灸七壯治馬黃黃疸等病

男陰縫穴拔陰反向上灸治馬黃黃疸等病

若女人玉門是穴男女針灸無在

○覆面圖第二

風府

熱府

肺輸

心輸

風府穴在項後入髮際一寸去上骨一寸針之治頭中百

病馬黃黃疸等病

熱府穴在第一節下兩傍相去各一寸五分針灸無在治

馬黃黃疸等病

肺輸穴從大椎數第二椎兩傍相去各一寸五分灸主黃

疸通治百毒病

心輸穴從肺輸數第一椎兩傍相去各一寸五分

肝輸穴從心輸數第四椎兩傍相去各一寸五分

外經黃疸治法

脾輸穴從肝輸數第一推兩傍相去各一寸五分

腎輸穴從脾輸數第二推兩傍相去各一寸五分  
脚後跟穴在白肉後際針灸隨便治馬黃黃疸寒暑諸毒  
等病

○側面圖第二 耳中 脾石子頭 錢孔 手太陽 太衝

耳中穴在耳門孔上橫梁是針灸之治馬黃黃疸寒暑疫  
毒等病

頰裏穴從口吻邊入往對頰裏去口一寸針主治馬黃黃  
疸寒暑溫疫等病頰兩邊同法

手太陽穴手小指端灸隨年壯治黃疸  
臑石子頭穴還取病人手自捉臂從腕中大澤澤當文向

上一夫接白肉際灸七壯治馬黃黃疸等病  
錢孔穴度乳至臍中屈肋頭骨是灸百壯治黃疸

太衝穴針灸隨便治馬黃溫疫等病

溫瘧第六論一首 方二十四首 灸刺法 穰瘧法一首 符二首

論曰夫瘧者皆生於風夏傷於暑秋為瘧瘧也問曰瘧先

寒而後熱者何也對曰夫寒者陰氣也風者陽氣也先傷  
於寒而後傷於風故先寒而後熱也病以時作名曰寒瘧

問曰先熱而後寒者何也對曰先傷於風而後傷於寒故  
先熱而後寒也亦以時作名曰溫瘧其但熱而不寒者陰

氣先絕陽氣獨發則少氣煩悶手足熱而欲嘔名曰瘧瘧  
問曰夫病溫瘧與寒瘧而皆安舍舍於何藏對曰溫瘧者

得之冬中於風寒氣藏於骨髓之中至春則陽氣大發邪  
氣不能自出因遇大暑腦髓鑿肌肉消腠理發壯因有所

用力邪氣與汗皆出此病邪氣先藏於腎其氣先從內出之於外也如是則陰虛而陽盛盛則病矣衰則氣復反入入則陽虛虛則寒矣故先熱而後寒名曰溫瘧問曰瘧瘧何如對曰瘧瘧者肺素有熱氣盛於身歎逆上衝中氣實而不外泄因有所用力腠理開風寒舍於皮膚之內分肉之間發則陽氣盛陽氣盛而不衰則病矣其氣不及於陰故但熱而不寒氣內藏於心而外舍於分肉之間令人消鑠脫肉故命曰瘧瘧夫瘧之曰發也陰陽之曰移也必從四肢始也陽已傷陰從之故氣未并先其時一食頃用細左索緊束其手足十指令邪氣不得入陰氣不得出過時乃解

夫瘧脈自弦也弦數者多熱弦遲者多寒弦小緊者可下之弦遲者可溫遲若脈緊數者可發汗針灸之脈浮大者吐之瘧脈弦數者風發也以飲食消息止之

瘧歲歲發至二三歲或連月發不解者以脅下有痞也治之不得攻其痞但得虛其津液先其時發其汗服湯已先小寒者引衣自覆汗出小便利即愈瘧者病人形瘦皮上必粟起也病瘧一日發當以十五日愈設不瘥當月盡解也今不愈當云何師曰此病結為癥瘕名曰瘧母急當治之

**醫方** 主之方

成死翳

拾貳斤治如食法要畧作翳用參兩

半夏

人參

大戟

各陸銖 瞿麥

阿膠

紫葳

一作紫苑 牡丹皮

石膏

乾薑

大黃

厚朴

桂心

海藻

要畧作赤消

葶藶

蜣螂

各拾銖 蜂窠

挑人 巧藥各書 烏羽燒 一作烏羽

黃芩 各拾兩 廣蟲 文各拾兩 氣蟲 文各拾兩

右二十四味為末取鍛竈下灰一斗清酒一斛五斗以酒漬灰去灰取酒著甕其中煮蠶盡爛液液如漆絞去滓下諸藥煎為丸如梧子大未食服七九日仲景方無大戟

**柴胡栝婁根湯** 治瘧而發渴者方

柴胡 黃耆 人參 甘草

生薑 各參兩 大棗 貳拾枚 栝婁根 肆兩

右七味咬咀以水一斗二升煮取六升去滓煎取三升溫服一升日三

**牡蠣湯** 牡瘡者多寒治之方 牡瘡一作牡癩

牡蠣 麻黃 各肆兩 蜀椒 參兩 甘草 貳兩

右四味先洗蜀椒三過去腥咬咀以水八升煮蜀椒麻黃得六升去沫乃內餘藥煮取二升飲一升即吐出復飲之

**蜀椒散** 多寒者牡瘡也治之方

蜀椒 雲母 龍骨 各等分

右三味治下篩先未發一炊頃以酢漿服半錢臨發服一錢溫瘡者加蜀椒半分雲母取火燒之二日二夜要用雲母不用雲母

有瘰癧者陰氣孤絕陽氣獨發而脉微其候必少氣煩滿手足熱欲嘔但熱而不寒邪氣內藏於心外舍於分肉之間令人消爍脫肉也

有溫瘧者其脈平無寒時病六七日但見熱也其候骨節  
痠煩時嘔朝發暮解暮發朝解名溫瘧

**白虎加桂湯** 治之方

石膏 壹斤 知母 陸兩 甘草 貳兩 粳米 陸合

右四味以水一斗一升煮米爛去滓加桂心三兩  
煎取三升分三服覆令汗先寒發熱汗出者愈

**麻黃湯** 治瘧酒發汗方

麻黃 括萎根 大黃 各肆兩 甘草 壹兩

右四味以水七升煮取二升半分三服未發前食  
頃一服臨發一服服後皆厚覆取汗

治瘧或間日發者或夜發者方

恒山 竹葉 各叁兩 秫米 壹伯粒 石膏 捌兩

卷之十一 十七

右四味以水八升銅器中漬藥露置星月下高淨  
處橫刀其上明日取藥於病人房中以銅器緩火煎取  
三升分三服清旦一服未發前一食頃一服臨發一服  
三服訖靜室中臥莫與人語當一日勿洗手面及漱口  
勿進食取過時不發乃澡洗進食并用藥汁塗五心胃  
前頭面藥滓置頭邊曾用神驗 救急方用烏梅貳枚

**又方** 先作羊肉臠麪餅飽食之并進少酒隨所能其令欣

欣有酒氣入密室熏燃炭火厚覆取大汗即瘥

**又方** 燒黑牛尾頭毛作灰酒服方寸匕日二

**恒山圓** 治瘧瘧說不可具方

恒山 知母 甘草 大黃 各肆兩 麻黃 壹兩

右五味為末蜜和丸如梧子大未食服五九日 一不

漸增以瘥為度用後無大黃

**又方**治瘥經數年不瘥者兩劑瘥一月已來一劑瘥方  
恒山三兩為末以雞子白和併手丸如梧子大置銅  
椀中於湯中煮令熟殺腥氣則止以竹葉飲服二十  
丸欲吐但吐至發令得二服時早可斷食時晚不可  
斷食可竹葉汁煮藥少食之

**梔子湯**治同前

梔子拾肆枚 秫米拾肆升 恒山參兩 車前葉貳束枚炙乾

右四味咬咀以水九升煮取三升分三服未發一服發  
時一服發後一服以吐利四五行為瘥不止冷飯止之  
治老瘥久不斷者方

恒山參兩 烏賊骨 升麻 鼈甲 附子各壹兩

右五味咬咀絹袋盛以酒六升漬之小令近火轉之  
宿成一服一合比發可數服或吐下

治瘥無問新久者方

小便壹升半 蜜參匕

右二味煮三沸頓服每發日平日時服自至發勿食重  
者漸退不過三服瘥

**又方**鼠尾子 車前子各壹虎口

右二味咬咀以水五升煮取一升未發前服盡

**又方**馬鞭草汁五合酒二合分二服

**又方**擣葦苕根燒為灰和水服一合量人大小強弱用之

**又方**瓜蒂二七枚擣水漬一宿服之

**又方**常以七月上寅日採麻花為末酒服方寸匕

故鞋底去兩頭燒作灰并花水服之

又方服翹搖汁

又方桃花末水服方寸匕

治瘡方

鼈甲方寸炙

烏賊骨方貳寸附子炮

甘草各壹兩

恒山貳兩

右五味以咀以酒一升半漬之露一宿明日塗患處心手足過發時瘡斷若不斷可飲一合許瘡

蜀椒治勞瘡并治積勞寒熱發有時似瘡者方

升麻各叁拾銖

麥門冬

知母

白薇

地骨皮

升麻各叁拾銖

甘草

鼈甲

烏梅肉

菱蕤各壹兩

恒山壹兩

石膏貳兩

肢壹合

右十二味為末蜜和丸如梧子大飲服十九日再服之

稍稍加至二三十丸此神驗無不瘥也加光明砂一兩

治寒熱勞瘡久不瘥形體羸瘦痰結腎堂食飲減少或因行遠久經勞役患之積年不瘥服之神效方

烏梅肉

豆豉各壹合

升麻

地骨皮

柴胡

鼈甲

恒山

前胡各壹兩

肉苁蓉

玄參

百合

蜀椒

桂心

人參

知母各半兩

桃人

捌拾

右十六味為末蜜丸如梧子大飲服十九日二服老

治勞瘡積時不斷最治無效者方

生長大牛膝一握切以水六升煮取一升分再服

服取未發前食頃第一服取時

治脾行後變成癰瘡方

桂心各一兩 連志 桔梗 芎藭各一兩 茯苓

乾地黄 芍藥 人參 白朮 當歸

黃耆 甘草各一兩 竹葉伍兩 大棗貳拾 生枸杞

生薑伍兩 半夏 麥門冬各壹升

右十八味以水二斗煮竹葉枸杞取二斗次內諸藥煎取六升分六服一日一夜令盡

鯉湯 治下寒下熱下有乍無山瘴瘧方

鯉甲拾肆枚 鱉甲 烏賊骨各壹兩

恒山叁兩 附子壹枚

右五味以酒二升漬一夕發前稍稍啜飲勿絕吐之兼以塗身斷食過時乃食飲

烏梅圓 治肝邪熱為瘧令人顏色蒼蒼氣息喘悶戰掉狀

如死者或久熱勞微動如瘧積年不瘥方

烏梅肉 蜀椒 鼈甲 萎蕤

知母 苦參各壹兩 恒山壹兩半 石膏壹兩

甘草 細辛各拾 香豉壹合

右十一味為末蜜丸如梧子大酒服十九日再飲

治心熱為瘧不止或止後熱不歇乍來乍去令人煩心甚飲飲清水反寒多不甚熱者方

甘草壹兩 蜀椒叁兩 恒山 鼈甲各肆 石膏伍兩

香豉壹合 梔子 烏梅拾枚 淡竹葉貳升

右九味以水九升煮取三升分三服

治脾熱為瘧或渴或不渴熱氣內擾不泄令人嘔



大腹中痛腸中鳴汗出方

恒山 參兩

甘草 半兩

知母

鼈甲 各壹兩

右四味為末蜜丸如梧子大未發前酒服十九臨發時一服正發時一服

**恒山湯**

治肺執痰聚胃中來去不定轉而為瘧其狀令人

心寒寒其則發熱熱間則善驚如有所見者方

恒山 參兩

甘草 半兩

秫米 參伯貳拾粒

右三味以水七升煮取二升分三服至發時令三服盡

**灸方**

治腎執發為瘧令人淒淒然腰脊痛死轉大便難目

眴眴然身掉不定手足寒方

恒山 參兩

烏梅 參兩

竹葉 切壹升

香豉 捌合

葱白 壹握

右五味以水九升煮取二升分二服至發令盡

**藜蘆圓**

五臟並有瘧候六腑則無獨胃腑有之胃腑瘧者

令人日病也善飢而不能食食而支滿腹大治之方

藜蘆

恒山

皂莢

牛膝 各壹兩

巴豆 參拾枚

右五味先熬藜蘆皂莢色黃合搗為末蜜丸如小豆大日服一九止發時一九一日勿飽食 肘後無恒山牛膝

刺灸法

肝瘧刺足厥陰見血

心瘧刺手少陰

脾瘧刺足太陰

肺瘧刺手太陰陽明

腎瘧刺足少陰太陽

胃瘧刺足太陰陽明橫脈出

凡灸瘧者必先問其病之所發者先灸之從頭項發者於未發前預灸大椎尖頭漸灸過時止從腰脊發者灸腎輸

溫瘧

百壯從手臂發者灸三間

癰灸上星及大椎至發時令滿百壯灸艾炷如黍米粒俗人不解取穴務大炷也

覺小異即灸百會七壯若後更發又七壯極難愈者不過

三灸以足踏地以線圍足一匝中折從大椎向百會灸線

頭三七壯炷如小豆 又灸風池二穴三壯

一切癰無問遠近正仰臥以線量兩乳間中屈從乳向下

灸度頭隨年壯男左女右

五臟一切諸癰灸尺澤七壯穴在肘中約上動脈是也

諸癰血脈不見者刺十指間出血血去必已先視身之赤

如小豆者盡取之 癰刺足少陰血出愈

瘡癰上星主之穴在鼻中央直髮際一寸陷谷且是也灸

七壯先取譙譙後取天牖風池

瘡日西而發者臨泣主之穴在目眦上入髮際五分陷者

灸七壯

瘡實則腰背痛虛則欬衄飛揚主之穴在外踝上七寸灸

七壯

瘡多汗腰痛不能俛仰目如脫項如拔崑崙主之穴在足

外踝後跟骨上陷中灸三壯

攘瘡法

未發前把大雄雞一頭着懷中時時驚動令雞作大

聲立瘡

治瘡符 凡用一符

瘡小兒父字石拔母字石鏗其申 瘡人患瘡人寫

瘡

曰一切天地山水城隍日月五星皆敬竈君今有一瘡

小兒罵竈君作黑面奴若當不信看文書急急如律令

右件符必須真書前後各留白紙一行擬着竈君額

上瓦石壓之不得厭字上勿令人近符若得患遣一

人看符大好亦勿令灰土傳符上致使字不分明出

見著符次第如後若明日日出後發須令人夜掃竈

君前及額上令淨空發日日令患人整衣帽立竈前

讀符使人自讀必須分明讀符勿錯一字每一徧若

別人讀一徧患人跪一拜又以手捉患人一度若患

人自讀自捉衣振云人姓某甲如此是凡三徧讀三

拜了以淨瓦石壓兩角字向上著竈額上勿令壓字

上若瘡日西發具如上法二徧讀符至午時更二徧

讀如上法如夜發日暮更三徧讀並如上法其竈作

食亦得勿使動此符若有兩竈大竈上著符若有露

地竈屋裏竈上著止有露竈依法著之仍須手捉符

其符法如後若有客患會須各經停過二度發二度

委曲着符如上法符亦二各姓名患瘡乞拘錄瘡鬼

小兒如左凡治久患者一着符一漸瘡亦可五度著

符如始可全瘡又須手把符如左

王良符張季伯書之急急如律令

右王良符依法長捲兩手握念佛端坐如須行動檢

校插著曾前字頭向上

右一符各依法一時用不得闕一符萬一不瘡但得一

發輕後發日更讀即瘡一一仔細依法若字參差即不

瘧

診給毒證第七

江東江南諸谿源間有蟲名短狐谿毒亦名射工其蟲無  
目而利耳能聽在山源谿水中聞人聲便以口中毒射人  
故謂射工也其蟲小毒輕者及相逐者射著人影者皆不  
即作瘡先病寒熱身不喜冷體彊筋急頭痛目疼張口欠  
欬嗽呼吸悶亂朝旦少蘇醒晡夕輒復寒熱或似傷寒發  
石散動亦如中尸便不能語病候如此自非其土地人不  
常數行山水中不知其證便謂是傷寒發石散動作治乖  
僻毒盛發瘡復疑是瘰癧乃至吐下去血復恐疑蠱毒是  
以致禍耳今說其狀類以明其證與傷寒別也方見第一  
十五卷中

并

重刊孫真人備急千金要方卷之十



