

重刊孫真人備急千金要方

十三

肝臟脈論第一

論曰夫人稟天地而生故內有五臟六腑精氣骨髓筋脈外有四肢九竅皮毛爪齒咽喉唇舌肛門胞囊以此總而成軀故將息得理則百脈安和役用非宜即為五勞七傷六極之患有方可救雖病無他無法可憑奄然永往所以此之中秩卷卷備述五臟六腑等血脈根源循環流注與九竅應會處所并論五臟六腑等輕重大小長短闊狹受盛多少仍列對治方法丸散酒煎湯膏摩熨及灸針孔穴並窮於此矣其能留心於醫術者可考而行之其冷熱虛實風氣準藥性而用之則內外百病無所逃矣凡五臟在天為五星在地為五穀約時為五行在人為五臟五臟者精神魂魄意也論陰陽察虛實知病源用補瀉應稟二百六十骨節終會通十二經焉

論曰肝主魂為郎官隨神往來謂之魂魂者肝之藏也目者肝之官肝氣通於目目和則能辨五色矣左目甲右目乙循環紫宮榮華於爪外主筋內主血肝重四斤四兩左三葉右四葉凡七葉有六童子三玉女守之神名藍藍主藏魂號為魂藏隨節應會故云肝藏血血舍魂在氣為語在液為淚肝氣虛則恐實則怒肝氣虛則夢見園花生草得其時夢伏樹下不敢起肝氣盛則夢怒歎氣客於肝則夢山林樹木

凡人寢卧血歸於肝肝受血而能視足受血而能步掌受血而能握指受血而能攝

凡肝臟象木與膽合為腑其經足厥陰與少陽為表裏其脈弦相於冬主於春春時萬物始生其氣來濡而弱寬而虛故脈為弦濡即不可發汗弱則不可下寬者開開者通通者利故名曰寬而虛

春脈如弦春脈肝也東方木也萬物之所以始生也故其氣來濡弱輕虛而滑端直以長故曰弦反此者病何如而反其氣來實而弦此謂太過病在外其氣來不實而微此謂不及病在內太過則令人善忘忘當怒忽眩冒而癩疾不及則令人曾痛引背兩脅脹滿

肝脈來濡弱招招如搗竿末梢曰平葉源作綿綿如按琴瑟之絃如搗長竿春以胃氣為本肝脈來盈實而滑如循長竿曰肝病肝脈來急而益勁如新張弓弦曰肝死

真肝脈至內外急如循刀刃青黃然葉源作如按琴瑟絃

脾源作如色青白不澤毛折乃死

春胃微弦曰平弦多胃少曰肝病但弦無胃曰死胃而有毛曰秋病毛甚曰金病

肝藏血血舍魂悲哀動中則傷魂魂傷則狂妄其精不守一作狂妄不精令人陰縮而攣筋兩脅肋骨舉一作舉毛悴一作毛悴色夭死于秋

足厥陰氣絕則筋縮引外與舌厥陰者肝脈也肝者筋之合也筋者聚於陰器而脈絡於舌本故脈弗營則筋縮急筋縮急則引外與舌故脣青舌卷外縮則筋先死庚篤辛死金勝木也

肝死藏浮之弱按之中如索不來或曲如蛇行者死

肝木王其脈弦細而長曰平反得沈濡而滑者是腎以
乘肝母之歸子為虛邪雖病易治反得浮大而洪者是心
之乘肝子之乘母為實邪雖病自愈反得微澀而短千金
短澀而者是肺之乘肝金之剋木為賊邪大逆十死不治
反得大而緩者是脾之乘肝土之陵木為微邪雖病即瘥
心乘肝必吐利肺乘肝即為癰腫

左手關上陰絕者無肝脈也苦癢遺溺難言脅下有邪氣
善吐刺足少陽治陽

左手關上陰實者肝實也苦肉中痛動善轉筋吐刺足厥
陰治陰

肝脈來濯濯如倚竿如琴瑟弦再至曰平二至曰離經病
四至脫精五至死六至命盡足厥陰脈也

肝脈急甚為惡言一作微急為肥氣在脅下如覆杯緩甚

為嘔微緩為水瘦痺大甚為內癰善嘔衄微大為肝痺縮
欬引小腹小甚為多飲微小為消痺消甚為癩疝微滑為
遺溺瀉其為淡飲微瀉為瘕癥筋攣

肝脈搏堅而長色不青當病墜苦搏因血在脅下令人喘
逆其濡而散色澤者當病溢飲溢飲者渴暴多飲而溢入
肌膚腸胃之外也素問溢入作易入

青脈之至也長而左右彈有積氣在心下支胘名曰肝痺
得之寒濕與疝同法腰痛足冷頭痛

扁鵲云肝病則目奪精虛則寒寒則陰氣壯壯則夢山
樹等實則熱熱則陽氣壯壯則夢怒

肝在聲為呼在變動為握在志為怒怒傷肝精氣并於肝

則憂肝虛則恐實則怒怒而不已亦生憂矣
色平春病變於色者取之榮

病先發於肝者頭目眩脅痛支滿一日之脾閉塞不通身
痛體重二日之胃而腹脹三日之腎小腹腰脊痛脛痠十
日不已死冬日入夏早食

病在肝平曰慧下哺甚夜半靜

假令肝病西行若食雞肉得之當以秋時發病以庚辛日
也家有血腥死女子見之以明要為災不者若感金銀物
得之

凡肝病之狀必兩脅下痛引小腹令人善怒虛則目眩眩
無所見耳無所聞善怒如人將捕之若欲治之當取其經
足厥陰與少陽氣逆則頭目痛耳聾不聰頰腫取血者

肝脉沈之而急浮之亦然苦脅痛有氣支滿引小腹痛時
小便難苦目眩頭痛腰脊痛足為寒時瘥女人月事不來
時無時有得之少年有所墮墜

肝病其色青手足拘急脅下苦滿或時眩冒其脉弦長此
為可治宜服防風竹瀝湯秦艽散春當刺大敦夏刺行間
冬刺曲泉皆補之季夏刺太衝秋刺中郄皆瀉之又當灸
期門百壯背第九椎五十壯

邪在肝則兩脅中痛寒中惡血在內脂善瘦節時腫取之
行間以引脅下補二里以溫胃中取血脉以散惡血取耳
間青棘以去其瘕

凡有所墮墜惡血留內若有所大怒氣上而不能下積于
左脅下則傷肝

肝中風者頭目暈兩脅痛行常偃令人嗜甘如阻婦狀
肝中寒者其人洗洗惡寒翕翕發熱面翕然赤繫繫有汗
胃中煩熱

肝中寒者其人兩臂不舉舌本^叔燥善太息胃中痛不
得轉側時盜汗欬食已吐其汁

肝主胃中喘怒罵其脉沈胃中又窒欲令人推按之有熱
鼻塞

肝傷其人脫肉又卧口欲得張時時手足青目瞑瞳人痛
此為肝臟傷所致也

肝水者其人腹大不能自轉側而脅下腹中痛時時津液
微生小便續通

肝脹者脅下滿而痛引小腹

肝著其病人常欲蹈其胃上先未苦時但欲飲熱

診得肝積脉弦而細兩脅下痛邪氣走心下足脛寒脅痛
引小腹男子積疝女子瘕淋身無膏澤善轉筋爪甲枯黑
春瘥秋劇色青也

肝之積名曰肥氣在左脅下如覆杯有頭足如龜鼈狀久
久不愈發欬逆噎蹇連歲月不已以季夏戊己日得之何

也肺病傳肝肝當傳脾脾適以季夏王者不受邪肝復
欲還肺肺不肯受因留結為積故知肥氣以季夏得之

肝病胃滿脅脹善恚怒叫呼身體有熱而復惡寒四肢不
舉面白身體滑其脉當弦長而急今反短濇其色當青而

反白者此是金之剋木為大逆十死不治

襄公問扁鵲曰吾欲不診脉察其音觀其色知其病生死

可得聞乎答曰乃聖道之大要師所不傳黃帝貴之過於金玉入門見病觀其色聞其呼吸則知往來出入吉凶之相角音人者主肝聲也肝聲呼其音琴其志怒其經足厥陰厥逆少陽則榮衛不通陰陽交雜陰氣外蕩陽氣內擊擊則寒寒則虛虛則卒然喑啞不聲此為厲風入肝續命湯主之方見第八卷中但踞坐不得低頭面目青黑四肢緩弱遺失便利甚則不可治除則旬月之內桂枝酒主之方見第八卷中又呼而哭哭而反吟此為金剋木陰擊陽陰氣起而陽氣伏伏則實實則執執則喘喘則逆逆則悶悶則恐畏目視不明語聲切急謬說有人此為邪熱傷肝甚則不可治若青色雖青向眼不應可治地黃煎主之方見下肝實篇中肝病為瘧者令人色蒼蒼然太息其狀若死者烏梅丸主

之方見第八卷中若其人本來少於悲恚忽爾嗔怒出言反常乍

寬乍急言未竟以手向眼如有所畏若不即病禍必至矣此肝病聲之候也若其人虛則為寒風所傷若實則為熱氣所損陽則瀉之陰則補之青為肝肝合筋青如翠羽者吉肝主目目是肝之餘其人木形相比於上角蒼色小頭長面大肩平背直身小手足有材好勞心少力多憂勞於事耐春夏不耐秋冬秋冬感而生病足厥陰他他然脅廣合股脆傾正則肝應之正青色小理者則肝小小則藏安無脅下之病粗理者則肝大大則虛虛則寒逼胃迫咽善膈中日脅下痛廣脅反骸者則肝高高則實實則肝熱上支貴加脅下急為息貫合脅危鬼一作骸者則肝下下則逼胃脅下空空則易受邪脅骨堅者則肝堅堅則臟安難傷

骨弱則肝脆脆則善病消瘴易傷氣腹好相者則肝
端正端正則和利難傷骨偏舉者則肝偏傾偏傾則骨
下偏痛凡人分部陷起者必有病生膽少陽為肝之部而
藏氣通於內外部亦隨而應之沈濁為內浮清為外若色
從外走內者病從外生部處起若色從內出外者病從內
生部處陷內病前治陰後治陽外病前治陽後治陰陽主
外陰主內凡人死生休否則藏神前變形于外人肝前病
目則為之無色若肝前死目則為之脫精若天中等分墓
色應之必死不治看應增損斟酌餘促賒則不出四百日
內促則不延旬月之間肝病少愈而卒死何以知之曰青
白色如柁指大驚點見額頰上此必卒死肝絕八日死何
以知之面青目赤但欲伏眼目視而不見人汗出如水不
止一日二日死面黑目青者不死青如草滋死吉凶之色
在於分部順順而見青白入目必病不出其年若年上不
應三年之中禍必應也

春木肝脈色青主足少陽脈也春取絡脈分肉春者木始
治肝氣始生肝氣急其風疾經脈常深其氣少不能深入
故取絡脈分肉之間其脈根本並在竅陰之間應在窻籠
之前窻籠者耳前上下脈以手按之動者是也

其筋起於小指次指之上結外踝上循肘外廉結於膝外
廉其支者別起於外輔骨上走臑前者結伏兔之上後者
結於尻其直者上眇乘季脅上走腋前者結於膺乳結於
缺盆直者上出掖貫缺盆出太陽之前循耳後上額角交
巔上下走頤上結於顛其支者結於目外眦為外維

其脉起於目兌背上抵頭角下耳後循頰行手少陽之前
至肩上一却交出手少陽之後入缺盆其支者從耳後入耳
中出走耳前至兌背後其支者別兌背下大迎合手少陽
於頰下加頰車下頸合缺盆以下臂中貫膈絡肝屬膽循
脅裏出氣街繞毛際橫入髀厭中其直者從缺盆下腋循
臂過季脅下合髀厭中以下循髀陽出膝外廉下外輔骨
之前直下抵絕骨之端下出外踝之前循足跗上出小指
次指之端其支者別跗上入大指之間循大指歧內出其
端還貫入爪甲出三毛合足厥陰為表裏厥陰之本在行
間上五寸應在背輸同會于手太陰

其足少陽之別名曰光明去踝半寸是也別走厥陰下絡
足跗主肝病病實則膽熱熱則厥厥則陽病陽脉反逆

大於寸口一倍病則臂中有熱心脅頭額痛缺盆腋下腫

歪則膽寒寒則痿躄躄則陰病陰脉反小於寸口病則臂
中有寒少氣口苦身體無膏澤外至肘絕骨外踝前及諸

節皆痛若陰陽俱靜與其俱動如引繩俱頓者病也此足

少陽膽經筋脉支別為病
今取足履陰用經附于後

足厥陰之脉起於大指聚毛之際上循足趺上廉去內踝

一寸上踝八寸交出太陰之後上膈內廉循股陰入毛中

環陰器抵小腹俠胃屬肝絡膈上貫膈布脅肋循喉嚨之

後上入頰頰連目系上出額與督脉會于顛一本上其支

太陰少陽結於腰髀
下第三第四骨空中其支者從目系下頰裏環腎內其支

者復從肝別貫膈上注肺中是動則病腰痛不可以俛仰

丈夫頰疝婦人小腹腫甚則隘乾面壅脫色是主肝所生

病者曾滿嘔逆洞泄狐疝遺溺閉癢盛者則寸口大一倍
於人迎虛者則寸口反小於人迎也

足厥陰之別名曰蠡溝去內踝上五寸別走少陽其別者
循經上畢結於莖其病氣逆則畢腫卒疝實則挺長執虛
則暴癢取之所別足厥陰之筋起於大指之上下結於內
踝之前上循筋上結內輔之上下循陰股結於陰器結絡
諸筋

春三月者主肝膽青筋牽病也其源從少陰而涉足少陽
少陽之氣始發少陰之氣始衰陰陽悖鬱於腠理皮毛之
病俱生表裏之病因起從少陽發動反少陰氣則臟腑受
瀉而生其病相反若腑虛則為陰邪所傷腰背強急脚縮
不伸筋中欲折日中生花若臟實則為陽毒所損瀉瀉前
寒而後熱頸外雙筋牽不得屈伸頸直背強眼赤黃若欲
轉動合身回側故曰青筋牽病 方見傷寒上卷

灸法

扁鵲曰灸肝肺一輸主治丹毒牽病當依源處治調其陽
理其陰臟腑之疾不生矣

肝虛實第一 脈四條 灸法一首 方十一首

肝實熱

左手關上脈陰實者足厥陰經也病苦心下堅滿常兩脅
痛息忿忿如怒狀名曰肝實熱也

竹瀝 壹升 治肝實熱陽氣伏邪熱喘逆悶恐目視物無

明狂悖非意而言者方

竹瀝 壹升 麻黃 大青 梔子仁

升麻 茯苓 玄參 知母 各三分

生薑 石膏 各捌分 生薑 芍藥 各肆分

右十一味以水九升煮取一升半去滓下竹瀝煮
兩三沸分三服須利下芒消二分去為藥加生地黃五
分刪繁方無石膏生薑芍藥生薑用人參各三分

煎胡湯 治肝實熱目痛胃滿氣急寒瀉肝方

前胡 芒消 秦皮 梔子仁

決明子 黃芩 升麻 蕤仁

細辛 各參兩 苦竹葉 車前葉 各切壹升

右十一味以水九升煮取三升去滓下芒消分二
服又一方有柴胡二兩共十二味

防風散 治肝實熱夢怒虛驚方

防風 茯苓 萎蕤 白朮 橘皮

丹參 各壹兩參分 細辛 貳兩 甘草 射干 各壹

升麻 黃芩 各壹兩 大棗 參枚 酸棗仁 參分

右十二味治下篩為粗散以兩方寸匕帛裹以井花水
二升煮時時動上裹子煎取一升分服日二

遠志散 治肝邪熱出言反常乍寬乍急方

遠志 射干 杏仁 大青 各半 茯神

麥門冬 葛根 甘草 各壹兩 芍藥 壹兩 桂心 參分

知母 升麻 各伍 石膏 貳兩

右十二味治下篩為粗散以水一升五合煮竹葉一升
取汁內藥一匕半煎取八合為一服日一以綿裹攤之

治邪熱傷肝好生悲怒所作不定自驚恐方

生地黄 淡竹葉 生薑 車前草 乾藍

赤蜜青丹 川參 玄參各肆兩 茯苓貳兩 石膏伍兩

右干味以咀以水九升煮取二升去滓停冷下蜜更煎
三兩沸分三服

肝膽俱實

左手關上脉陰陽俱實者是厥陰與少陽經俱實也病苦
胃脹嘔逆食不消名曰肝膽俱實也

肝虛寒

左手關上脉陰虛者是厥陰經也病苦脅下堅寒熱腹滿
不欲飲食腹脹悒悒不樂婦人月經不利腰腹痛名曰肝
虛寒也

補肝湯 治肝氣不足兩脅下滿筋急不得大息四肢厥冷

發捨心腹痛目不明了及婦人心痛乳癰膝熱消渴爪甲
枯口面青者方

山茱萸翼作烏頭 甘草 桂心各三兩 桃人翼作人

拍子人 細辛 茯苓 防風各貳兩 大棗貳拾枚

右九味以咀以水九升煮取五升去滓分三服

補肝散 治左脅偏痛久宿食不消并目眈眈昏風淚出見

物不審而逆風寒偏甚消食破氣止淚方

山茱萸 桂心 薯蕷 天雄 茯苓

人參各伍分 芍藥 白朮 獨活 五加皮

大黃各柒分 橘皮叁分 防風 乾薑 丹參

厚朴 細辛 桔梗各壹兩 甘草 甘菊花壹兩

貫衆半兩 陳麥麩 大麥蘖各壹升

右二十二味治下篩酒服方寸七日一若食不消食後服若止痛食前服之

補肝酒 補肝治肝虛寒或高風眼淚等雜病方

松脂十斤細剉以水淹浸一周日煮之細細接取上膏水竭更添之脂盡更水煮如前煙盡去火停冷脂當沈下取一斤釀米一石水七斗好麴末二斗如家常釀酒法仍冷下飯封二百日脂米麴並消酒香滿室細細飲之此酒須一倍加麴

枸杞酒 治同前

搗碎枸杞子一斗先內絹袋中酒一斗漬乾密封泥甕勿泄曝乾天陰勿出三七日滿白溫酒上性飲之忌酢

方風國 治肝虛寒目眈眈視物不明諦視生花補方

防風 細辛 芍藥 獨活 白鮮皮 甘草 橘皮 大棗 蜜 白 甘竹葉 肥 右十味以咀以水一斗二升半煮九味取四升去滓下蜜更煎兩沸分四服日二夜一若五六月以燥器貯冷水藏之

治肝湯 治肝虛寒脅下痛脹痛氣急目昏濁視物不明方

檳榔 附子 白木 茯苓 橘皮 桂心 桔梗 白朮 吳茱萸

右九味以咀以水九升煮取三升去滓溫服每服一升若氣喘者加芍藥二兩半夏四兩甘草二兩

并強目不明方

灸肝輸一百壯小兒斟酌可灸一二七壯

肝膽俱虛

左手關上脉陰陽俱虛者足厥陰與少陽經俱虛也病者恍惚尸厥不知人妄見少氣不能言時時自驚名曰肝膽俱虛也

肝勞第二 論一首 方一首

論曰肝勞病者補心氣以益之心王則感於肝矣人逆春氣則足少陽不生而肝氣內變順之則生逆之則死順之則治逆之則亂反順為逆是謂關格病則生矣

猪膏

猪膏

薑汁各一升

右二味以微火煎取三升下酒五合和煎分為二服

虎骨

虎骨

壹升炙炙焦碎如雀頭

丹參 捌兩

乾地黄 柒兩

地骨皮

乾薑

芎藭 各肆兩

猪椒根

五加皮

白朮

枳實 各伍兩

右十味咬咀絹袋盛以酒四斗浸四日初服六七合漸加至一升日再

筋極第四 論一首 方七首 灸法七首

論曰夫六極者天氣通於肺地氣通於嗌風氣應於肝雷氣動於心穀氣感於脾素問穀雨氣潤於腎六經為川腸胃為海九竅為水注之氣所以竅應於五臟五臟邪傷則六腑生極故曰五藏六極也

論曰凡筋極者主肝也肝應筋筋與肝合肝有病從筋生

肝藏

又曰以春遇病為筋痺筋痺不已復感於邪內舍於肝則陽氣入於內陰氣出於外若陰氣外出則虛虛則筋生筋虛則善悲色青蒼白見於目下若傷寒則筋不能動十指爪皆痛數好轉筋其源以春甲乙日得之傷風風在筋為肝虛風也若陽氣內發發則實實則筋實筋實則善怒盜乾傷熱則效效則骨下痛不能轉側又脚下滿痛故曰肝實風也然則因其輕而揚之因其重而減之因其衰而彰之審其陰陽以別柔剛陽病治陰陰病治陽善治病者病在皮毛肌膚筋脈而治之次治六腑若至五臟則半死矣

扁鵲云筋絕不治九日死何以知之手足爪甲青黑呼罵口不自息筋應足軟陰足軟陰氣絕則筋縮引外與舌筋先死矣

橘皮通氣湯治筋實極則效效則兩臂下縮痛痛甚則不可轉動方

橘皮 肆兩

白朮

石膏 各伍兩 細辛

當歸

桂心

茯苓 各叁兩 香豉 壹升

右八味咬咀以水九升煮取三升去滓分三服

丹參湯治筋實極則兩脚下滿滿而痛不得遠行脚心如割筋斷折痛不可忍者方

丹參 叁兩

芍藥

杜仲

續斷

地骨皮 兩

乾地黄

當歸

通草

升麻

麥門冬

禹餘糧

麻黃

各壹兩 各壹兩 各壹兩

牛膝 兩 甘草

桂心

壹兩

生薑

切炒取焦乾

杜蠟 各壹兩半

右十七味治下篩為粗散以絹袋子盛一方寸匕以井花水一升煮數動袋子煮取一升頓服日一

兩膏煎 治筋實極手足爪甲或青或黃或黑烏黯四肢筋急煩滿方

生地黃汁升參 生葛汁 生玄參汁各青升

大黃 升麻各貳兩 麻黃 梔子人

犀角各參兩 石膏伍兩 芍藥肆兩

右十味以水七升先煮七物必一升去滓次下地黃汁煎取三升分三服日再

黃汁煎一兩沸次下葛汁煎取三升分三服日再

五加酒 治筋虛極筋痺好悲思顏色蒼白四肢噓吸脚手拘攣伸動縮急腹中轉痛方

五加皮壹斤 薏苡人半 枳刺貳升 大麻人叁 猪椒根皮

丹參捌兩 乾薑 芫蕪伍兩 桂心 當歸

甘草叁兩 天雄 秦椒 白鮮 通草肆兩

右十五味以絹袋盛清酒四斗漬春夏四日秋冬六七日初服六七合稍稍加以知為度

人參酒 治筋虛極則筋不能轉十指爪皆痛數轉筋或交接過度或病未平復交接傷氣內筋絕舌捲脣青引引縮脰脈疾急腹中絞痛或便欲絕不能飲食方

人參 防風 茯苓 細辛 秦椒

黃耆 當歸 牛膝 桔梗各壹兩半 乾地黄

丹參 薯蕷 鍾乳 礬石各叁兩 山茱萸

芫蕪各貳兩 白朮 麻黃各貳兩半 大棗叁拾枚 五加皮壹斤

生薑切炒 烏麻碎各貳升

在二十一 味吹咀鍾乳別以小袋子盛清酒一斗半浸
五猪溫服三合日再不知隨意增進一本無烏麻用杜
仲一兩半

治交接損外縮筋攣方

燒婦人月經表灰服方寸匕

治筋絕方

熬蟹腦足髓內瘡中筋即續

灸法

勞冷氣逆腰髓冷痺脚屈伸難灸陽蹻一百壯在外
腰背不便轉筋急痺筋攣灸第二十一推隨年壯
轉筋十指筋攣急不得屈伸灸脚外踝骨上七壯
失精筋攣陰縮入腹相引痛灸中封五十壯在內踝前筋

裏宛宛中○又云灸下滿各五十壯老人加之小兒隨年
壯○又云此三穴喉腫喉逆五臟所苦鼓脹柔主之
轉筋脛骨痛不可忍灸屈膝下廉橫筋上二壯
腹脹轉筋灸臍上一寸一七壯

堅癥積聚第五 論一首 灸法八首

方四十四首

論曰病有積有聚何以別之答曰積者陰氣也聚者陽氣
也故陰沈而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣之所聚名
曰聚故積者五臟之所生聚者六腑之所成故積者陰氣
也其始發有常處其痛 一依 不離其部上下有所終始左
右有所窮已聚者陽氣也其始發無根本上下無所留止
其痛無常處謂之聚也故以是別知積聚也
經絡受病入於腸胃五臟積聚發伏梁息膏肥氣不氣

積聚之始生至其已成奈何曰積之始生得寒乃生厥
止乃成積人之善病腸中積者何以候之曰皮薄而不澤
肉不堅而淖澤如此則腸胃傷惡惡則邪氣留止積聚乃
作腸胃之積寒溫不次邪氣稍止至其畜積留止大聚乃
起病有身體腰髀股胛皆腫環臍而痛是為何病曰病名
伏梁此風根也不可動動之為水瀦瀦之病小腹盛左右
上下皆有根者伏梁也裹膿血居腸胃之外不可治治之
每切按之致死此下則因陰必下膿血上則迫胃管生疔
云當膈俠胃管內離此久病也難療居臍上為逆慎勿動
取奪其氣溢於大腸而著於育育之原在臍下故環臍而
痛

五疔治五臟寒熱積聚臃脹腸鳴而噫食不生肌膚甚
者嘔逆若傷寒瘡已愈令不復發食後服五丸飲多者
十九常服令人大小便調和長肌肉方

大黃熬 前胡各貳兩 消石 葶藶 杏仁各壹升

厚朴 附子 細辛 半夏各壹兩 茯苓半兩

右十味為末蜜和搗五千杵丸如梧子大服五丸稍加
至十九以知為度

五石烏頭丸治男子女人百病虛弱勞冷宿寒久癖及癥
瘕積聚或嘔逆不下食并風濕諸病無不治之者

鍾乳鍊 硫黃 礬石 紫石英 赤石脂

枳實 甘草 白朮 紫苑 山茱萸

防風 白薇 桔梗 天雄 皂莢

細辛 菴蓉 人參 附子 藜蘆

麥門冬 乾薑 蜀椒 吳茱萸 桂心各兩

烏頭各兩 厚朴 遠志 茯苓各兩 當歸各兩

棗膏伍合 乾地黄壹兩 附子伍兩

右三十二味為末蜜和搗五千杵丸如梧子大酒服十丸日三稍加之

烏頭圓 治男子女人寒冷腹內積聚邪氣往來厥逆搶心心痛痺悶吐下不止婦人產後羸瘦方

烏頭伍兩 吳茱萸 蜀椒 乾薑 桂心各兩

乾地黄兩 前胡 細辛 人參 芍藥各兩

白木壹兩 皂莢 紫苑 白薇 芍藥各兩

右十五味為末蜜丸如梧子大酒下十九日三稍加之以知為度

治心腹疝瘕脅下及小腹滿堅痛有積寒氣入腹使人腹中冷發甚則上搶心氣滿飲食喜嘔方

大黃 茯苓各兩 桂心 黃芩 吳茱萸

細辛 人參 蜀椒 乾薑壹兩 男髮灰兩

牡丹 甘草 芍藥 茯苓 薤白各兩

芍藥 防葵 蠱蟲 厚朴 半夏各兩

右二十味為末蜜丸如梧子大服五丸日再漸加之

恒山圓 治脅下邪氣積聚往來寒熱如温瘧方

恒山 蜀漆 白薇 桂心 鱉甲

鱉甲 白木 附子 鱉甲

右十一味為末蜜丸如梧子大以米泔清服五丸日三

又方 蒸鼠壤土熨之冷即易腹中切痛炒鹽半升令焦內
湯中飲之吐痰若手足痛者燒青布內小口器中熏
痛處

神明度命圓 治久患腹內積聚大小便不通氣上搶心腹
中脹滿逆害飲食方

大黃

芍藥 各貳兩

右二味為末蜜丸如梧子大服四九日三不知可加至
六七九以知為度

治萬病積聚方

七八月收蒺藜子不限多少以水煮過熟取滓曝令
乾搗篩蜜丸如梧子大酒服七九以知為度其汁煎
如飴服之

治胃腸 治胃中心下結積飲食不消方

括萆實

大黃

黃連 各貳兩

甘草 壹兩

右四味以水五升煮取二升五合分二服

天石 治諸疾破積聚心下支滿寒熱鬼注長
病欬逆唾噫辟除衆惡殺鬼逐邪氣惡胃中結氣咽中閉
塞有進有退繞臍惻惻隨上下按之挑手心中愠愠如有
蟲狀毒注相染滅門

雄黃

油 壹斤

丹砂

礬石

當歸

大黃

巴豆 一兩

犀角

鬼臼

射罔

藜蘆

真珠

附子

麝香

牛黃

人參

蜈蚣

蜥蜴

羌青

烏頭

杏仁

斑猫 茶枝

樗雞

地膽

桂心

積聚

右二十四味為末蜜和搗二萬杵丸如小豆大先食飲服二九日一不知稍加仍以藥二九安門力上今製藥家及視病人夜行獨宿服二九令衆惡不敢近傷寒服之無不即瘥此方與第十七卷戶疰毒方重

蜥蜴圓治癥堅水腫蜚尸遁尸百注尸注骨血相注惡氣

鬼忤蠱毒邪氣往來夢寤存亡留飲結積虎狼所啗獬犬所咋鳩毒入人五臟服藥已消殺其毒驗人邪鬼忤亦能遣之

蜥蜴 各貳 蜈蚣 各貳 地膽 伍拾 蟻蟲

杏人 各叁 蛭娘 拾肆 朴消 巴豆 各壹兩拾捌銖

欵冬花 犀角 桃奴 澤擦 桑赤雞

鬼督郵 各壹拾捌銖 芍藥 虎骨 各壹兩 甘草

乾薑 各壹兩 甘遂 壹兩陸銖

右二十味為末別治巴豆杏人如膏內藥末研調下蜜搗二萬杵丸如麻子先食飲服三九日一不知加之不敢吐下者一九有人風冷注癥堅二十年者得瘥此方與第十七卷戶疰毒方重

大五明狼毒圓治堅癥痞在入曾脅或在心腹方

狼毒 乾地黃 兩 附子 人黃 菝葜

人參 當歸 細辛 蜀椒 五味子

藺茹 各壹兩 半夏 貳兩 乾薑 桂心 各壹兩

芫花 莽草 厚朴 防己 旋復花 兩

杏人 拾 巴豆 貳拾肆枚

右三十一味為末蜜和丸如梧子服二九日一夜以

知為雙

狼毒圓 治同前

狼毒 參兩

附子

旋復花

半夏

藺茹

白附子 各貳兩

右六味為末蜜和搗五千杵丸如梧子大飲服三丸加至十九日三服後方無半夏白附子藺茹只三味

狼毒圓 治堅癰方

狼毒 伍兩

半夏

杏仁 各參兩

桂心 肆兩

附子

蜀椒

細辛 各貳兩

右七味為末別搗杏仁蜜和丸如大豆飲服二丸

甘遂湯 治暴堅久痞腹堅者方

甘遂

黃芩

芒消

桂心

細辛 各壹兩

大黃 參兩

右六味以水八升煮取一升半分三服

治卒暴癰腹中有物堅如石痛如斫刺晝夜啼呼不治自日必死

牛膝二斤以咀曝令乾以酒一斗浸之密塞器口煎取半服半升一服便吐去宿食神效

治卒暴癰方

搗碎商陸根蒸之以新布籍腹以藥鋪其上以衣物覆其上冷復易之數日用之日夕勿息

方 蒜時所取五月五日桂壹尺貳寸 籠中黃土 如雞子

右三味合搗以淳苦酒和塗布上以掩病處不過三日消凡蒜亦佳用後方不用桂

野葛膏治卒暴瘕方

野葛 青尺

當歸

附子

雄黃 油煨

細辛 各青兩 蜀椒 半兩

烏頭 貳兩

巴豆 青伯枚

右八味以醋浸一宿猪膏一斤煎附子色黃去滓內雄黃粉攪至凝傳布上以掩瘕處復以油重布上復著十重紙以熨斗盛火著其上常令熱日三夜二須膏乾為度

消石大圓治十一癥瘕及婦人帶下絕產無子并欲服寒

食散而腹中有癥瘕實者當先服大丸下之後與寒食散大丸不下水穀但下病耳不令人困方

消石 兩 附子 兩 大黃 兩

人參

甘草 各貳兩

右四味為末以三年苦酒二升置銅器中以竹筋拄器中一升作一刻凡二升作二刻以置火上先內大黃常攪不息手使微沸盡一刻乃內餘藥又盡一刻餘一刻極微火使可丸如雞子中黃凡合藥當先齋戒一宿勿令小兒女人奴婢等見之欲下病者用二丸若不能服大丸者可分作小丸然亦不可過四九也丸欲令大不欲令細能不分為善若人羸者可少與強者可二十日五服和調半日乃下若婦人服之下者或如雞肝或如米汁正赤黑或一升或三升下後慎風冷作一杯粥食之然後作羹臠自養如產婦法六月則有子禁生魚猪肉辛菜若寒食散者自如藥法不與此同日一服

土瓜圓治諸藏寒氣積聚煩滿熱飲食中蠱毒或食生物

及水中蟲卵生入腹而成蟲蛇若為魚鱉留飲宿食婦人

瘰癧帶下百病陰陽不通利大小便不節絕傷腎寒熱
交結臂口焦黑身體消瘦嗜卧少食多驚產乳胞中餘疾
股裏熱少腹中急結痛引陰中方

土瓜根 桔梗格料 大黃清斤蒸黃十 杏仁壹升

右四味為末蜜丸如梧子大空腹飲服三九日三不知
加之以知為度

治凡所食不消方

取其餘類燒作末酒服方寸匕便吐去宿食即瘥有
食桃不消作病者以時無桃就樹間得稿桃燒服之
登時吐病出甚良

治卒食不消欲成癥積方

煎艾汁如飴取半升作一服便利吐去宿食神良結

錄驗方白文伍尺 廿三

意以根壹大把貳味同煎

治食魚肉等成癥結在腹內并諸毒氣方

狗屎五升燒末綿裹以酒一斗浸再宿濾取清分十
服日二三日令盡隨所食癥結即出

治雜食痰實不消心腹堅痛者方

以水二升煮白鹽一升令消分二服刺吐去所食并

治暴癥

治癥堅心下有物大如杯不得食食則腹滿心腹絞痛方

葶藶子 大黃各貳兩 澤漆肆兩

右三味別研葶藶為膏其二味擣五百杵入蜜更擣
杵和丸如梧子大服五丸不知加之日三

治小腹堅大如盤胃中滿脹食不消化婦人瘦瘠者方

續服

暖水服髮灰一方寸匕日再并灸肋端

女方 飲服上好麴末方寸匕日三又灸二焦輸隨年壯瘥

治伏梁氣方 白馬尿銅器中盛取每日服一升

治癥瘕方

柵樹白皮煎令可丸服之取知病動若下減之

振靈方 治患癥結病及瓜病似瓜形日月形或在臍左右或在臍上下或若鼈在左右助下或當心如合字大法先針其足以椒熨之

取一新盆子受一斗者底鑽一百二十孔孔上著椒三合上著一重紙紙上著冷灰一升冷灰上著熟灰半升上著剛炭火一斤經一食頃盆底熱徹當病上

金方一乙

十四

初安甑一重即安火盆火盤大熱以漸更加一重若火更熱不可忍加至三重暫歇進一口冷飲還上火消二分許即停止經二日勿著及至七日決得頓瘥然後食美食自補若小不瘥作露宿丸服之方見前卷十六卷

治腹中積癥方

草薺子一升熬以酒五升浸七日每服二合日三

治蛇癥方

白馬尾切長五分以酒服方寸匕大者自出更服二分者一方寸匕中者亦出更服三分者一方寸匕小者復出不可頓作一服殺人馬尾一本作馬毛

大黃湯 治蛇癥方

大黃

茯苓

各半兩 烏賊骨計枚

皂莢附枝如猪牙者 甘草如指大者壹尺 芒消如雞子壹枚

右六味以水六升煮三五沸去滓內消適寒溫盡服之十日一劑作如上法宿勿食平日空腹服病根當下也

治鼈癥腹堅硬腫起大如盆眠卧不得方食中得病為鼈癥在心下取土強

取藍一斤擣水三升絞取汁每服一升日二

又方 葫蘆根白皮一握研取汁以水和頓服之

又方 白馬尿一升雞子三枚取白合煎取二合空腹頓服

不移時當吐病出

又方 雞屎一升炒令黃取五合以酒一升浸取半擣為末

以所浸酒服方寸匕日二服三日中作一劑

治蛟龍病開皇六年二月八日有人食餅得之其人病發似蛟龍病似類癩面色青黃因食寒食餅過多便吐出狀

似蛟龍病頭有尾

服寒食餅二斗大驗

山野人有啣蟲在腹生長為蟲癥病治之方

故敗篋子 故敗梳各壹枚

右二件各破為兩分各取一分燒為末又取一分以水

五升煮取一升服上件燒末頓服即出

常欲食米若不得米則胃中清水出為米癥治之方

雞屎壹升 白米伍合

右二味合炒令米焦擣末以水一升頓服取盡須臾吐

出病如研米若無米當出痰自此永憎米不復食之矣

人有思肉不已食訖復思者為肉癥治之方

空腹飲白馬尿二升吐有肉出不出必死

食中有髮不覺因食而入又即曾聞如有蟲狀上下去來
惟欲飲油一日之中乃至三二升不欲飲食者為髮癥方
油一升以香澤煎之大鐵勞貯之安病人頭邊令口
臯臨油上勿令得飲傳臯面令有香氣當叫喚取飲
不得與之必當疲極大睡其髮癥當從口出令一人
專守視之并備石灰一畧見癥出以灰粉手捉癥抽
出及盡即是髮也初從腹中出形如不流水中濃菜
隨髮長短形亦如之

方酒二升煮豬脂二升三沸服一升日二白馬屎服之
亦佳無白馬白牛亦得

灸法

癥瘕灸內踝後死死中隨年壯又灸氣海百壯

廿六

久冷及婦人癥瘕腸鳴泄利遶臍絞痛灸天樞百壯二報
穴在俠臍兩邊各二寸勿針

積聚取滿灸脾募百壯穴在章門季肋端

心下堅積聚冷脹灸上管百壯二報穴在巨闕下一寸

積聚堅大如盤冷脹灸胃管二寸百壯二報穴在巨闕下一寸

