

重刊巢氏諸病源候總論

四

○解散病諸候——凡二十六論

寒食散發候

夫散脉或洪實或斷絕不足欲似死脈或細數或弦馳坐所犯非一故也脉無常投醫不能識熱多則弦馳有癖則洪實急痛則斷絕凡寒食藥率如是無若非死候也勤從節度不從節度則死矣欲服散宜診脉候審正其候爾乃畢愈脉沈數者難發難發當數下之脉浮大者易發也人有服散兩三劑不發者此人脉沈難發發不令人覺藥勢行已藥但於內發不出形於外欲候知其得力人進食多是一候氣下顏色和悅是二候頭面身癢癩是三候策策惡風是四候厭厭欲寐是五候也諸有此證候者皆藥內發五藏不出於外但

如方法服散勿疑但數下之則內虛自當發也諸方互有不同其用唯欲將冷寧止公欲得暖將之意其多有情致也世人未能得其深趣故鮮能用之然其方法猶多不盡但論服藥之始將息之度不言發重之後治解之宜多有闕略江左有道弘道人深識法體凡所救療妙驗若神製解散對治方云鍾乳對木又對枯萎其治主肺上通頭臂木動鍾乳胃塞短氣鍾乳動木頭痛目疼又鍾乳雖不對海蛤海蛤動則目痛短氣有時木動鍾乳直頭痛胃塞然鍾乳與木所可爲患不過此也雖所患不同其治亦一矣發動之始要其有始由覺體中有異與上患相應便速服葱白豉湯又云硫黃對防風又對細辛其治主脾胃通腰脚防風動硫黃煩疼腰痛或瞋忿無常或下利不禁防風細辛能動硫黃硫黃不能動彼始覺發便服杜仲湯白石英對附子其治主胃通至脾腎附

子動白石英煩渴腹脹白石英動附子則嘔逆不得食或口噤不開或言語難手脚疼痛覺發服生麥門冬湯紫石英對人參其治主心肝通至腎腳人參動紫石英心急而痛或驚悸不得眠臥或恍惚忘誤失性狂發或蹠蹠欲眠或憤憤喜瞋或瘞或劇乍寒乍熱或耳聾目暗又防風雖不對紫石而能動紫石由防風而動人參人參動亦心痛煩熱頭項強始覺便宜服麻黃湯赤石脂對桔梗其治主心通至胃背桔梗動赤石心痛口噤手足逆冷心中煩悶赤石動桔梗頭痛目赤身體壯熱始覺發即溫酒飲之隨能數杯酒勢行則解亦可服大麥麩良復若不解復服木對鍾乳木發則頭痛目赤或舉身壯熱解與鍾乳同附子對白石英亦對赤石肺附子發則嘔逆手脚疼體強骨節痛或項強面目滿腫飲酒食麩自愈若不愈與白石英同解人參對紫石英人參發則偏對

病原六子

二

有說者云藥性草木則速發而易歇土石則遲發而難歇也夫服藥草石俱下於喉其勢厲盛衰皆有先後其始得效皆是草木先盛耳土石方引日月也草木少時便歇石勢猶自未成其疾者不解消息便謂頓休續後更服或謂病痼藥微倍更增石或更雜服衆石非一也石之爲性其精華之氣則合五行乃益五藏其淳穢便同灰土也夫病家氣血虛少不能宣通雜石之性卒相和合更相壅滯便成牢積其病身不知是石不和精華不發不能致熟消疾便謂是冷盛牢剝服之無已不知石之爲體體冷剝執其精華氣性不發其冷如冰而疾者其石入腹即熱既不即熱服之彌多是以患之

之人不敢寒食而大服石石數彌多其冷僻尤劇皆石性不
發而積也亦有雜飴諸石丸酒單服異石初不息唯以大散
爲數而已有此諸害其證甚多小品方云道弘道人製解散
對治方說草石相對之和有的能發動爲證世人遂易不逆
思尋古今方說至於動散臨急便就服之既不救疾便虛委
禍大散由來是難將之藥夫以大散難將而未經服者尤前
有慎耳旣心期得益苟就服之已服之人便應研習救解之
人輕信對治新方遂易服之從非棄是不當枉命誤藥邪
檢神農本草經說草石性味無對治之和無指的發動之說
按其對治之和亦依本草之說耳且大散方說主患汗藥物
不說其所主治亦不說對和指的發動之性也覽皇甫上安
撰解散說及將服消息節度亦無對和的發之說也復有稟

丘家將溫法以救變敗之色亦無對和的動之說若以藥性
相對爲神者枯萎惡乾薑此是對之大害者道弘說對治而
不辨此道弘之方焉可從乎今不從也當從皇甫節度自更
改枯萎便爲良矣患熱則不服其藥惟患冷者服之耳自可
以除枯萎若虛勞脚弱者以石斛十分代枯萎若風冷上氣
欬者當以累死十分代枯萎一法極良若雜患常疾者止除
枯萎而已慎勿加餘物皇甫云然寒食藥者世莫知焉或言
華佗或曰仲景考之於實佗之精微方類單省而仲景經有
侯氏黑散紫石英方皆數種相出入節度略同然則寒食草
石二方出自仲景非佗也且佗之爲治或割斷腸胃滌洗五
臟不純任方也仲景雖精不及於佗之爲治或割斷腸胃滌洗五
石之宜亦妙絕衆醫及寒食之療者衡之至難將之甚苦近
世尚書向晏耽聲好色始服此藥心加開朗體力轉強京師

翁然傳以相授。歷歲之困，皆不終朝而愈。衆人喜於近利，未覩後患。晏死之後，服者彌繁。于時不輟。余亦豫焉。或暴發，常夭害年命。是以族弟長互舌縮入喉。東海王良夫，齋瘡陷背，隴西辛長緒，脊肉爛潰。蜀郡趙公烈，中表六喪，悉寒食散之所爲也。遠者數十歲，近者五六歲，余雖視息猶弱，人之笑耳，而壯人之患病者，由不能以斯爲戒。失節之人多來問余，乃喟然歎曰：「今之醫官，精方不及華佗，審治莫如仲景，而競服至難之藥，以招甚苦之患者。其夭死者，烏可勝計哉？」咸寧丙午，平陽太守劉泰，亦沈斯病，使使問余，救解之宜。先時有姜子者，以藥困絕，余實生之。是以聞焉。然身自荷毒，雖才士不能書辨者，不能說也。苟思所不逮，暴至不旋踵，敢以教人乎？辭不獲已，乃退而惟之求諸本草，考以素問，尋故事之所更，參氣物之相使，并列四方之本，注釋其下集，而與之匪曰：「我」。

列傳六十一

四

能也。蓋二折臂者，爲醫非生而知之，試驗亦其次也。服寒食散，二兩爲劑，分作三貼。清旦溫醇酒服一貼，移日一丈復服一貼，移日二丈復服一貼。如此三貼盡，須臾以寒水洗手足，藥氣兩行者，當小痺。便因脫衣以冷水極浴，藥勢益行，周體涼了，心意開朗。所患即瘥。雖羸困著床，皆不終日而愈。人有強弱，有耐藥，若人羸弱者，可先小食，乃服。若人強者，不須食也。有至三劑藥不行者，病人有宿癖者，不可便服也。當先服消石大丸，下去乃可服之。服藥之後，宜煩勞。若羸困著床，不能行者，扶起行之。常當寒衣寒飲，寒食寒臥，極寒益善。若藥未散者，不可浴浴之，則矜寒使藥噤不發。令人戰掉當取溫酒飲食，起跳躍，春磬出力，令溫乃浴。解則止，勿過多也。又當數冷食，無晝夜也。一日可六七食。若失食飢，亦令人寒心。食則溫矣。若老小不耐藥者，可減二兩。強者過二兩，少小氣盛，及

產婦臥不起頭不去巾帽厚衣對火者服散之後便去衣巾
將冷如法勿疑也虛人亦治又與此藥相宜實人勿服也藥
雖良令人氣力兼倍然甚難將息適大要在能善消息節度
專心候察不可失意當絕人事唯病著牀虛所不能言厥病
若精意能盡藥意者乃可服耳小病不能自勞者必發失節
慶慎勿服也若大傷寒者一後乃服之便極飲冷水若產婦
瘥以浴後身有痺處者便以熱水洗使周徧初得小冷當憂
中風寒身體強痛不得動搖者便溫服一劑因以寒水浴即
食飲酒於意後憤憤不了快者當復冷水浴甚者水畧不去
體也若藥偏在一處痛猶冷偏冷偏執痺及眩煩腹滿者便以
水逐洗於水下即了了矣如此晝夜洗藥力盡乃止月服此
藥不令人吐下也病皆愈若鬲上大滿欲吐者便餉食即安
矣服藥之後大便當變於常故小青黑色是藥染耳勿恆之

甚者斷衣帶坐寢處父下熱又得溫失食失洗不起行但冷食冷洗當風立或心痛如刺坐當食而不食當洗而不洗寒熱相結氣不通結在心中口不得自當移口但與熱酒任不著所苦處溫復易之自解解便速冷食能多益善於諸痛之內心痛最急救之若赴湯火乃可濟耳或有氣斷絕不知人時蹶口不得開病者不自知當須傍人救之要以熱酒爲性命之本不得不下者當斷齒以酒灌咽中咽中穴逆酒入腹還出者但與勿止也出復內之如此或半日酒下氣蘇酒不下者便殺人也或下利如寒中坐行止食飲飲犯熱所致人多疑冷病人又帶癖皆犯熱所爲憤勿疑也速脫衣冷食飲冷洗也或百節痠疼坐臥太厚又入溫被中衣溫不脫衣故也臥下當極薄單布不著縣也當薄且垢故勿著新衣多著故

也雖冬寒常常被頭受風以冷石熨衣帶不得繫也若犯此痠悶者但入冷水浴勿忍病而畏浴也或矜戰患寒如傷寒或發熱如瘧坐食忍飢洗冷不行便坐食臭故也急冷洗起行或惡食如臭物坐溫衣作癖也當急下之若不下萬救終不瘥也或咽中痛鼻塞清涕出坐溫衣近火故也但脫衣冷水洗當風以冷石熨咽頸五六徧自瘥或胷脅氣逆乾嘔坐飢而不食藥氣熏鬲故也但冷食冷飲冷洗即瘥或食下便出不得安坐有癖但下之或淋不得小便久坐溫及騎馬鞍熱入膀胱也冷食以冷水洗小腹以冷石熨一日即止或大行難腹中年固如蟄盤坐犯溫久積腹中乾糞不去故也消酥若膏便寒服一二升浸潤則下不下更服即瘥或寒慄頭掉不自支任坐食少藥氣行於肌膚五臟失守百脉搖動與氣爭競故也努力強飲熱酒以和其脈強冷令冷飲以定其

藏強起行以調其關節酒行食充關機以調則洗了矣云了
者是瑟然病除神明了然之狀也或關節強直不可屈伸坐
久停息不息煩勞藥氣停止絡結不敢越沈滯於血中故也
住力自溫便冷洗即瘥云在力自溫者令行動出力從勞則
發溫也非厚衣近火之溫也或小便稠數坐熱食及敵諸含
熱物餅黍之屬故也以冷水洗少腹服梔子湯即瘥或失氣
不可禁坐犯溫不時洗故也冷洗自寒即止或遺糞不自覺
坐久坐下溫熱氣上入胃少腹不禁故也冷洗即溫小便洗
如刺坐熱熱氣衝肝上奔兩眼故也勤冷食清旦溫小便洗
不過三即瘥或耳鳴如風聲汁出坐自勞出力過矣房室不
節氣逆奔耳故也勤好飲食稍稍行步數食節情即止或口
傷舌強爛燥不得食少穀氣不足藥在胃院中故也急作梔
子豉湯或手足偏痛諸節解身體發癰瘡勒結坐寢處久不

病原方

七

自移從暴熱偏住聚在一處或勒結核痛甚者發如癰腫便
以冷水洗冷石熨微者食頃散也劇者數日水不絕乃差洗
之無限要瘥爲期若大不瘥即取磨刀石火燒令熱赤以石
投苦酒中石入苦酒皆破裂因擣以汁和塗癰上三即瘥取
糞中大蠅蟲擣令熟以塗癰上亦不過三再即瘥尤良或飲
酒不解食不復下乍寒乍熱不洗便熱洗復寒甚者數十日
輕者數日晝夜不得寐愁憂恚怒自驚跳悸恐慌忘誤者
坐犯溫積久寢處失節食熱作癖內實使熱與藥并行寒熱
交爭雖以法救之終不可解也吾嘗如此對食垂涕援刀欲
自刺未及得施賴家親見迫奪故事不行退而自佳乃強食
冷飲水遂止禍不成若終髮矣凡有寒食散藥者雖素聰明
發皆頑嚚告捨難愈也以此死者不可勝計急飲三黃湯下
之當吾之困也舉家知親皆以見分刺賴工凡士元披方得

三黃湯方合使吾服大下即瘥自此常以救急也或脫衣便
寒著衣便熱坐脫著之間無適故小寒自可著小溫便脫即
洗之即癢矣慎勿忍使病發也洗可得了然瘥忍之則病成
矣或齒腫脣爛齒牙搖痛頰車噤坐犯熱不時救故也當風
張口使冷氣入咽喉寒水即瘥或周體患腫不能自轉徙坐
又停息又不飲酒藥氣沈在皮膚之內血脉不通故也飲酒
令洗自勞行即瘥極不能行使入扶或車行之事寧違意勿
聽從之使支節柔調乃止勿令過差過則使極更爲失度熱
者復洗也或患冷食不可下坐又冷食食口中不知味故也

可作白酒漿益著酥熱食一兩頓悶者冷飲還冷食或陰囊
臭爛坐席厚下熱故也坐冷水中即瘥或脚趾間生瘡坐著
覆溫故也脫覆著後以冷水洗足即愈或兩腋下爛作瘡坐
臂脇相親也以物懸手離脇冷熨之即瘥或嗜寐不能自覺

病原六丁

八

女坐熱悶故也急起洗浴飲冷自精了或有癖也當候所宜
下之或夜不得眠坐食少熱在內故也當服梔子湯數進冷
食或咳逆咽中傷清血出坐臥溫故也或食溫故也飲冷水
冷熨咽外也或得傷寒或得溫瘡坐犯熱所爲也凡常服寒
食散雖以火解而更病者要先以寒食救之終不中冷也若
得傷寒及溫瘡者卒可以常藥治之無咎也但不當飲熱藥
耳傷寒藥皆除熱瘡藥皆除癖不與寒食相妨故可服也或
藥發輒并臥不以語人坐熱氣盛食少穀不充邪干正性故
也飲熱酒冷食自勞便佳或寒熱累月張口大呼眼視高精
微不與人相當日用水百餘石澆不解者坐不能自勞又飲
冷酒復食溫食譬如渴人火下更寒以冷救之愈劇者氣結
成冰得熱熨飲則冰銷氣通渴人乃解今藥執聚心乃更寒
戰亦如渴人之類也速與熱酒寒解氣通酒兩行於四肢周

體悉溫然後以冷水二斗洗之儘然了了矣何東裴季彥服
藥失度而處三公之尊人不敢強所欲已錯之後其不能自
知左右人不解救之救之法但飲冷水以水洗之用水數百
石寒遂甚命絕於水中良可痛也夫以十石焦炭二百石水
沃之則炭滅矣藥熱雖甚未如十石之火也沃之不已寒足
殺人何怨於藥乎不可不曉此意世人失救者例多如此欲
服此藥者不唯已自知也家人皆宜習之使熟解其法乃可
用相救也吾每一發氣絕不知人雖復自知有方力不復施
也如此之弊歲有八九幸家人大小以法救之猶時有小違
錯况都不知者哉或大便稠數坐久失節度將死候也如此
難治矣爲可與湯下之儻十得一生耳不與湯必死莫畏不
與也下已致死令不恨也或人困已而脉不絕坐藥氣盛行
於百脉人之真氣已盡唯有藥氣尚自獨行故不絕非生氣

卷六十一

九

也或死之後體故溫如人肌腹中雷鳴顏色不變一兩日乃
似死人耳或灸之尋死或不死坐藥氣有輕重故有死生雖
炎得生生非已疾之法終當作禍宜慎之大有此故也或服
藥心中亂坐服溫藥與疾爭結故也法當大吐下若不吐下
當死若不吐死者冷飲自了然瘥或偏臂脚急痛生久藉待
目溫不自轉移熱氣入肌附骨故也勤以布冷水淹擣之溫
復易之或肌皮勒如木石枯不可得屈伸坐食熱卧溫作癬
久不下五藏閼閉血脉不周通故也但下之冷食飲酒自勞
行即瘥或四肢面目皆浮腫坐食飲溫又不自勞藥與正氣
停井故也飲熱酒冷食自勞冷洗之則瘥或順無所見坐飲
食居處溫故也脫衣自洗但冷飲食須臾自明了或鼻中作
蝦雞子臭坐著衣溫故也脫衣冷洗即瘥或身皮楚痛轉移
不在一處如風坐犯熱所爲非得風也冷洗熨之即瘥或脚

癉欲折由父坐下溫宜坐單牀上以冷水洗即愈或苦頭眩
目疼不用食由食及犯熱心萬有僻故也可下之或臂脚偏
急苦痛者由父坐卧席温下熱不自移轉氣入肺胃脾胃故
也勤以手中淹冷水迫之溫則易之如此不過兩日即瘥凡
治寒食藥者雖治得瘥師終不可以治爲恩非得治人後忘
得効以皆如文摯治齊王病先使王怒而後病已文摯以是
雖愈王病而終爲王所殺今救寒食者要當逆常理反正性
成犯怒之自非達者得瘥之後心念犯怒之怨不必得治之
恩猶齊王殺文摯也后與太子不能救况於凡人哉然死生
大事也如知可生而不救之非仁者也唯仁者心不已必冒
犯怒而治之爲親戚之故不但其人而已凡此諸效皆吾所
親更也試之不借問於他人也要當違人理反常性重衣更
寒一反也飢則生臭二反也極則自勞三反也溫則帶利四

病源下

十

反也飲食欲寒五反也癰瘡水洗六反也當洗勿失時一急
也當食勿忍飢二急也酒必淳清令溫三急也衣溫便脫四
急也食必極冷五急也卧必衣薄六急也食不厭多七急也
冬寒欲火一不可也飲食欲熱二不可也常疹自疑三不可
也畏避風涼四不可也極不能行五不可也飲食畏多六不
可也居貧厚席七不可也所欲從意八不可也務違常理一
無疑也委心弃本二無疑也寢處必寒三無疑也

解散瘀癖候

服散而飲過度將適失宜衣厚食溫則飲結成瘀癖其狀瘀
多則眉鬲不滿頭眩痛癖結則心脇結急是也

解散除熱候

夫服散之人覺熱則洗覺飢則食若洗食不時失其節度令
石勢壅結否塞不解而生熱故須以藥除之

解散浮腫候

服散而浮腫者由食飲溫而又不自勞藥勢與血氣相并使氣壅在肌膚不得宣散故令浮腫或外有風濕內有停水皆與散勢相搏致令煩熱而氣壅滯亦令浮腫若食飲溫不自勞而腫者但煩熱虛腫而已其風濕停水而已者則心腫而煩熱或小便澁而腫

解散渴候

夫服石之人石勢歸於腎而勢衝府藏府藏既熱津液渴燥腎惡燥故渴而引飲也

解散上氣候

服散將消失所取溫太過熱搏榮衛而氣逆上其狀脣滿短氣是也

解散心腹痛心潔候

病源六丁

十一

鬲間有寒胃脘有熱寒熱相搏氣逆攻腹乘心故心腹痛其寒氣盛勝於熱氣榮衛祕澀不通寒氣內結於心故心腹痛而心潔寒也其狀心腹痛而戰慄不能言語是也

解散大便祕難候

將適失宜犯溫過度散勢不宣熱氣積在腸胃故大便祕難也

解散虛冷小便多候

將適失度熱在上焦下焦虛冷冷氣乘於胞故胞冷不能制於小便則小便多

解散大便血脉

將適失度或取熱或傷冷觸動於石冷熱交擊俱乘於血致動血氣血滲入於大腸腸虛則泄故大便血

解散卒下利候

行止違節飲食失度犯觸解散而腸胃虛弱故卒然下利也

解散下利後諸病候

服散而飲食失度居處違節或霍亂或傷寒或服藥而下利利雖斷而血氣不調石勢因動致生諸病其狀或手足煩熱或口噤或嘔逆之類是也隨其病證而解之

解散大小便難候

積服散散勢盛在內熱氣乘於大小腸大小腸否瀉故大小便難也

解散小便不通候

夫服散石者石勢歸於腎而內生熱熱結小腸胞內否瀉故小便不通

解散熱淋候

痛原六丁

十一

失度虛熱相搏熱乘於腎腎主水水行小腸入胞爲小便腎虛則小便數熱結則小便澀澀則莖內痛故淋瀝不快也

解散發黃候

飲酒內熱因服石石勢又熱熱搏脾胃脾胃主土其色黃而候於肌肉積熱蘊結蒸發於肌膚故成黃也

解散脚熱腰痛候

腎主腰脚服石熱歸於腎若將適失度發動石熱氣乘腰脚石與血氣相擊故脚熱腰痛也其狀脚煩熱而腰攣痛

解散鼻塞候

石發則將冷其熱盡之候冷氣不退者冷乘於肺肺主氣開竅於鼻其冷滯結不宣通故鼻塞

解散發瘡候

將適失且外有風邪內有積熱熱乘於血血氣壅滯故使生

瘧

解散癰腫候

六府不和而成癰夫服散之人若將適失宜散動熱氣內乘六府六府血氣行於經脈經脈爲熱所搏而外有風邪乘之則石熱癰結血氣否澀而成癰腫

解散煩悶候

將適失宜冷熱相搏石勢不宣化熱氣乘於藏故令煩悶也解散嘔逆候

將適失宜脾胃虛弱者石勢結滯乘於脾胃致令脾胃氣不和不勝於穀故氣逆而嘔調之即愈

解散目無所見目疼候

將適失宜飲食乖度鬲內生痰熱痰熱之氣熏肝肝候目故目無所見而疼痛

十三

解散心腹脹滿候

居處犯溫致令石勢不宣內壅府藏與氣相搏故心腹脹滿解散挾風勞候

本患風勞而服散石風勞未盡石勢固發解石之後體尚虛羸故猶挾風勞也

解散飲酒發熱候

服散而積飲酒石因酒勢而盛敷散經絡故煩而發熱也

傷寒病諸候

上 凡二十三論

傷寒候

經言春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冰寒此則四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒夫觸冒之者乃爲傷耳其傷於四時之氣皆能爲病而以傷寒爲毒藏於肌骨中不春變爲溫病夏變爲暑病暑病者熱重於溫也是以辛苦之人春夏必有溫病者皆由其冬時觸冒之所致非時行之氣也其時行者是春時應暖而反寒夏時應熱而反冷秋時應涼而反熱冬時應寒而反溫非其時而有其氣是以一歲之中病無少長多相似者此則時行之氣也

夫傷寒病者起自風寒入於腠理與精氣交爭榮衛否隔周行不通病一日至二日氣在孔竅皮膚之間故病者頭痛惡寒腰背強重此邪氣在表洗浴發汗即愈病三日以上氣浮在上部胷心填塞故腹脹身重骨節煩疼當吐之則愈病五日以上氣深結在藏故腹脹身重骨節煩疼當下之則愈夫熱病者皆傷寒之類也或愈或死皆以六七日間其愈皆以十日以上何也巨陽者諸陽之屬也其脉連於風府故爲諸陽主氣人之傷於寒也故則爲病熱雖甚不死其兩感於寒而死者必死兩感於寒者其脉應與其病形何如而傷於寒者病一日則巨陽與少陰俱病則頭痛口乾煩渴二日則陽明與太陰俱病則腹滿身熱不食譖言三日則小陽與厥陰俱病則耳聾囊縮厥逆水漿不入則不知人六日而死夫五藏已傷六府不通榮衛不行如是之後三日乃死何也陽明素

一經脈之長也其氣血盛故不知人三日其氣乃盡故死其不兩傷於寒者一日巨陽受之故頭項痛腰脊強二日陽明受之陽明主肉其脈夾鼻絡於目故身熱而鼻乾不得卧三日少陽受之少陽主滑其脈循腸絡於耳故胃脇痛耳聾三陽經絡皆受病而未入通於藏也故可汗而已四日太陰受之太陰脉布於胃絡於嗌故腹滿而嗌乾五日少陰受之少陰脉貫腎絡肺繫舌本故口熱舌乾而渴六日厥陰受之厥陰脉循陰器而絡於肝故煩滿而囊縮一陰三陽五藏六府皆病榮衛不行五藏不通則死矣其不兩感於寒者七日巨陽病衰頭痛少愈八日陽明病衰身熱少愈九日少陽病衰耳聾微聞十日太陰病衰腹滿如故則思飲食十一日少陰病衰渴止不滿舌乾已而數十二日厥陰病衰囊從少腹微下大氣皆去病日已矣治之柰何治之各通其藏脉病日

源一

二

衰其病未滿三日者可汗而已其病三日過者可泄之而已太陽病頭痛至七日已上並自當愈其經竟故也若欲作再經者當針補陽明使經不傳則愈矣相病之法視色聽聲觀病之所候脉要史豈不微乎脉洪大者有熱此傷寒病也夫傷寒脉洪浮秋佳春成病寸口脉緊者傷寒頭痛脉來洪大傷寒病少陰病惡寒拳而利手足四逆者不治其人吐利躁逆者死利止而眩時時自冒者死四逆惡寒而拳其脉不至其人不煩而躁者死病六日其息高者死傷寒熱盛脉浮大者生沈小者死頭痛脉短濇者死浮滑者生未得汗脉盛大者生細小者死診人凜凜大熱其脉細小者死不治傷寒脉病脉盛躁不得汗者此陽之極十死不治未得汗脉躁疾得汗生不得汗難瘥頭痛脉反濇此爲逆不治脉浮而大易治細微爲難治發汗若吐下者若汗無津夜者而陰陽自

必愈夫下後發汗其大小便不利此亡津液勿治其小便必
自愈陽已虛尺中弱者不可發其汗也咽乾者不可發其汗
也傷寒病脈弦細頭痛而發熱此爲屬少陽少陽不可發汗
發汗則誠語爲齎胃胃和則愈不和則煩而悸少陰病脈細
沈而微病在裏不可發其汗少陰病脉微亦不可發汗無^所
故也陽已虛尺中弱澀者復不可下太陽病發熱而惡寒熱
多而寒少脉微弱則無陽不可發其汗脉浮可發其汗發熱
自汗出而不惡寒關上脉細數不可吐若諸四逆病厥者不
可吐虛家亦然寒多熱少可吐者此謂發多也治癰亦如之
頭項不強痛其脉微胷中幅半衝喉咽不得息可吐之治傷
寒欲下之切其脉牢牢實之脉或不能悉解宜摸視手掌濶
濶汗濕者便可下矣若掌不汗病雖宜下且當消息溫暖身
體部皆津液通掌亦自汗下之即了矣太陰之爲病腹滿吐
食不可下下之益甚時腹自痛下之胷下結半脉浮可發其

病源十七

三

汗陽明病心下牢滿不可下下之遂利殺人不可不審不可
脫爾禍福正在於此太陽與少陽合病心下牢頭項強眩不
可下三陽并病腹滿身重大小便調其脉浮牢而數渴欲飲
水此不可下其湯熨針石別有正方補養宣導今附於後
養生方導引法云端坐生腰徐以鼻內氣以右手持鼻閉目
吐氣治傷寒頭痛洗洗背當以汗出爲度

又一舉左手頸左足仰掌鼻內氣四十息之除身熱背痛
傷寒發汗不解候

傷寒初一日至二日病在皮膚名爲在表表者陽也法宜發
汗今發汗而不解者此是陽不受病陽受病者其人身體疼
痛發熱而惡寒勃奮拘急脉洪大有此證候則爲病在表發
汗則愈若但煩熱不惡寒身不疼痛此爲表不受病故雖強

發其汗而不能解也

傷寒取吐候

傷寒大法四日病在胃陽當吐之愈有得病三日便心腎煩悶此爲毒氣已入有痰實者便宜取吐

中風傷寒候

中風傷寒之狀陽浮熱自發陰弱汗自出嗇嗇惡寒風噏噏發熱鼻鳴乾嘔此其候也太陽病中風以火劫發其汗邪風被火熱而氣流溢矢常兩陽相熏灼其身發黃陽盛即欲衄虛則小便難陰陽俱虛竭身體則枯燥但頭汗出齊頸而還腹滿微喘口乾咽爛或不大便久則誠言甚者至嘔手足躁擾尋衣摸牀小便利者其人可治陽明中風口苦而咽乾腹滿微訥寒寒脈浮若緊下之則腹滿小便難陽明病能食爲中風不能食爲中寒少陽中風兩耳無聞目赤胷中

〔病源七〕

四

滿而煩不可吐之吐之則悸而驚太陰中風四支煩疼其脉陽微陰澀而長爲欲愈少陰中風其脉陽微陰浮爲欲愈厥陰中風其脉微浮爲欲愈不浮爲未愈

傷寒一日候

傷寒一曰大陽受病太陽者膀胱之經也爲二陽之首故先受病其脉絡於腰脊主於頭項故得病一日而頭項背腰脊痛也

傷寒二日候

傷寒二日陽明受病陽明胃之經也主於肌肉其脉絡鼻入心故得病二日肉熱鼻乾不得眠也諸陽在表表始受病在皮膚之間可摩膏火灸發汗而愈

傷寒三日候

傷寒三日少陽受病少陽者膽之經也其脉循於脣上於頭

耳故得病三日脅脹熱而耳聾也三陽經絡始相傳病未入於藏故皆可汗而解

傷寒四日候

傷寒四日太陰受病太陰者脾之經也爲三陰之首是故三日已前陽受病訖傳之於陰而太陰受病爲其脉絡於脾主於喉嗌故得病四日腹滿而嗌乾也其病在胃鬲故可吐而愈

傷寒五日候

傷寒五日少陰受病少陰者腎之經也其脈貫腎絡肺繫於舌故得病五日口熱舌乾渴而引飲也其病在腹故可下而愈

傷寒六日候

傷寒六日厥陰受病厥陰者肝之經也其脈循陰器絡於肝

病源二十一

七

故得病六日煩滿而囊縮也此則陰陽俱受病毒氣在胃故可下而愈

傷寒七日候

傷寒七日病法當小愈陰陽諸經傳病竟故也今七日已後病反甚者欲爲再經病也再經病者是陰陽諸經絡重受病故也

傷寒八日候

傷寒八日病不解者或是諸陰陽經絡重受於病或因發汗吐下之後毒氣未盡所以病證猶有也

傷寒九日已上候

傷寒九日已上病不除者或初一經受病即不能相傳或已傳三陽訖而不能傳於陰致停滯累日病證不能者或三陽三陰傳病已竟又重感於寒名爲兩感傷寒則府藏俱病

日數多而病候改變

傷寒咽喉痛候

傷寒病過經而不愈脉反沈遲手足厥逆者此爲下部脉不至陰陽隔絕邪客於足少陰之絡毒氣上熏故咽喉不利或痛而生瘡

傷寒班瘡候

傷寒病證在表或未發汗或發汗未解或吐下後而熱不除此毒氣盛故也毒既未散而表已虛熱毒乘虛出於皮膚所以發班瘡隱軫如錦文重者喉口身體皆成瘡也

傷寒口瘡候

夫傷寒久時發其汗必吐利口中爛生瘡以其表裏俱虛熱熱不已毒氣重上焦故也

傷寒登豆瘡候

病源七十一

六

傷寒熱毒氣盛多發疱瘡其瘡色白或赤發於皮膚頭作癰漿戴白膿者其毒則輕有紫黑色作根隱隱在肌肉裏其毒重則甚者五內七竅皆有瘡其瘡形如登豆故以名焉

傷寒登豆瘡後減癰候

傷寒病發瘡者皆是熱毒所爲其病折則瘡愈而毒氣尚未全散故瘡痂雖落其瘢猶纏或凹凸內起所以宜用消毒減癰之藥以傳之

傷寒謬語候

傷寒四五日脉沈而喘滿者沈爲在裏而發汗其津液越出大便爲難表虛裏實父火則誠語發汗後重發其汗亡陽誠語其脉反和者不死陽明病下血而誠語者此爲熱入血室但頭汗出當刺期門穴隨其竇者而瀉之瀉然汗出者則愈病若讒言妄語身當有熱脉當得洪大而反手足四肢脉反

沈細而微者死病也讞言妄語身熱腺洪大者生沈細微不足四逆者死

傷寒煩候

此由陰氣少陽氣勝故熱而煩滿也少陰病惡寒而舉時自頑欲去其衣被者可治也病脈已解而反發煩者病新瘥又強與穀脾胃氣尚弱不能消穀故令微煩損穀即愈少陰病脈微細而沈但欲臥汗出不煩欲自吐五六日自利後煩躁不得卧寐者死發汗後下之脉平而小頑此新虛不勝穀氣故也

傷寒虛煩候

傷寒發汗吐下已後府藏俱虛而熱氣不散故虛煩也

傷寒煩悶候

傷寒毒氣攻胃故煩悶或服藥已後表不解心下有水氣其

病源考

七

人微嘔熱滿而煩悶也

傷寒渴候

傷寒渴者由熱氣入於藏流於少陰之經少陰主腎腎惡燥故渴而引飲

傷寒嘔候

傷寒陽明病熱入胃與穀氣并故令嘔或已經吐下虛熱在藏必飲水水入則胃家虛冷亦嘔也傷寒發熱無汗嘔不能食而反汗出濺然是爲轉在陽明傷寒嘔多雖有陽明證不可攻也少陰病下利脈微濺者即嘔汗者必數更衣反少當溫其上炎其厥陰渴欲飲水者與之愈

傷寒乾嘔候

此謂熱氣在於脾胃也或發汗解後胃中不和尚有蓄熱熱氣土壅則心下否結故乾嘔

傷寒吐逆候

傷寒少陰病其人飲食入則吐或心中溫溫欲吐不能當家
吐之若始得之手足寒脉弦遲此中有寒飲不可吐也當溫
之病人脈數數為有熱當消穀引食反吐者師發其汗陽微
禹氣虛脉則為數數為客陽不能消穀胃中虛冷故也

傷寒噦候

傷寒大吐下之後極虛復虛極其水鬱以發其汗者因得噦
所以然者背寒中冷故也傷寒噦而滿者視其前後知何部
不利利之即愈陽明病能食下之不解其人不能食攻其熱
必噦所以噦者胃中虛冷故也又病人本虛伏熱在胃則胃
滿脅滿則氣逆氣逆不可攻其熱攻其熱必噦

傷寒喘候

傷寒太陽病下之微喘者外未解故也夫發汗後飲水者必
喘以水停心下腎氣乘心故喘也以水灌之亦令喘也

傷寒厥候

厥者逆也逆者謂手足逆冷也此由陽氣暴衰陰氣獨盛陰
勝於陽故陽脈為之逆不通於手足所以逆冷也傷寒一日
至四五日厥者必發熱前發熱者後必厥厥深熱亦深厥微
熱亦微厥下之發其汗者口傷爛亦傷寒先厥發熱半利必
自止而反汗出必咽喉中強痛甚為喉痺發熱與汗而利必
自止不止便膿而便膿血者其喉不痺傷寒先厥者不可下
之發熱而利者必止見厥復利傷寒病厥五日熱亦五日設
六日當復厥不厥之者曰愈厥不過熱五日故知愈也發熱
而厥七日而下利者為難治其脈從手足厥逆者可灸之下
利手足厥無脉灸之不溫反微喘者死下利厥煩躁不能眠
者死病六七日其脈數手足厥煩躁陰厥不還者死發熱下

利至厥不止者死下利後其脈絕手足厥卒時脈還手足溫者爲生不還者死

傷寒悸候

悸者動也謂心下悸動也此由傷寒病發汗已後因又下之內有虛熱則渴渴則飲水水氣乘心必振寒而心下悸也太陽病小便不利者爲多欲水心下必悸小便少者必苦裏急夫脉浮數法當汗出而愈而下之身體重心悸不可發汗當自汗出而解所以然者尺中微裏虛表實津液自和便自汗出愈也

傷寒瘽候

瘽之爲狀身熱足寒項頸強惡寒時頭熱面目熱搖頭卒口噤背直身體反張是也此由肺移熱於腎傳而爲瘽瘽有剛柔太陽病發熱無汗而反惡寒爲剛瘽發熱汗出而惡寒爲

柔瘽診其脉沈細此爲瘽也

傷寒心否候

太陽少陰并病脉數緊而下之緊反入裏則作否否者心下滿也病發於陰者不可下下之則心下否按之自更但氣否耳不可復下也若熱毒氣乘心心下不滿而亦目黃狂言恍惚者此爲有實宜速吐下之

傷寒結胷候

結胷者謂熱毒結聚於心胷也此由病發於陽而早下之熱氣乘虛而不結不散也按之痛其脉寸口浮關上反自沈是也脈大不可下下之即死脉浮而大下之爲逆若陽脉浮關上細沈緊而飲食如故時小便利者名爲藏結藏結病舌上白胎滑爲難治不往來寒熱其人反靜舌上不胎者不可攻之

○傷寒病諸候

下

凡四十四論

傷寒餘熱候

傷寒病其人或未發汗吐下或經服藥已後而脉洪大實數腹內脹滿小便赤黃大便難或煩或渴面色變赤此爲府藏有結熱故也

傷寒五藏熱候

傷寒病其人先苦身熱嗌乾而渴飲水即心下滿酒浙身熱不得汗惡風時效逆者此肺熱也若其人先苦身熱嗌乾而小腹繞臍痛腹下滿狂言默默惡風欲嘔者此肝熱也若其人先苦手掌心熱煩心欲嘔身熱心下滿口乾不能多飲日黃汗不出欲得寒水時妄笑者此心熱也若其人先苦身熱

四肢不舉足胫寒腹滿欲嘔而泄惡聞食臭者此脾熱也若其人先苦嗌乾內熱連足胫腹滿大便難小便赤黃腰脊痛者此腎熱也

傷寒變成黃候

陽明病無汗小便不利心中懊憹必發黃若被火額上微汗出而但小便不利亦發黃其人狀變黃如橘色或如桃枝色腹微滿此由寒濕氣不散瘀熱在於脾胃故也

傷寒心腹脹滿痛候

此由其人先患冷瘽因發熱病服冷藥及飲冷水結在心下此爲藏虛動於舊癖故也或吐下已後病不解內外有熱故心腹脹滿痛此爲有實也

傷寒宿食不消候

此謂被下後六七日不大便煩熱不解腹滿而痛此爲胃以

有乾糞挾宿食故也或先患寒癬因有宿食又感於傷寒熱氣相搏故宿食不消

傷寒大便不通候

傷寒陽脈微而汗出少爲自始汗出多爲太過陽明脉實因發其汗汗出多者亦爲太過太過者陽氣絕於裏陽氣絕於裏則津液竭熱結在內故大便牢而不通也

傷寒小便不通候

傷寒發汗後而汗出不止津液少胃內極乾小腸有伏熱故小便不通

傷寒熱毒利候

此由表實裏虛熱氣乘虛而入攻於腸胃則下黃赤汁此熱毒所爲也

傷寒膿血利候

此由熱毒傷於腸胃故下膿血如魚腦或如爛肉汁壯熱而腸痛此濕毒氣盛故也

傷寒利候

傷寒病若表實裏虛熱乘虛而入攻於腸胃則下黃赤汁若濕毒氣盛則腹痛壯熱下膿血如魚腦如爛肉汁若寒毒入胃則腹滿身熱下清下清者不可攻其表汗出必脹滿表裏俱虛故也傷寒六七日不利更發熱而利者其人汗出不止者死但有陰無陽故也下利有微熱其人渴脉弱者今自愈脉沈弱弦者下重其脉大者爲未止脉微數者爲欲自止雖發熱不死少陰病八九日而身手足盡熱熱在膀胱必便血下利脉浮數尺中自滑其人必清膿血若利止惡寒而拳手足溫者可治也陽明病下利其脉浮大此皆爲虛弱強下之故傷寒下利日十餘行其脉反實死

傷寒病後胃氣不和利候

此由初受病時毒熱氣盛多服冷藥以自瀉下病折已後熱勢既退冷氣乃動故使心下幅牢噫噦食臭腹內雷鳴而泄利此由脾胃氣虛冷故也

傷寒上氣候

此由寒毒氣傷於太陰經也太陰者肺也肺主氣肺虛爲邪熱所客客則脹脹則上氣也

傷寒欬嗽候

此由邪熱客於肺也上焦有熱其人必飲水水停心下則肺爲之浮肺主於欬水氣乘之故欬嗽

傷寒衄血候

傷寒病血衄者此由五藏熱結所爲也心主於血肝藏於血熱邪傷於心肝故衄血也衄者鼻血出也肺主於氣而開竅於鼻血隨氣行所以從鼻出陽明病口燥但欲漱水不欲咽者必衄衄家不可攻其表汗出額上頭急而緊直視而不能眴不得眠亡血不可攻其表汗出則寒慄而振脉浮緊發熱其身無汗自衄者愈

傷寒吐血候

此由諸陽受邪熱初在表應發汗而汗不發致使熱毒入深結於五藏內有瘀積故吐血

傷寒陰陽毒候

夫欲辨陰陽毒病者始得病時可看手足指冷者是陰不冷者是陽若冷至一二三寸者病微若至肘膝爲病極過此難治陰陽毒病無常也或初得病便有毒或服湯藥經五六日以上或十餘日後不瘥變成毒者其候身重背強喉咽痛癢渴不下毒氣攻心心腹煩痛短氣四肢厥逆嘔吐體如被打

斑此皆其候重過三日則難治陽毒者面目赤或便膿血
陰毒者面目青而體冷若發赤斑十生一死若發黑斑十死
一生陽毒爲病面目斑斑如錦紅咽喉痛清便膿血七日不治
五日可治九日死十一日亦死

壞傷寒候

此謂得病十二日已上六經俱受病訖或已發汗吐下而病
證不解邪熱留於腑臟致令病候多變故曰壞傷寒本太陽
病不解轉入少陽脇下牢滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐
下其脉沈緊與小柴胡湯若已吐下發汗飲柴胡證罷此爲
壞病知犯何逆以法治之寸口脉洪而大數而滑洪大榮氣
長滑數胃氣實榮長陽即盛鬱拂不得出胃實即牢大便難
即乾燥三焦閉塞津液不通醫已發陽氣盛不用復重下之
胃燥畜大便遂儻小便不利榮衛相搏煩心發熱兩目如火

鼻乾面正赤舌燥齒黃焦故大渴過經成壞病

傷寒百合候

病源八

四

百合病者謂無經絡百脉一宗悉致病也多因傷寒虛勞大
病之後不平復變成斯疾也其狀意欲食復不能食常默默
欲得臥復不得臥欲出行復不能行飲食或有美時或有不
用飲時如強健人而臥不能行如有寒復如無寒如有熱復
如無熱若小便赤黃百合之病諸藥不能治得藥即剝吐利
如有神靈者身形如和其人脉微數每死輒頭痛其病六十
日不愈若眾頭不痛浙然者四十日愈若眾快然但眩者
二十日愈體證或未病而預見或病四五日而出或病二十
日一月微見其狀惡寒而嘔者病在上焦也十二日當愈
其狀腹滿微喘大便鞶三四日大便時復小溏者病在中焦
也六十二日當愈其狀小便淋瀝難者病在下焦也四十七

曰當愈各隨其證以治之耳

傷寒狐惑候

夫狐惑一病者是喉陰之爲病也初得狀如傷寒或因傷寒而變成斯病其狀默默欲眠目攣不得臥起不安蟲食於喉咽爲惑食於陰肛爲狐惡飲食不欲聞食臭其人面目翕赤翕黑翕白食於上部其聲嗄食於下部其咽乾此皆由濕毒氣所爲也

傷寒濕瘞候

凡得傷寒時氣熱病腹內有熱又人食少腸胃空虛二蟲行作求食食人五藏及下部瘞病之候齒無色舌上盡白甚者脅裏有瘞內支沈重易忽喜眠如此皆爲蟲食其肛肛亂見五藏即死當數者其上脅內有瘞唾血脅內如粟瘞者則心內懊憹痛此蟲在上食其五藏下脅內生瘞者其人不寤此

病源六

五

蟲食下部皆能殺人

傷寒下部痛候

此由大腸偏虛毒氣衝於肛門故下部卒痛甚著痛如鳥啄

傷寒病後熱不除候

此謂病已間五藏尚虛客邪未散真氣不復故曰暮猶有餘熱如瘞狀此非真實但客熱也

傷寒病後渴候

此謂經發汗吐下已後腑藏空虛津液竭絕腎家有餘熱故渴

傷寒病後不得眠候

夫衛氣晝行於陽夜行於陰陰主夜夜主臥謂陽氣盡陰氣盛則目瞑失令熱氣未散與諸陽并所以陽獨盛陰偏虛雖復病後仍不得眠者陰氣未復於本故也

傷寒病後虛羸候

其人血氣先虛復爲虛邪所中發汗吐下之後經絡損傷陰陽竭絕熱邪始散真氣尚少五藏猶虛穀神未復無津液以榮養故虛羸而生病焉

傷寒病後不能食候

此由陽明太陰受病被下之後其熱已除而脾胃爲之虛冷穀氣未復故不能食也

傷寒病後虛汗候

夫諸陽在表陽氣虛則自汗心主於汗心藏偏虛故其液妄出也

傷寒內有瘀血候

夫人先癥結在內因傷寒病若熱搏於少腹則發熱如狂若有寒則小腹滿小便反利此爲血瘀宜下之其脉沈結者血證歸也

方八一

六

傷寒毒攻眼候

肝開竅於目肝氣虛熱乘虛上衝於目故目赤痛重者生翳翳白膜息肉

傷寒毒攻足候

此由熱毒氣從內而出循經絡攻於足也入五臟六腑并榮俞皆出於手足指故毒從臟腑而出

傷寒毒流腫候

人陰陽俱虛濕毒氣與風熱相搏則榮衛澀榮衛澀則血氣不散血氣不散則邪熱致壅隨其經絡所生而流腫也

傷寒病後脚氣候

此謂風毒濕氣滯於腎經腎主腰脚今腎既濕故脚弱而其人小腸有餘熱即小便不利則氣上脚弱而氣上故爲

氣也

傷寒病後霍亂候

霍亂吐下利止後更發熱傷寒其脉微澀本是霍亂今は傷寒却四五日至陰經上轉入陰當利本素嘔下利者不治若其人即欲大便但反失氣而不利是爲更屬陽明心強二十日愈所以然者經竟故也下後當強強能食者愈今反不能食到後經中頗能食復一經能食過之一日當愈若不愈者不屬陽明也惡寒脉微而後利利止必亡血

傷寒病後瘧候

病後邪氣未散陰陽尚虛因爲勞事致一氣交爭陰勝則發寒陽勝則發熱故寒熱往來有時休作而成瘧也

傷寒病後渴利候

此謂大渴飲水而小便多也其人先患勞損大病之後腎氣

病源八

七

虛則熱熱乘之則腎燥腎燥則渴渴則引水腎虛則不能制水故飲水數升小便亦數升名曰渴利也

傷寒肺萎候

大發汗後因復下之則亡津液而小便反利者此爲上虛不能制於下也虛邪中於肺肺萎之病也欲飲而不能唾濁涎沫此爲肺萎之病也

傷寒失聲候

邪客於肺肺主聲而通於氣今外邪與真氣相搏真氣虛而邪氣勝故聲爲之不通也

傷寒夢泄精候

邪熱乘於腎則陰氣虛陰氣虛則夢交通腎藏精今腎虛不能制於精故因夢而泄

傷寒勞候

傷寒病新瘥津液未復血氣尚虛若勞動早更復成病故勞復也若言語思慮則勞神梳頭澡洗則勞力勞則生熱熱氣乘虛還入經絡故復病也其脉緊者宜下之

傷寒病後食復候

傷寒病新瘥及大病之後脾胃尚虛穀氣未復若食猪肉腸血肥魚及久臍物必大下利醫所不能治也必至於死若食餅糲黍飴餌餅炙鱠棗栗諸菓脯物及牢強難消之物胃氣虛弱不能消化必更結熱適以藥下之則胃虛冷大利難禁不可下之必死下之亦危皆難救也大病之後多坐此死不慎護也夫病之新瘥後但得食糜粥寧少食乃飢慎勿飽不得他有所食雖思之勿與引日轉久可漸食羊肉糜若羹慎不可食猪狗等肉

傷寒病後令不復候

病源八

八

傷寒病後多因勞動不節飲食過度更發於病名之為復者謂復病如初也此由經絡尚虛血氣未實更致於病耳令預服藥及為方法以防之故云令不復也

傷寒陰陽易候

陰陽易病者是男子婦人傷寒病新瘥未平復而與之交接得病者名爲陰陽易也其男子病新瘥未平復而婦人與之交接得病者名陽易其婦人得病新瘥未平復而男子與之交接得病者名陰易若二男二女並不相易所以呼爲易者陰陽相感動其毒度着如人之換易也其得病之狀身體熱衝胷頭重不能舉眼內生昧四支拘急小腹疗痛手足拳皆即死其亦有不即死者病苦小腹裏急熱上衝胷頭重不欲舉百節解離經脉緩弱氣血虛骨髓空竭便呴呴吸吸氣力轉少著牀不能搖動起居仰人或引歲月方死

傷寒交接勞復候

夫傷寒病新瘥未滿百日氣力未平復而以房室者略無不
也死有得此病愈後六十日其人已能行射獵因而房室即
吐涎而死病雖云瘥若未平復不可交接必小腹急痛手足
拘拳二時之間亡范汪方云故督郵顧子獻得病已瘥未健
詣華東視脉東曰雖瘥尚虛未平復陽氣不足勿為勞事也
能勞尚可女勞即死臨死當吐舌數寸虧婦聞

傷寒令不相染易候

傷寒之病但人有自觸冒寒毒之氣生病者此則不染着他人
若因歲時不和溫涼失節人感其乖戾之氣而發病者此則多
相易故須預服藥及為方法以防之

