

濟生拔粹方

四







論藥目錄 濟生校梓 卷第 濟生校梓 濟生校梓

補脾胃瀉陰火升陽湯 升陽散毒湯 羌活勝濕湯 行太湯 細

通氣防風湯 胃弱 羌活勝濕湯 行太湯 細

黃耆人參湯 胃弱 除風濕羌活湯 風濕

調中益氣湯 腸僻 清氣益氣湯

涼血止黃湯 腸僻 除濕防風湯 裏急後重

清神益氣湯 胃虛損 白木天麻湯 中風

八木共藥湯 益弱 麻黃人參芍藥湯 咽血

升陽散火湯 火鬱 安胃湯 按心

清胃散 腸胃熱 清陽湯 口咽

清風湯 虛勝 調胃湯 虛勝

清燥湯 虛勝 助陽和血補氣湯 眼赤

升陽湯 虛勝 升陽除濕湯 泄瀉

益胃湯 虛勝 牛薑和中湯

強胃湯 虛勝 和中丸

養香安胃湯 胃弱 葛花解醒湯 酒病

除濕散 傷乳酪 五苓散 小便不利

枳朮丸 痞 橘皮枳朮丸 氣痞

半夏枳朮丸 冷傷 木香乾薑枳朮丸 寒滯

木香人參生薑枳朮丸 開麴 木香乾薑枳朮丸 腹痛

木香枳朮丸 氣痞 三黃枳朮丸 腹痛

獨飲枳朮丸 痞 木香化滯湯 心下痞

丁香爛飯丸 心胃 單黃散 胃痛

除濕散 胃痛 上 黃丸 胃痛

除濕散 胃痛 上 黃丸 胃痛

除濕散 胃痛 上 黃丸 胃痛

除濕散 胃痛 上 黃丸 胃痛



救急瀉滯丸

救急瀉滯丸

白朮丸 傷食

升陽順氣湯 滿悶

三稜消積丸 傷冷硬物

和中丸 久壅

實中進食丸 喜食

交泰丸 升陽除喘

胃功散 胃虛

雄黃聖餅子 腹痛

神保丸 心曠痛

白朮安胃丸 瀉

感應丸 積熱

阿黎勒丸 休息痢

當歸和血散 濕毒下血

三黃丸 積熱

黃風湯 下血

加減平胃散 脾胃不和

道氣除燥湯 小便閉

丁香菜羹湯 胃虛

草豆蔻丸 脾胃虛痛

神聖復氣湯 氣逆

備急大黃丸 心痛

神應丸 傷冷物

益胃散 胃脘痛

脾胃論藥目録 濟生校梓卷第七



脾胃論

脾胃勝衰論 治法并方



胃中元氣盛則能食而不傷過時而不飢脾胃俱旺則能食而肥脾胃俱虛則不能食而瘦或少食而肥雖肥而四肢不舉蓋脾胃實而邪氣盛也又有善食而瘦者胃伏火邪於氣分則能食脾胃虛則肌肉削即食休也叔和謂多食亦肌虛此之謂也夫飲食不節則胃病胃病則氣短精神少而生大熱有時顯火上行獨燎其面面熱足陽明病胃病則脾無所稟受脾為死陰不主時也故亦從而病焉形體勞役則脾病脾病則怠墮嗜臥四肢不收大便泄瀉脾既病則胃不能獨行津液故亦從而病焉大抵脾胃虛弱陽氣不能生發是春夏之令不行五藏之氣不生脾病則下流乘腎土尅水則骨之無力是為骨蝕令人骨髓空

虛足不能履地是陰氣重疊此陰盛陽虛之證汗之則愈下之則死若用辛甘之藥茲胃當升當浮使生長之氣旺言其汗者非止發汗也為助陽也夫胃病其脈緩脾病其脈遲若人當臍有動氣按之牢若痛乃火乘土位其脈洪緩更有身熱心中不便之證此陽氣衰弱不能生發不當於五藏中用藥法治之當從藏氣法時論中升降浮沉補瀉法用藥耳如脈緩怠墮嗜臥四肢不收或大便泄瀉此濕勝從平胃散若脈弦氣弱自汗四肢發熱或大便泄瀉或皮毛枯槁髮脫落從黃耆建中湯脈虛而血弱於四物湯中摘一味或一味以本顯證中加之或真氣虛弱及氣短脈弱從四君子湯或小便秘澀赤黃多少從五苓散去桂摘一二味加正藥中已上五藥當於本證中隨所兼見證加減假令表虛自汗春夏加黃耆秋冬加桂如腹中急痛或



脈弦加防風急甚加甘草腹中窄狹或氣短者亦加之腹滿氣不轉者勿加雖氣不轉而脾胃中氣不和者勿去但加厚朴以破滯氣然亦不可多用於甘草一分中加一分可也腹中旁悶此非腹脹乃散而不收可加芍藥收之如肺氣短促或不足者加人參白芍藥中焦用白芍藥則脾中升陽使肝膽之邪不敢犯也腹中窄狹及縮急者去之及諸酸澀藥亦不可用腹中痛者加甘草白芍藥稼穡作甘甘者已也曲直作酸酸者甲也甲已化土此仲景妙法也腹痛兼發熱加黃芩惡寒或腹中覺寒加桂怠惰嗜臥有濕胃虛不能食或沉困或泄瀉加蒼朮白汗加白朮小便不利加茯苓渴亦如之氣弱者加白茯苓人參氣盛者加赤茯苓縮砂仁氣復不能轉運有熱者微加黃連心煩亂亦加之小便少者加豬苓澤瀉汗多津液竭於上勿加之是

腹中病

津液還入胃中欲自行也不渴而小便閉塞不通加炒黃蘗知母小便澀者加滑石炒小便淋漓者加澤瀉且五苓散治渴而小便不利無惡寒者不得用桂不渴而小便自利妄見妄聞乃瘀血證用炒黃蘗知母以除腎中燥熱竅不利而淋加澤瀉炒滑石只竅不利者六一散中加木通亦可心藏熱者用錢氏方中導赤散中滿或但腹脹者加厚朴氣不順加橘皮氣滯加青皮一橘皮二氣短小便利者四君子湯中去茯苓加黃耆以補之如腹中氣不轉者更加甘草一半腹中刺痛或周身刺痛者或裏急者腹中不寬快者是也或虛坐而大便不得者皆血虛也血虛則裏急或血氣虛弱而目睛痛者皆加當歸身頭痛者加川芎苦頭痛加細辛此少陰頭痛也髮脫落及臍下痛加熟地黃平昔調理脾胃虛弱於此五藥中加減如五藏證中



互顯一二證各對證加藥無不驗然終不能使人完復後或有因而再至者亦由督任衝三脉為邪皆胃氣虛弱之所致也法雖依證加減執方料病不依素問法度耳是以檢討難素乃黃帝鍼經中說脾胃不足之源乃陽氣不足陰氣有餘當從六氣不足升降浮沉法隨證用藥治之蓋脾胃不足不同餘藏無定體故也其肝心肺腎有餘不足或補或瀉惟益脾胃之藥為切經言至而不至是為不及所勝妄行所生受病所不勝乘之也至而不至者謂從後來者為之虛邪心與小腸來乘脾胃也脾胃脉中見浮大而絃其病或煩燥悶亂或四肢發熱或口乾舌乾咽乾蓋心生火小腸主熱火熱來乘土位乃濕熱相合故煩躁悶亂也四肢者脾胃也火乘之故四肢發熱也飲食不節勞役所傷以致脾胃虛弱乃血所生病主口中津液不行故口乾

脾胃論

咽乾病人自以為渴醫者治以五苓散謂止渴燥而反加渴燥乃重竭津液以至危亡經云虛則補其母當於心與小腸中以補脾胃之根蒂也甘溫之藥為之主以苦寒之藥為之使以酸味為之臣佐以其心主緩急食酸以收之心火旺則肺金受邪金虛則以酸補次以甘溫及甘寒之劑於脾胃中瀉心火之亢盛是治其本也所勝妄行者言心火旺能令母實母者肝木也肝木旺則火之勢無所畏懼而妄行也故脾胃先受之或身體沉重走疰疼痛蓋濕熱相搏而風熱鬱而不得伸附着於有形也或多怒者風熱下陷於地中或目病而生內障者脾裹血胃主血心主脉脉者血之府也或云心主血又云肝主血肝之竅開於目也或妄見妄聞起妄心夜夢亡人四肢滿閉轉筋皆肝木火盛而為邪也或生癢或生痺或生厥或中風或生惡瘡或



作腎痿或為上熱下寒為邪不一皆風熱不得生升長而火  
過於有形中也所生受病者言肺受土火木之邪而清肅之氣  
傷或胃滿少氣短氣者肺主諸氣五藏之氣皆不足而陽道不  
行也或欬嗽寒熱者濕熱乘其內也所不勝乘之者水乘木之  
妄行而反來侮土故腎入心為汗入肝為泣入脾為涎入肺為  
痰為嗽為涕為嘔為水出鼻也一說下元土盛尅水致督任衝  
三脉盛火旺煎燉令水沸騰而乘脾肺故痰涎唾出於口也下  
行為陰汗為外腎冷為足不任身為脚腫痛或水附木勢而  
上為眼溢為眵為淚此皆由肺金之虛而寡於畏也夫脾胃不  
足皆為血病是陽氣不足陰氣有餘故九竅不通諸陽氣根於  
陰血中陰血中受火邪則陰盛陰盛則上乘陽分而陽道不行  
無生發升騰之氣也夫陽氣走空竅者也陰氣附形質者也如

脾胃論

陰氣附於土陽氣升於天則各安其分也今所立方中有辛甘  
溫藥者非獨用也復有甘苦大寒之劑亦非獨用以火酒一製  
為之使引苦甘寒藥至頂而復入於腎肝之下此所謂升降浮  
沉之道自偶而奇奇而至偶者也陽分奇陰分偶瀉陰火以諸風藥升  
發陽氣以滋肝膽之用是令陽氣生上出於陰分末用辛甘溫  
藥按其升藥使大發散於陽分也而令走九竅經云食入于胃  
散精于肝淫氣于筋食入于胃濁氣歸心淫精于脉脉氣流經  
經氣歸于肺肺朝百脉輸精于皮毛毛脉合精行氣于府且飲  
食入胃先行陽道而陽氣升浮也浮者陽氣散滿皮毛升者充  
塞頭頂則九竅通利也若飲食不節損其胃氣不能化散于  
肝歸于心溢于肺食入則昏冒欲睡得卧則食在一邊氣暫得  
舒是知升發之氣不行者此也飲入于胃遊溢精氣上輸于



脾氣散精上歸于肺病人飲入胃遽覺至臍下便欲小便由  
氣不輸于脾不歸于肺則心火上攻使口燥咽乾是陰氣大盛  
其理甚易知也况脾胃病則當嗜有動氣按之牢者痛有是者  
乃脾胃虛無是則非也亦可作明辨矣

脾胃不足是火不能生土而反亢拒此至而不至是為不及也

白朮君 人參臣 甘草佐 芍藥佐 黃連使

黃耆臣 桑白皮佐 ○諸風藥皆是風能勝濕也諸甘溫藥亦可

心火亢盛乘於脾胃之位亦至而不至是為不及也

芍藥佐 石膏佐 黃連君 知母佐 黃蘗臣

甘草使 生地黃臣 黃芩佐

肝木妄行脅脇痛口苦舌乾往來寒熱而嘔多怒四肢滿閉  
淋瀝便難轉筋腹中急痛此所不勝乘之也

脾胃論

羌活佐 防風臣 升麻使 柴胡君 獨活佐

芍藥臣 甘草臣 白朮佐 茯苓佐 豬苓

澤瀉臣 肉桂臣 藁本 川芎 細辛

蔓荊子 白芷 石膏 黃蘗佐 知母

滑石

肺金受邪由脾胃虛弱不能生肺乃所至受病也故咳嗽氣  
短氣上皮毛不能禦寒精神少而渴情慘慘而不樂皆陽氣  
不足陰氣有餘是體有餘而用不足也

人參君 白朮佐 白芍藥佐 橘皮臣 青皮以破滯氣

黃耆臣 桂枝佐 桔梗引用 桑白皮佐 甘草諸酸之藥皆可

木香佐 檳榔 五味子佐 此二味除客氣

腎水反來侮土所勝者妄行也作涎及清涕唾多溺多而



惡寒者是也土火復之及二脈為邪則足不任身足下痛不能踐地骨乏無力喜睡兩丸冷腹陰陰而痛妄聞妄見腰脊背胛皆痛

白木臣 蒼朮佐 川烏頭臣 乾薑君 肉桂佐 去皮

茯苓佐 澤瀉使 豬苓佐 附子佐 炮

夫飲食入胃陽氣上行津液與氣入于心貫于肺充實皮毛散于百脉脾稟氣于胃而澆灌四旁榮養氣血者也今飲食損胃勞倦傷脾胃虛則火邪乘之而生大熱當先於心分補脾之源蓋土生於火兼於脾胃中瀉火之亢甚是先治其標後治其本也且濕熱相合陽氣日已虛陽氣虛則不能上升而脾胃之氣下流併入腎肝是有秋冬而無春夏春主升夏主浮在人則肝心應之弱則陰氣盛故陽氣不得經營陽本根于陰惟瀉陰

脾胃論

中之火味薄風藥升發以神陽氣則陰氣不病陽氣生矣

假令不能食而肌肉削乃本病也其右關脉緩而弱本脉也而

本部本證脉中兼見弦脉或見四肢滿閉淋瀝便難轉筋一二

證此肝之脾胃病也當於本經藥中加風藥以瀉之本部本證

脉中兼見洪大或見肌熱煩熱面赤而不能食肌肉消一二證

此心之脾胃病也當於本經藥中加瀉心火之藥本部本證脉

中兼見浮澁或見氣短氣上喘咳痰盛皮澁一二證此肺之脾

胃病也當於本經藥中兼瀉肺之體及補氣之藥本部本證脉

中兼見細或見善恐欠之證此腎之脾胃病也當於本經藥

中加瀉腎水之藥及瀉陰火伏熾之藥病有逆從治有反正除

四反治法不須論之惟有陽明厥陰不從標本從乎中也微如時在長夏於長夏之令中立方謂正當主氣衰而客氣旺之時



也後之處方者當從此法加時令藥名曰

羌活走西升麻八錢柴胡壹兩黃耆壹兩人參茶外片

甘草壹兩黃芩七錢黃連去鬚酒洗半兩炒為臣佐

石膏少許長夏微用蒼朮一兩去皮泔浸剉碎秤

右件咬咀每服秤二錢水二盞煎一盞去滓大溫服早飯後

午飯前間日服服藥前宜減食宜美食服藥訖忌語話一二

時辰許及酒濕麵大料物之類恐大濕熱之物復助火邪而

愈損元氣也亦忌冷水及寒涼淡滲之物及諸菓恐陽氣不

能生旺也宜溫食及薄滋味以助陽氣大抵此法此藥欲令

陽氣升浮耳若滲泄淡味皆為滋陰之味為大禁也雖然亦

有從權而用如見腎火旺及督任衝三脉旺盛則用黃蘗知

母酒洗訖火炒製加之若分兩則臨病斟酌不可久服恐陰

氣而為害也小便赤或澀當利之大便澀當行之亦從權也

得利勿再服此雖立食禁如無可食之物一切禁之則胃氣

失所養矣亦當從權而食之以滋胃也

### 肺之脾胃虛論

脾胃之虛意嗜嗜四肢不收時值秋燥令行濕熱少退體重

節痛口乾舌乾食無味大便不調小便頻數不嗜食食不消兼

見肺病洒浙惡寒慘慘不樂面色惡而不和乃陽氣不伸故也

當升陽益胃名之曰升陽益胃湯

羌活半兩柴胡二錢獨活半兩防風半兩以其秋旺

白朮二錢人參一兩炙甘草兩半夏湯洗一兩此

澤瀉二錢不淋勿用黃耆一兩黃連二錢

茯苓二錢小便便利不渴者勿用 橘皮不土者四錢



白芍藥

五錢何故於旺用人參白芍藥之類反補肺為脾胃虛則肺最受病故因時而補易為力也

右咬咀每服枳二錢生姜五片棗二枚去核水二盞同煎至一盞去滓溫服早飯午飯之間服之禁忌如前其藥漸加至五錢止服藥後如小便罷而病加增劇是不宜利小便當少去茯苓澤瀉若喜食初二日不可飽食恐胃再傷以藥力尚少胃氣不得轉運升發也須薄滋味之食或美食助其藥力益升浮之氣而滋其胃氣也慎不可淡食以損藥力而助邪氣之降沉也可以小役形體使胃與藥得轉運升發慎勿大勞役使復傷若脾胃得安靜尤佳若胃氣稍強少食菓以助穀藥之力經云五穀為養五菓為助者此也

君臣佐使法

有毒無毒所治為主主病者為君佐君者為臣應臣者為使一

脾胃論

法力大者為君凡藥之所用皆以氣味為主補瀉在味隨時換氣氣薄者為陽中之陰氣厚者為陽中之陽味薄者為陰中之陽味厚者為陰中之陰辛甘淡中熱者為陽中之陽辛甘淡中寒者為陽中之陰酸苦鹹之寒者為陰中之陰酸苦鹹之熱者為陰中之陽夫辛甘淡酸苦鹹乃味之陰陽又為地之陰陽也溫涼寒熱乃氣之陰陽又為天之陰陽也氣味生成而陰陽造化之機存焉一物之內氣味兼有一藥之中理性具焉主對治療由是而出假令治表實麻黃其根表虛桂枝黃耆裏實枳實大黃裏虛人參芍藥熱者黃芩黃連寒者乾姜附子之類為君君藥之兩最多臣藥次之使藥又次之不可令臣過於君君臣有宰相進宣攝則可以禦邪除病矣如陽脈澁陰脈弦法當腹中無痛以芍藥之酸於上瀉木為君鉛糖炙甘草甘溫補



胃為臣水挾木勢亦來侮土故脈弦而腹痛肉桂大辛熱佐芍藥以退寒水姜棗甘辛溫發散陽氣行於經脈皮毛為使建中之名於此見焉有緩急收散升降浮沉澀滑之類非一從權立法于后

皮毛肌肉之不伸無大熱不能食而渴者加葛根半兩躁熱及胃氣上衝為衝脈所逆或作逆氣而裏急者加炒黃蘗知母黃芩中熱而不渴加炒黃芩如胃中結滯氣澀或有熱病者亦冬加之如食少而小便少者津液不足也勿利之益氣補胃自行矣氣弱氣短者加人參只升陽之劑助陽尤勝加人參惡熱發熱而躁渴脈洪大白虎湯主之或喘者加人參如渴不止寒水石石膏各等分少少與之即錢氏方中甘露散主身大熱而小便數或上飲下澀此燥熱也氣燥加白葵花無燥加赤葵花

如脈弦只加風藥不可用五苓散如小便行病增者此內燥津液不能停當致津液加炒黃蘗赤葵花

心下痞悶者加黃連一黃芩二減諸甘藥不能食心下軟而痞者甘草瀉心湯則愈痞有九種治有仲景湯五方瀉心湯

喘滿者加炙厚朴小便不利者加之小便利為禁藥也胃虛弱而痞者加甘草

喘而小便不利者加苦葶藶

氣短氣弱而腹微滿者不去人參去甘草加厚朴然不若苦味泄之而不令大便秘行如腹微滿而氣不轉加之

中滿者去甘草倍黃連加黃蘗更加三味五苓散少許此病雖宜升宜汗如汗多亡陽加黃耆四肢肌熱煩熱肌者手足與

是活柴胡升麻葛根甘草則愈



鼻流清涕惡風或頂背脊強痛羌活防風甘草等分黃耆加  
倍臨卧服之

有大熱脈洪大加苦寒劑而熱不退者加石膏如脾胃中熱加  
炒黃連甘草

凡治此病脈數者當用黃蘗或少加黃連以柴胡蒼朮黃耆甘  
草更加升麻得汗出則脈必下乃火鬱則發之也

如證退而脈數不退不洪大而疾有力者多減苦藥加石膏如  
大便軟或油者加桔梗食後服之此藥慎用則其害非細用  
者旋旋加之如食少者不可用石膏石膏善能去脈數疾病  
退脈數不退者死不治如不大渴亦不可用如脈弦而數者  
此陰氣也風藥升陽以發火鬱則脈數峻退矣已上五法加  
減未盡以明大槩耳

分經隨病制方

風寒汗出肩背痛中風小便數而欠者風熱乘其肺使肺氣鬱  
甚也當瀉風熱以通氣防風湯主之

柴胡一錢 羌活半錢 升麻一錢 藁本三分 防風半分

青皮二分 橘皮半分 黃耆一錢 人參半錢 白芷寇二分

甘草半錢 黃蘗二分

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去滓溫服食後氣盛者  
宜服面白脫色氣短者勿服

小便遺失者肺氣虛也宜安卧養氣禁勞役以黃耆人參之類  
補之不愈當責有熱加黃蘗生地黃

肩背痛不可迴顧此手太陽氣鬱而不行以風藥散之  
如脊痛項強腰似折項似拔上衝頭痛及足太陽經不行也以



湯主之

羌活一錢 獨活一錢 藁本半錢 防風半錢 蔓荊子二分

川芎一分 炙甘草半錢

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去滓溫服食後如身重  
腰沉沉然乃經中有濕熱也更加黃蘗一錢附子半錢蒼朮  
二錢

如腿脚沉重者無力者加酒洗漢防已半錢輕則附子重則川  
烏頭少許以為引用而行經也

如引而多驚小便淋澀者邪在少陽厥陰亦用太陽經藥更加  
柴胡半錢如淋加澤瀉半錢此下焦風寒二經合病也腎肝  
之病同一治為俱在下焦非風藥行經不可也

如大便後有白膿或只便白膿者因勞役氣虛傷大腸也以黃

耆人參湯補之如裏急頻見者血虛也更加當歸

如肺脹膨膨而喘咳育高氣滿壅盛而上奔者多加五味子人  
參次之麥門冬又次之黃連少許

如甚則交兩手而督者真氣大虛也若氣短加黃耆五味子人  
參氣盛加五味子人參黃芩荆芥穗冬月去荆芥穗加薑薑

薏仁

如噎痛頰腫脉洪大面赤者加黃芩桔梗甘草各半錢

如耳鳴目黃頰頰腫頸有膈肘臂外後廉痛面赤脉洪大者以  
羌活防風甘草藁本通其經血加黃芩黃連消其腫以人參

黃耆益其元氣而瀉其火邪如脉緊者寒也或面白善嚏或  
面色惡寒也亦加羌活等四味當瀉足太陽不用連茶少

加附子以通其脉面色惡寒惡寒者更加桂附



如便白膿少有滑頰見汚衣者氣脫加附子皮甚則加米殼如  
氣溢者只以甘藥補氣當安卧不語以養其氣

飲食勞倦所傷補中益氣湯方并加減治法已在前發明內附  
脾胃虛弱隨時為病隨病制方

夫脾胃虛弱必上焦之氣不足遇夏天氣熱盛損傷元氣愈墮  
嗜卧四肢不收精神不足兩脚痿軟遇早晚寒厥日高之後  
陽氣將旺復熱如火乃陰陽氣血俱不足故或熱厥而陰虛  
或寒厥而氣虛口不知味目中溜火而視物眊眊無所見小  
便頻數大便難而結秘胃脘當心而痛兩脇痛或急縮臍平  
周圍如繩束之急甚則如刀刺腹難舒伸背脊中閉塞時頭嘔  
噦或有痰嗽口沃白沫舌強腰背脚眼皆痛頭痛時作念不  
下或食入即飽全不思食自汗尤甚若陰氣覆在皮毛之上

皆天熱之熱助本病也乃庚大腸辛肺金為熱所乘而作當  
先救元氣理落庚辛之不足以黃耆人參湯主之

人參五分炙甘草一分白朮五分黃耆一錢如自汗過

橘皮五分炒麴三分五味子九蒼朮半錢无汗或有

升麻六分麥門冬五分當歸酒洗二分用身黃蘗酒洗四分以

右件同咀咀都作一服水二盞煎至一盞去滓稍熱服食遠

或空心服之忌酒濕麵大料物之類及過食冷物

如心痞胸加黃連式分或叁分如胃脘當心痛減大寒藥加草

荳蔻仁五分

如脇下痛或統急加柴胡一分或三分

如頭痛日中溜火加黃連一分或三分川芎二分

如頭目不清利上壅上熱加蔓荊子三分葉木二分細辛一分



川芎三分生地黃二分

如氣短精神如夢寐之間困乏無力加五味子九個

如大便澁滯隔一二日不見者致食少食不下血少血中伏火

而不得潤也加當歸身生地黃各半錢桃仁三枚湯洗去皮尖另研

麻子仁泥五分如大便通所加之藥勿再服

如大便又不快利者勿用別藥少加大黃煨半錢如不利者非

血結血秘而不通也是熱則生風其病人必顯風證單血藥

不可復加之常服黃耆人參湯藥只用羌活半兩防風半兩

二味咬咀以水四盞煎至一盞去滓空心服之其大便必大

走也一服便止

如膏中氣滯加青皮皮薄清香可愛者一分或二分并去白橘皮倍之去其邪

氣此病本元氣不足惟當補元氣不當瀉之

如氣滯大甚或補藥太過或病人心有憂滯鬱結之事更加木

香二分或三分白苴蔻仁二分縮砂仁二分或三分與正藥

同煎服

如復痛不惡寒者加白芍藥半錢黃芩二分却減五味子

夫脾胃虛弱遇六七月間河漲霖雨諸物皆潤人汗沾衣身重

短氣甚則四肢痿軟行步不正脚軟眼黑欲倒此腎水與膀胱

俱竭之狀也當急救之滋肺氣以補水之上源又使庚大腸不

受邪熱不令汗大泄也汗泄甚則止津液則七神無所依津液

相成神乃自生津者庚大腸所主三伏之義為庚金受囚也若

正津液汗大泄濕令亢甚則清肅之氣止燥金受囚風木無可

以制故風濕相搏骨節煩疼一身盡痛亢則害承乃制是也五

月常服五味子是瀉丙火補庚大腸益五藏之元氣壬膀胱之



寒已絕于巳癸腎水已絕于午今更逢濕旺助熱爲邪西方北方之寒清絕矣聖人立法夏月宜補者補天元真氣非補熱火也令人夏食寒是也爲熱傷元氣以人參麥門冬五味子生脉脉者元氣也人參之甘補元氣瀉熱火也麥門冬之苦寒補水之源而清肅燥金也五味子之酸以瀉火補庚大腸與肺金也當此之時無病之人亦或有一證或避暑熱納涼於深堂大厦得之者名曰中暑其病必頭痛惡寒身形拘急支節疼痛而煩心肌膚火熱無汗爲房室之陰寒所遏使周身陽氣不得伸越意多以大順散主之是也若行人或農夫於日中勞役得之者名曰中熱其病必苦頭痛發躁熱惡熱捫之肌膚大熱必大渴引飲汗大泄無氣以動乃爲天熱外傷肺氣蒼朮白虎湯主之潔古云動而得之爲中熱靜而得之爲中暑中暑者陰證當發

散也中熱者陽證爲熱傷元氣非形體受病也若虛損脾胃有宿痰之人遇此天暑將理失所違時代化必困乏無力懶語氣短氣弱氣促似喘非喘骨之無力其形如夢寐朦朧如煙霧中不知身所有也必大汗泄若風犯汗眼皮皮膚必畜項筋皮枯毛焦身體皆重支節時有煩疼或一身盡痛或渴或不渴或小便黃澁此風濕相搏也頭痛或頭重上熱壅盛口鼻氣短氣促身心煩亂有不生之意情思悽悽此陰勝陽之極也病甚則傳腎肝之爲痿厥厥者四支如在火中爲熱厥四肢寒冷者爲寒厥寒厥則腹中有寒熱厥則腹中有熱爲脾主四肢故也若肌肉濡潰痺而不仁傳爲肉痿證證中皆有肺疾用藥之人當以此調之氣上衝膏皆厥證也痿者四肢痿軟而無力也其心煩寃不止厥者氣逆也甚則大逆故曰厥逆其厥痺多相須也於前



已立黃耆人參五味子麥門冬湯中每服加白茯苓二分澤瀉四分豬苓一分白朮一分如小便快利不黃澀者只加澤瀉二分與一朮上下分消其濕

如行步不正脚膝痿弱兩足欹側者已中痿邪加酒洗黃蘗知母二分或五分令二足湧出氣力矣

如汗大泄者津脫也急止之加五味子六箇炒黃蘗五分炒知母二分不令妨其食當以意斟酌若妨食則止候食進則再服三里氣衝以三稜鍼出血若汗不減不止者於三里穴下三寸上廉穴出血禁酒濕麵

夫痿者濕熱乘腎肝也當急去之不然則下焦元氣竭及而成軟癱必腰下不能動心煩冤而不止也若身重減氣不短小便便如常及濕熱之令退時或所增之病氣退者不用五味子

澤瀉茯苓豬苓黃蘗知母蒼朮白朮之藥只依本病中證候加減常服藥亦須用酒黃蘗二分或三分如更時令清燥之氣大行却加辛溫瀉之若濕氣勝風證不退眩暈麻木不已

除濕湯 王之

- 羌活 一兩
- 防風 去蘆 一錢
- 柴胡 五分
- 藁本 三分
- 獨活 五分
- 茯苓 二分
- 澤瀉 二分
- 豬苓 去皮 二分
- 黃耆 一錢
- 炙甘草 半錢
- 橘皮 三分
- 黃蘗 三分
- 黃連 一分
- 蒼朮 酒浸去皮 一錢
- 升麻 七分
- 川芎 二分
- 去頭痛

右以咀每服秤二錢或五錢水一盞煎至一盞去滓稍熱服量虛實施用如有不盡證候依加減法用之

夫味弦洪緩而沉按之中之下得時一澀其證四肢滿閉肢節煩疼難以屈伸身體沉重煩心不安忽把忽瘦四肢懶倦已



去滋味復難舒伸大小便清利而數或上飲下便或大便澀滯不行一二日一見夏月殮泔米殼不化或便後見血見白膿膏滿短氣膈咽不通或痰嗽稠粘口中沃沫食入反出耳鳴耳聾目中流火視物昏花努肉紅絲熱壅頭目不得安卧嗜卧無力不思飲食調中益氣湯主之

升麻二分 黃耆一錢 甘草五分 蒼朮五分 木香一分或

人參五分有者去之 柴胡二分一味為氣不足胃氣與脾氣下通乃補上氣從陰引陽也

橘皮二分如腹中氣不得運轉者更加一分

右件剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去滓帶熱服宿食消盡服之寧心絕思藥必神效蓋病在四肢血脉空腹在且是也

如時頭熱躁是下元陰火蒸蒸發也加真生地黃二分黃蘗三分

如大便虛坐不得或大便了而不了腹常逼迫血虛血澀也加

當歸身

如身體沉重雖小便數多亦加茯苓二分蒼朮一錢澤瀉五分

黃蘗三分時暫從權而祛濕也不可常用兼足太陰凡病其熱亦終于心中故量濕熱相合而生煩亂

如胃氣不和加湯洗半夏半錢生姜三片有嗽加生薑生地黄二分以制半夏之毒痰厥頭痛非半夏不能除此足太陽經

邪所作也如無已上證只服

黃耆一錢 人參三錢 甘草五分 橘皮酒洗二分 柴胡二分

升麻二分 蒼朮五分 黃蘗酒洗二分

右件剉如麻豆大依前煎服

如秋冬之月胃脉四道為衝任脉所逆并脇下少陽脉一道而反上行病名曰厥逆其證氣上衝咽不得息而喘息有音不



得卧加吳茱萸半錢或一錢半湯洗去苦觀厥氣多少而用  
如夏月有此證者為大熱也蓋此病隨四時為寒熱溫涼也宜  
以酒黃連酒黃蘗酒知母各等分為細末熟湯為丸如桐子  
大每服二百丸白湯送下空心服以食壓之

長夏濕熱胃困尤甚清暑益氣湯論

氣虛身熱得之傷暑熱傷氣故也有所遠行勞倦逢大熱而渴  
渴則陽氣內伐內伐則熱舍于腎腎者水藏也今水不能勝火  
則骨枯髓虛足不任身發為骨痿者生於大熱也此濕熱成痿  
令人骨之無力故治痿獨取於陽明時當長夏濕熱大勝蒸蒸  
而熾人感之多四肢困倦精神短少懶於動作膏滿氣促肢節  
沉痠或氣高而喘身熱而煩心下膨閉小便黃而數大便澹而  
頻或痢出黃如糜或如泔色或渴或不渴不思飲食自汗體重

或汗少者血先病而氣不病也其脉中得洪緩若濕氣相搏必  
加之以遲遲病雖互換少差其天暑濕令則一也宜以清燥之  
劑治之陽氣者衛外而為固也足則氣泄今暑邪干衛故身熱  
自汗以黃耆甘溫補之為君人參補皮當歸甘草甘微溫補中  
益氣為臣蒼朮白朮澤瀉滲利而除濕升麻葛根甘苦平善解  
肌熱又以風勝濕也濕勝則食不消而依痞滿故炒麴甘辛青  
皮辛溫消食快氣腎惡燥急食辛以潤之故以黃蘗苦辛寒借  
甘味瀉熱補水虛者滋其化源以人參五味子麥門冬酸甘微  
寒救天暑之傷於庚金為佐名曰清暑益氣湯

黃耆 錢半 人參 半錢 升麻 一錢 澤瀉 半錢

蒼朮 半錢 炙甘草 二分 葛根 二分 五味子 九 白朮 半錢

神麴 炒半 麥門冬 去心三分 黃蘗 酒洗二分或三分



當歸身分搗皮 半錢 青皮去白 一分半

右件同咬咀都作一服水一大盞煎至一盞去滓大溫服食  
遠劑之多少臨卧斟酌此病皆由飲食勞倦損其脾胃乘天  
暑而病作也但藥中犯澤瀉猪苓茯苓燈草通草木通淡滲  
利小便之類皆從時令之旺氣以瀉脾胃之客邪而補金水  
之不及也此正方已是從權而立之若於無時病濕熱脾旺  
之證或小便已數腎肝不受邪者誤用之必大瀉真陰竭絕  
腎水先損兩目也復立變證加減法于后

心火乘脾乃血受火邪而不能外發陽氣伏于地中地者人之  
脾也必用當歸和血少用黃蘗以益真陰

脾胃不足之證須少用升麻乃足陽明太陰引經之藥也使行  
陽道自脾胃中右遷少陽行春令生萬化之根蒂也更少加

脾胃論

一十八

柴胡使諸經右遷生發陰陽之氣以滋春之和氣也

脾虛緣心火亢甚而乘其土也其次肺氣受邪為熱所傷必須  
用黃耆最多甘草次之人參又次之三者皆甘溫之陽藥也  
脾始虛肺氣先絕故用黃耆之甘溫以益皮毛之氣而閉腠  
理不令自汗而損其元氣也上喘氣短懶語須用人參以補  
之心火乘脾須用炙甘草以瀉火熱而補脾胃中元氣甘草  
最少恐資瀉也若脾胃之急痛并脾胃大虛腹中急縮腹皮  
急縮者却宜多用之若從權加升麻以引之恐左遷之邪堅  
盛卒不肯退反行陰道故使引陽道上行若中滿者去甘草  
咳甚者去人參如口乾噤乾者加葛根

血虛以人參補之陽旺則能生陰血也更加當歸和血又宜加  
黃蘗以救腎水蓋甘寒瀉熱火火熾則心氣不安如煩亂猶



不能止少加黃連以去之

如氣浮心亂則以朱砂安神丸鎮固之如心下痞亦少加黃連  
氣亂于胃為清濁相干故以橘皮理之能助陽氣之升又助  
甘辛為用也

長夏濕土客邪大旺可從權加蒼朮白朮澤瀉上下分消其濕  
熱之氣濕氣大勝主食不消化故食減不知穀味加炒麴以  
消之復加五味子麥門冬人參瀉火益肺氣助秋損也此三  
伏中長夏正旺之時藥也

隨時加減用藥法

濁氣在陽亂於宵中則腹痛閉塞大便不通夏月宜少加酒洗  
黃蘗大苦寒之味冬月宜加吳茱萸大辛苦熱之藥以從權  
乃隨時用氣以從權乃隨時用氣以瀉濁氣之不降也借用

大寒之氣於甘藥中故曰甘寒瀉熱火也亦須用發散寒氣  
辛溫之劑多黃蘗少也

清氣在陰者乃人之脾胃氣衰不能升發陽氣故用升麻柴胡  
助辛甘之味以引元氣之升不令殫泄也

堵塞咽喉陽氣不得出者曰寒陰氣不得下降者曰噎夫噎迎  
逆於咽喉膏膈之間令諸經不行則口開目瞪氣欲絕當先  
用辛甘氣味俱陽之藥引胃氣以治其本不加堵塞之藥以瀉  
其標也寒月陰氣大助陰邪於外於正藥內加吳茱萸大熱  
大辛苦之味以瀉陰寒之氣暑月陽盛則於正藥中加青皮  
陳皮益智黃蘗散寒氣泄陰火之上逆或以消痞丸合滋腎  
丸滋腎丸者黃蘗知母微加肉桂三味是也或更以黃連別  
作丸一藥各七十八十九空心的宿食消盡服之持少時以美



食厭乏不令胃中停留也

如食少不飢加炒麩

如食已心下痞別服糯皮枳朮丸

如脉弦四肢滿閉便難而心下痞加甘草黃連柴胡如腹中氣

上逆者是衝脉逆也加黃蘗三分黃連一分半以泔之

如大便閉燥心下痞加黃連桃仁少加大黃當歸身

如心下痞旁謁加白芍藥黃連

如心下痞腹脹加五味子白芍藥縮砂仁如天寒少加乾姜或

中桂

如心下痞中寒者加附子黃連

如心下痞嘔逆者加黃連生姜橘皮如冬月加黃連少入丁香

藿香葉

如口乾嗑乾加五味子葛根

如脇下急或痛甚俱加柴胡甘草

如胃中滿悶鬱鬱然加橘皮紅青皮木香少許

如頭痛有痰沉重懶倦者乃太陰痰厥頭痛加半夏半錢生姜

二分或三分

如腹中或周身閉有刺痛皆血澁不足加當歸身

如噦加五味子多益智仁

如食不下乃胃中胃上有寒或氣流滯加青皮陳皮木香此三

味為定法冬天加益智仁草薤薤仁夏月少用更加黃連秋

月氣滯滯食不下更加檳榔草薤薤仁縮砂仁或加白薤薤

仁如二春之月食不下亦用青皮少陳皮多更加風藥以退

其寒瘧其初春猶寒更少加辛熱以補春氣之不足以



為風藥之佐益智草荳蔻皆可也

如脈弦者見風動之證以風藥通之

如脈溢氣滯滯者加當歸身天門冬木香青皮陳皮有寒者

加桂枝黃耆

如膏中緻塞或氣閉悶亂者肺氣滯滯而不行宜破滯氣者青

皮陳皮更少加本香檳榔冬月加吳茱萸人參緻塞因外寒

所遇必寸口脈弦或微緊乃膏中大寒也若加之舌上曰胎

滑者乃丹田有熱膏中有寒加黃藥生地黃勿作寒證治之

如秋冬天氣寒涼而腹痛者加半夏或益智或草荳蔻之類

如發熱或捫之而肌表熱者此表證也只服補中益氣湯一二

服得微汗則涼矣

如脚膝痿軟行步乏力或疼痛乃腎肝中伏濕熱少加黃藥空

心服之不愈更增黃藥加漢防己半錢則脚膝中氣力如故也

如多唾或唾白沫胃口上停寒也加益智仁

如少氣不足以息者服止藥二三服氣猶短促者為膈上及表

間有寒所遏當引陽氣上伸加羌活獨活藁朮最少并麻多

柴胡次之黃耆加倍

腸澼下血論

如飲不節起居不時者陰受之陰受之則入五藏入五藏則臍

滿閉塞下為飧泄久為腸澼夫腸澼者水穀與血另作一瓜

御出也今時值長夏濕熱大盛正當客氣勝而主氣弱也故

腸澼之病甚以涼血藥黃湯主之

熟地黃半斤知母對炒青皮不去錢半斤 槐子炒半斤

當歸半斤黃藥去皮對炒一斤



右咬咀都作一服水一盞煎至七分去滓溫服如小便澀脬  
下悶或大便則後重調木香檳榔細末各半錢稍熱服空心  
或食前如裏急後重又不去者當下之如有傳變隨證加減  
胃虛不能食而大渴者不可用淡滲之藥止之乃胃中元氣少  
故也與七味白朮散補之

發熱惡熱大渴不止煩躁肌熱不欲近衣其脈洪大按之無力  
者或無目痛鼻乾者非白虎湯證也此血虛發躁當以

黃耆一兩當歸身分 ○右咬咀水煎服

如大便閉塞或裏急後重數至圍而不能便或少白膿或少有  
血慎勿利之以升陽除濕方風湯舉其陽則陰氣自降矣

蒼朮性製防風一分白朮一分白茯苓一分白芍藥一分

右件咬咀除蒼朮另作片子水一碗半煮至一大盞內諸藥

脾胃論

卷之二

同煎至一大盞去滓稍熱服空心食前

予病脾胃久衰體重肢節疼痛大便泄并下者三而小便閉塞  
以升陽風藥治之羌活獨活柴胡升麻各一錢防風根截半  
錢炙甘草根截半錢同咬咀水四中盞煎至一盞去滓稍熱  
服即愈

白樞判素有脾胃虛損證目疾時作面目睛俱黃小便或黃或  
白大便不調飲食減少氣短上氣怠墮嗜卧四肢不收六月  
中月疾作以瀉肝散下數行而前疾增劇予謂大黃牽牛雖  
能除濕熱而不能走經絡下咽不入肝經大黃苦寒重虛其  
胃牽牛味辛能瀉氣重虛肺本嗽大作蓋標實不去本虛愈  
甚適當暑雨黃證增劇于脾胃肺中瀉外經中之濕熱製

主之而愈



防風三分 生姜五分 蒼朮三分 茯苓一分 澤瀉二分  
升麻二分

此藥能走經除濕熱而不守故不瀉本藏補肺與脾胃本中  
氣之虛弱

橘皮二分 青皮一分 人參半斤 甘草一分 白朮二分  
白芍藥二分

此藥皆能守本而不走經不走經者不滋經絡中邪守者能  
補藏之元氣

五味子三分 麥門冬一分 人參一分 黃蘗一分

此藥去時令浮熱濕蒸  
右件剉如麻豆大都作一服水二盞煎至一盞去滓稍熱空  
心服

脾胃論

范中內有脾胃證時顯顛躁胃中不利大便不通以藥和數  
行復添吐逆食不能停痰唾稠粘湧出不止眼黑頭旋惡心  
煩悶氣短促上喘無力不欲言心神顛倒目不敢開如在風  
雲中頭苦痛如裂身重如山四肢厥冷不得安卧予謂胃氣  
已損復下兩次則重虛其胃而痰厥頭痛作矣製半夏白朮

天麻

天麻半斤 人參五分 白朮一分 蒼朮半斤 半夏一盞洗七次

橘皮半斤 黃耆半斤 白茯苓半斤 澤瀉半斤 炒麴一分

乾姜三分 黃蘗二分 大麥蘖麴半斤

右件咬咀每服半兩水一盞煎至一盞去滓帶熱服食前此  
頭痛苦甚謂之足大陰痰厥頭痛非半夏不能療眼黑頭旋  
非天麻不能除黃耆甘溫瀉火補元氣人參甘溫瀉火補氣



益氣一木甘苦溫除濕補中益氣澤瀉茯苓利小便專濕  
皮苦溫益氣調中升陽翅消食湯胃中滯氣大麥蘗雞寬中  
助胃氣乾姜辛熱以滌中寒黃蘗大苦寒酒洗以主冬天少  
火在泉發躁也

一貧士病脾胃虛弱氣促憔悴因與人參芍藥湯

人參三分 黃耆一分 五味子五分 白芍藥一分 炙甘草一分  
當歸身三分 麥門冬

右件以咀分作二服每服水一盞八分煎至一盞去滓稍熱  
服既愈冬居曠室卧熱坑而吐血數次予謂此人久虛弱肢  
有形而有火熱在內上氣不足陽氣外虛當補表之陽氣瀉  
裏之虛熱冬居曠室衣服復單薄是重虛其陽表有大寒在  
湯裏熱火邪不得舒伸故出于口因思仲景太陽傷寒當以

麻黃湯發汗而不與之遂成衄血却與之立愈與此其同因  
與麻黃人參芍藥湯

麻黃 一分去其外寒 桂枝 半份以補表虛 白芍藥 一分

炙甘草 一分補肺 黃耆 一分 麥門冬 二分 五味子 二個安

當歸身 半份補血養血 人參 三分益三焦元氣不足而實其表也

右件以咀都作一服水二盞煮麻黃令沸去沫至一盞入餘  
藥同煎至一盞去滓熱服臨卧

升陽散火湯治男子婦人四肢發熱肌熱筋痛熱骨髓中熱發  
困熱如燎扞之烙手此病多因血虛而得之或胃虛過食冷  
物抑遏陽氣於脾土火鬱則發之

升麻 葛根 獨活 羌活 各半 防風 二分半  
炙甘草 三分 人參 半兩 白芍藥 兩 生甘草 一分



右件吹咀每服秤半兩水三大盞煎至一盞去滓稍熱服  
寒涼之物

**治飲食汗出日久心中虛風虛邪令人半身不遂見偏**  
風痿痺之證當先除其汗燥悍之氣按而收之

黃連半斤 五味子半斤 去核烏梅半斤 生甘草各半斤  
熟甘草三分 升麻稍二分

右吹咀分作二服每服水二盞煎至一盞去滓溫服食遠濕  
麵大料物宜忌

**治因服補胃熱藥而致上下牙痛不可忍捧引頭腦痛**  
熱發大痛此足陽明別絡入腦也喜寒惡熱此陽明經中熱  
盛而作也

升麻一分 牡丹皮半斤 當歸身二分 生地黄二分 淨黃連二分 升麻稍二分

右為細末都作一服水一盞半煎至七分去滓放冷服

**治口喎頰顛急緊胃中火盛必汗不止而小便數也**  
升麻二分 葛根半斤 黃耆二分 當歸身二分 紅花一分

蘇木半斤 炙甘草一分 桂枝一分 生甘草半斤 酒黃蘗一分

右吹咀都作一服酒三大盞煎至一盞三分去滓稍熱服食  
前服訖以火熨摩緊結處即愈夫病口喎筋急者是筋脉血  
絡中大寒此藥以代燭針劫刺破惡血以去其凝血內作泄  
衝脉之火熾

**治虛風證能食麻木牙關急搐目內睛瞶胃中有風面腫**

香白芷一分二分 升麻二分 葛根一分 蒼朮一分

炙甘草半斤 柴胡三分 藜蘆二分 蔓荊子一分 羌活三分

黃蘗三分 麻黃半斤 不去節 當歸身半斤 黃蘗三分



棗四枚

乾生薑三分

右剉如麻豆大分二服每服水大盞內二煎至一盞去滓熱服食後

陽明病濕勝自汗

**調衛湯**治濕勝自汗補外氣虛弱表不任外寒

黃耆一分 麻黃根一分 生甘草半斤 豬苓二分 羌活七分

麥門冬三分 當歸稍多 生地黃三分 生黃芩半斤 五味子七個

蘇木一分 紅花一分 半夏半斤 湯洗七次用

右以咀如麻豆大作一服水二盞煎至一盞去滓稍熱服中風證必自汗汗多不得重發汗故禁麻黃而用根節也

濕熱成痿肺金受邪

六七月之間濕令大行子能令母實而熱旺濕熱相合而刑庚

脾胃論

一廿方

大腸故寒涼以救之燥金受濕熱之邪絕寒水生化之源人絕則腎虧痿厥之病大作腰已下痿軟癱瘓不能動行走不正兩足欹側以**清濕湯**主之

黃耆半斤 黃連一分 蒼朮一分 五味子一升 白朮半斤

橘皮半斤 人參二分 麥門冬二分 當歸身二分 生地黄一分

麴一分 白茯苓三分 澤瀉半斤 豬苓一分 酒黃蘗一分

柴胡一分 升麻二分 炙甘草二分

右以咀如麻豆大每服半兩水二盞半煎至一盞去滓稍熱空心服

**助陽和血補氣湯**治眼發後上熱壅白睛紅多眵淚無疼痛而

隱澁難開此服苦寒藥太過而真氣不能通九竅也或眼昏花不明宜助湯和血補氣



防風七分 黃耆一分 炙甘草半 蔓荊子分 當歸身分

香白芷分 升麻分 柴胡五分

右咬咀都作一服水一盞半煎至一盞去滓熟服臨卧避風  
處睡忌風寒及食冷物

**升陽湯** 治一日大便三四次澹而不多有時洩泄腹中鳴小便黃

黃耆二分 甘草一分 升麻六分 柴胡二分 橘皮二分

益智仁分 當歸身分 紅花少許

右咬咀分作二服每服水一大盞煎至一盞去滓稍執服

**升陽除濕湯** 治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄瀉無度小便

黃四肢困弱

陳皮二分 升麻 柴胡 神麴 防風各半

蒼朮一分 甘草三分 羌活半 大麥蘖三分 如胃寒者加

澤瀉五分 猪苓二分 益智仁半 半夏半 生姜三片

棗二 个同煎至半服  
之非常腸鳴不用

右咬咀作一服水三大盞煎至一盞去滓空腹服

**升陽湯** 治頭悶勞動則微痛不喜飲食四肢怠惰躁熱氣短口

不知味腸鳴大便微澹黃色身體昏悶口乾不喜食冷

黃耆二分 升麻一分 黃芩三分 當歸稍 蒼朮一分

陳皮五分 升麻半 柴胡三分 人參三分 白朮三分

半夏二分 益智仁三分

又咬咀作一服水一大盞煎至一盞去滓稍熱服食前忌飲

食失節生冷硬物酒濕麪

**升陽湯** 治食不下口乾虛渴四肢困倦

柴胡一分 蒼朮半 羌活七分 升麻三分 蒼朮一分



黃芩生用 酒黃芩一分 葛根半斤 生甘草一分 炙甘草一分  
橘皮二分 人參半斤 白朮半斤

右以咀作一服水一盞生姜五片棗一枚擘開同煎至一盞  
去滓稍熱服之食前

**論** 治因飲食勞倦所傷腹脇滿悶短氣遇春口淡無味遇  
夏雖熱而惡寒常如飽不喜食冷物

黃耆一兩 半夏三分 人參三分 草薺二斤 黃蘗半斤  
麴一分 陳皮一分 生薑一分 升麻一分 柴胡一分  
甘草半斤 當歸身一分

右以咀每服三錢水二大盞煎至一盞去滓溫服食前  
**論** 治服寒藥多致脾胃虛弱胃脘痛

益智仁二分 縮砂仁一分 甘草一分 姜黃三分 白豆蔻仁三分  
陳皮一分 澤瀉二分 乾生薑三分 黃耆七分 厚朴一分  
人參一分

右為極細末每服三錢水一盞煎至半盞溫服食前



橘紅一分 人參一分 乾木瓜二分 乾生薑一分 炙甘草二分  
右為細末餅為丸如桐子大每服三五丸溫水送下食前  
**論** 飲酒過傷

夫酒者大熱有毒氣味俱陽乃無形之物也若傷之止當發散  
汗出則愈矣其次莫如利小便二者乃上下分消其濕今之酒  
病者往往服酒癥丸大熱之藥下之又有用牽牛大黃下之者  
是無形元氣受病反下有形陰血乖悞甚矣酒性大熱以傷元  
氣而復重瀉之况亦損腎水真陰又有形陰血俱為不足如此



則陰血愈虛其水愈弱陽毒之熱大旺反增其陰火是以元氣  
消止折入長命不然則虛損之病成矣酒疸下之久久為黑疸  
慎不可犯以葛花解醒湯主之

戰搖飲食減少小便不利

白豆蔻仁 半兩

縮砂仁 半兩

葛花 半兩

木香 半兩

橘皮 一分半

白朮 二分

乾生姜 二分

蓮花青皮 三分

白茯苓 一分半

猪苓 去皮一分半

澤瀉 二分

神麴 炒二分

人參 去芦一分

右為極細末秤和勻每服三錢匕白湯調下但得微汗酒病  
去矣

治傷馬牛羊乳酪水一切冷物

半夏 湯洗七次二分

車前子 炒香半兩

神麴 炒黃色一分

炙甘草 一分

紅花 二分

茯苓 七分

乾生姜 二分

澤瀉 半兩

右同為極細末每服三錢匕白湯調下食前

治傷寒溫熱表裏未解頭痛發熱口燥咽乾煩渴飲水  
或水入即吐心中淡淡停濕在內小便不利及汗出表解煩  
渴不止宜服之又治霍亂吐利躁渴引飲太陽證入本之下

藥也

澤瀉 二兩

猪苓 五分

茯苓 一分

白朮 五分

桂 一兩

右為細末每服一錢熱湯調服不計時候服訖多飲熱湯有

汗出即愈又治瘧熱在裏身熱黃疸濃煎茵陳蒿湯調下

食前服之疸發渴及中暑引飲亦可用水調服之

治傷冷飲者五苓散三錢或四錢匕加生姜煎服之



治傷食兼傷冷飲者煎五苓散送半夏枳木丸

治傷冷飲不惡寒者腹中亦不覺寒惟覺勞悶身重飲食不

化者或小便利煎去桂五苓散依前斟酌服之

膀胱遺熱於小腸則為口糜以導赤散調五苓散服之

易張先生治痞消食強胃

枳實炒黃芩去穢一兩 白朮一兩

右同為極細末荷葉裹燒飯為丸如桐子大每服五十九丸

用白湯下無時白朮者本意不取其食速化但又令人胃氣

強不復傷也

治老幼元氣虛弱飲食不消或臍腹不調心下痞悶

橘皮一兩 枳實炒去穢一兩 白朮一兩

右件為細末荷葉燒飯為丸如桐子大每服五十九丸溫水送

下食遠

治因冷食內傷一方加澤瀉一兩為小便澀

白朮二兩 枳實炒二兩 半夏湯洗七次

右同為極細末荷葉裹燒飯為丸如桐子大每服五十九丸

湯送下如食傷寒熱不調每服加二黃丸十九

破除寒滯氣消寒飲食

木香二兩 乾姜炒一兩 枳實炒一兩 白朮一兩

右為細末荷葉燒飯為丸如桐子大每服三五十丸溫水送

下食前

開胃進食

木香二兩 人參二兩 乾生薑炒一兩 枳實炒一兩 白朮一兩

橘皮四兩



右為細末荷葉燒飯為丸如桐子大每服三五十九溫水送下食前

**神效積木丸** 治為人所勉勸強食致心腹滿悶不快

神麴炒一兩 麥蘗炒一兩 枳實炒一兩 白木二兩

右為細末荷葉燒飯為丸如桐子大每服五十九溫水送下食後

**破滯氣消飲食開胃進食**

大香一兩 枳實炒一兩 白木二兩

右為細末荷葉燒飯為丸如桐子大每服五十九溫水送下食後

**治傷肉食濕麴辛辣味厚之物填塞悶亂不快**

黃芩二兩 黃連酒洗一兩 大黃兩濕一兩 神麴炒一兩 枳實炒一兩

白木一兩 橘皮一兩

右為細末湯浸餅為丸如菘且一倍大每服五十九白湯下

**逐飲消痰道滯清膈**

枳實炒一兩 半夏湯洗一兩 陳皮去白各式兩 黑牽牛半斤取頭末二兩

右為細末水煮麵糊為丸如桐子大每服五十九生薑湯下食後

**治因憂氣食濕麴結於中脘腹皮底微痛心下痞**

滿不思飲食食之不散常常痞氣

柴胡四分 木香三分 橘皮三分 甘草一分 半夏一兩

紅花半分 常歸稍 草豈寇仁 五分 枳實炒 五分

右判如麻豆大每服五錢水一大盞生薑五片同煎至一盞去滓稍熱服食遠忌酒濕麵



上素... 治食傷大陰又治卒心胃痛

丁香一分 丁香皮一分 炙甘草一分 甘松一分 縮砂仁三分

益智仁三分 京三稜一分 炮廣茂一分 香附子一分 木香一分

右為細末湯浸餅為丸如菉豆大每服二十九白湯送下  
或細嚼亦可不拘時候

治秋冬傷寒冷物胃脘當中而痛上支兩脇膈咽不通

草豆蔻一分 皮取仁一分 大麥蘖一分 神麴一分

白木一分 生黃芩一分 枳實一分 半夏一分 日乾半兩

橘皮一分 青皮一分 乾生薑一分 炒鹽半兩

右為極細末湯浸餅為丸如菉豆一倍大每服五十九白湯下

治傷濕麪心腹滿悶肢躄沉重

枳實一分 白木一分 羅蔔子一分 黃芩一分

神麴一分 紅花三分

右為極細末荷葉燒飯為丸如菉豆大每服五十九白湯送下

治傷熱食痞悶兀兀欲吐煩亂不安

黃芩一分 黃連一分 升麻一分 柴胡一分 甘草一分

右為細末湯浸餅為丸如菉豆大每服五十九白湯送下

治傷濕熱之物不得施化而作痞滿悶亂不安

茯苓一分 黃芩一分 白木一分 黃連一分 澤瀉一分

枳實一分 炒麴一分 大黃一分

又為細末湯浸餅為丸如桐子大每服五七十九溫水下  
食遠

治大病差後傷食勞復



枳實 一个 麸炒去穢 梔子 二个 半肥者 豉 一两二分 半綿裹

右以清漿水一盞空煮退八分內枳實梔子煮取八分下油再煮五六沸去滓溫服覆令汗出若有宿食內大黃如薄基子五六枚同煎食膏梁之物過多煩熱悶亂者亦宜服之

**白朮丸** 治傷豆粉濕麪油膩之物

白朮 一两半 夏湯洗七次 一兩 橘皮 去穢 神麪 炒 一兩 枳實 炒 兩 黃芩 半兩 白礬 炒 三

右為細末湯浸餅為丸如菘豆一倍大每服五十九丸白湯下量所傷加減服素食多用乾姜故加黃芩以瀉之

**木香見現丸** 治傷生冷硬物心腹滿悶疼痛

巴豆霜 炒 荆三稜 煨 神麪 炒 一兩 石三稜 去皮 煨 木香 一兩 香附子 炒 升麻 柴胡 各 三 草豆蔻 炒 仁 半兩

右為細末湯浸餅為丸如菘豆一倍大每服一二十九丸加減溫白湯下

**白朮丸** 治傷生冷硬物不能消化心腹滿悶

白朮 二兩 枳實 炒 廣茂 煨 各 青橘皮 陳橘皮 各 丁皮 益智 各 炒 麪 七 分 巴豆 和皮 炒 黑 麪 去米 五分 茴香 炒 半

右為細末醋打麪糊為丸如桐子大每服十九至二十九丸溫生姜湯下食前量虛實加減如更衣止後服

**白朮丸** 治傷心腹諸卒暴百病

大黃 乾姜 巴豆 各 一兩 去皮

右須精新好藥搗羅蜜和更搗一千杵丸如小豆大服三九老小量之若中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刀刺痛氣急口噤傳尸卒死者以煖水若酒服之或不下捧頭起令下熱



更甚來更與三五以腹中鳴轉即吐下便愈若口已噤亦須  
折齒灌之令人尤妙忌蘆薈猪肉冷水肥膩  
又名獨行丸皆急劑也婦人有胎不可服

**神應丸** 治因一切冷物冷水及灌乳酪水腹痛腸鳴米穀不化

巴豆 杏仁 乾姜 百草霜各半 丁香

木香各一 黃蠟一兩

右先將黃蠟用好醋煮去滓穢將巴豆杏仁同炒黑煙盡研  
如泥將黃蠟再上火入小油半兩溶開入在杏仁巴豆泥子  
內同攪旋下丁香木香等藥末研勻搓作挺子油紙裹了旋  
丸用每服三五十九溫米飲送下食前日三服

如脈緩體重自利乃濕氣勝也以五苓散平胃散加炒麴相  
合而服之各一曰對金飲子

**消積散** 治服寒藥過多或脾胃虛弱胃脘痛

白豆蔻仁各三 益智仁各八 縮砂仁 甘草各二

姜黃二 陳皮七 澤瀉二 黃耆各 乾生薑二

厚朴 人參各二

右為細末每服三錢水一盞煎至七分溫服食前

如脾弦惡寒腹痛乃中氣弱也以仲景小建中加黃耆錢氏  
異攻散加芍藥蓮而用之如渴甚者以白朮散為根倍之  
方俱在後附

**升陽順氣湯** 治因飲食不節勞役所傷復滿悶短氣遇春口淡

無味遇夏難熱猶有惡寒飢則常如飽不喜食冷物

升麻 柴胡各一 黃耆一兩 半夏三 人參二

陳皮一 甘草半 草薹二 神麴半 當歸身一



黃蘗

半斤

右以咀每服三錢水一大盞生姜五片煎至一盞去滓溫服食前

**黃蘗散** 滋形氣喜飲食

草薺五分 縮砂仁一分半 半夏七分 大麥蘗五分半

枳實五分 枳殼四分 神麴五分 炙甘草一分半 乾生薑二分半

橘皮一分 木香一分 白朮三分 白茯苓三分 猪苓一分半

澤瀉 人參 青皮 檳榔各二分半

右為細末湯浸餅為丸如桐子大每服二十九米飲湯下食遠

**和胃丸** 治病久虛弱厭食不能食而臟腑或秘或澀此胃氣虛弱也常服則和中理氣消痰去濕厚腸胃進飲食

厚朴一兩 白朮二兩 半夏湯洗七次一兩 陳皮去白

檳榔四分 枳實五分 木香五分 炙甘草五分半

右為細末生薑自然汁浸餅為丸如桐子大每服三五十九溫水送下食前或食遠

**厚朴散** 治脾胃虛冷腹鳴腹痛自利可思飲食

人參 茯苓 白朮 甘草 橘皮各半

右為散每服五錢水一大盞生薑三片棗二枚同煎至一盞去滓溫服食前先用數服以正其氣

**厚朴湯** 治脾胃虛寒心腹滿及秋及春寒犯胃時作疼痛

厚朴一兩 橘皮去白 甘草一分 乾姜各五分 茯苓去皮

戊火已衰不能運化又加冬寒聚為滿痛散以辛熱佐以苦甘溫以淡油之扶持胃氣以期平也



右為鹿散每服五錢水一盞生姜三片同煎至一盞去滓  
服食前忌一切冷物

**神效** 升陽氣瀉陰火調營氣進飲食助精神寬腹中除怠  
嗜臥四肢不收沉困懶倦

厚朴去皮剉炒三分 知母四分 一味春夏所宜秋冬去之

柴胡去苗一分半 人參去芦一分 黃連去須一分半

酒煮苦練三分 肉桂去皮一分 白茯苓三分 皂角水洗熨去

紫苑去苗六分 縮砂仁三分 小椒炒去汗并閉目一分半 川烏頭炮去

乾姜炮制三分 巴豆霜五分 白朮一分 吳茱萸湯洗七次五分

右除巴豆霜另入外同為極細末煉蜜為丸如桐子大每服  
十九溫水送下虛實加減

**神保丸** 治心膈痛腹痛血痛腎氣痛脇下痛大便不通氣噎宿

脾胃論

卅六

食不消

木香 胡椒各二分 乾蝎七個 巴豆十個去皮

右件四味為末湯浸餅為丸如麻子大朱砂三錢為衣每  
服五丸心膈痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨姜煎湯下血痛  
炒姜醋湯下腎氣脇下痛茴香酒下大便不通蜜湯調攪椰  
末一錢下宿食不消茶酒漿飲任下

**雄黃聖餅子** 治一切飲食所傷心腹滿而不快此藥與黃丸相似

巴豆一百個去 雄黃半兩 白麵一十兩重羅

右為細末共麵和勻用新水和作餅如手大以漿水煮之至  
浮於水上漉出控旋着硬軟搗作劑丸如桐子大捻作餅子  
每服五七餅子加至十餅十五餅嚼破一餅可利一行茶酒  
任下食前



**感瀉** 治虛中積冷氣弱有傷停積胃腕不能傳化或因氣傷

冷因飢飽食飲酒過多心下堅滿兩脇脹痛心腹大疼霍亂

吐瀉大便頻後重遲滯久痢赤白膿血相雜米穀不消愈而

復發又治中酒吐逆痰逆惡心喜唾頭旋膏膈疼悶四肢倦

怠不欲飲食又治妊娠傷冷新產有傷若久有積寒喫熱藥

不効者並悉治之又治久病形羸在冊歲月漸致虛弱面黃

肌瘦飲食或進或退大便或秘或泄不拘久新積冷並皆治之

**巴豆** 七十個去皮

**木香** 一兩

**杏仁** 一百四十個湯浸去皮尖另研

**乾姜** 炮製一兩

**肉苳蔻** 去皮二十個

**丁香** 半一兩

**百草霜** 二兩

右除巴豆粉百草霜杏仁三味外餘四味為細末與三味同

拌研令細用好蠟置和先將蠟六兩溶化作汁綿濾淨更以

好酒一升於銀石器內煮溶滾數沸傾出候酒冷其蠟自浮

脾胃論

於上取蠟秤用丸春夏修合用清油一兩於鉢內熬令沫散

香熟次下酒煮蠟四兩同化作汁就鍋內乘熱拌和前藥末

秋冬修合用清油一兩半同煎煮熟作汁劑藥分作小錠子

以油絹裹之旋丸服

**白木** 治一切瀉痢無問膿血相雜裏急窘痛日夜無度

又治男子小腸氣痛及婦人臍下虛冷并產後兒枕塊痛亦

治產後虛弱寒熱不止者

**茯苓**

**白木** 略一兩

**五味子**

**烏梅** 取肉半兩炒

**車前子** 一兩

**米穀** 三兩去頂接醋蜜一宿炒

右為末每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服空心

**白濁** 治腸癖下白瀉毒下血

**槐花**

**青皮** 各一分

**當歸** 身

**升麻** 各一分

**荊芥穗** 六分



川芎四分 熟地黄 白朮各六分

右為細末每服二三錢清米飲湯調下食前

**白朮** 治休息痢晝夜無度腥臭不可近臍腹撮痛諸藥不効

椿根白朮壹兩

訶子半兩去核碎

母丁香二十个

右為細末醋麩糊丸如桐子大每服五十九丸陳米飲湯入醋

少許送下日三

**弦脉**

風邪所傷甘草芍藥湯黃耆建中湯之類或甘酸之劑皆可用之

**洪脉**

熱邪所傷三黃丸瀉黃丸調胃承氣湯或甘寒之劑皆可用之

**脾胃**

右關所出其脉緩

如得

**緩脉**

本經太過濕邪所傷平胃散加白朮茯苓五苓散或除濕淡滲之劑皆可用之

**墻脉**

燥熱所傷異功散加當歸四君子湯加熟地黄或甘溫甘潤之劑皆可用之

**沉細脉**

寒邪所傷益黃散養胃丸理中湯如寒甚則加附子甘熱之劑皆可用之

前項方論乃常道也有變則更之

**胃風湯**

治大人小兒風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下

脇肋虛滿腸鳴疼痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血日夜

無度並宜服之

人參

白茯苓

芎藭

桂

當歸

白芍藥

白朮

已上各等分

右為散每服二錢水一大盞入粟米數粒同煎至七分去

滓稍熱服空心食前小兒量力減之

**心**

治丈夫婦人二焦積熱上焦有熱攻衝眼目赤腫頭項



腫痛口舌生瘡中焦有熱心膈煩燥不美飲食下焦有熱小便赤澀大便秘結五藏俱熱即生癰癤瘡瘻及治五般痔疾糞門腫痛或下鮮血

黃連

黃芩

大黃

以上各一兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服二十九用熱水送下如臟腑壅實加服九數小兒積熱亦宜服之

**白朮** 治虛熱而渴

白朮

人參

木香

白茯苓

甘草

炒

藿香葉

以上各一兩

乾姜

二兩

右為鹿末每服三錢至五錢水一大盞煎至五分溫服如飲水者多煎與之無時如不能食而渴潔古倍加葛根如能食而渴白虎湯加入人參與服之

脾胃論

**治脾胃不和**

治脾胃不和可思飲食心腹脇肋脹滿刺痛口苦

無味膏滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面色痿黃肌體瘦弱怠惰嗜臥體重痛常多自利或發霍亂及五噎八痞膈氣反胃

厚朴

姜製炒一兩

蒼朮

油浸製 陳橘皮

二兩 甘草

炒一兩

右為細末每服二錢水一盞入生姜二片乾棗二枚同煎至七分去滓溫服或去姜棗帶熱服空心食前入鹽一捻沸湯點服亦得常服調氣暖胃化宿食消痰飲辟風寒冷濕四時

非節之氣

如小便赤澀加白茯苓澤瀉

如米穀不化飲食多傷加枳實

如膏中氣不快心下痞氣加枳實木香



如脾胃困弱不思飲食加黃耆人參

如心下痞悶腹脹者加厚朴甘草減半

如遇夏則加炒黃芩

如遇雨水濕潤時加茯苓澤瀉

如遇有痰涎加半夏陳皮

凡加時除蒼朮厚朴外依例加之如一服五錢有痰用半夏

半錢

如嗽飲食減少脉弦細加當歸黃耆用身

如脉洪大緩加黃芩黃連

如大便硬加大黃三錢芒硝一錢先嚼麩炒桃仁爛以藥送

下

治飲食勞倦而小便閉塞不通乃血滯致氣不通

脾胃論

四十一

而竅澁也

知母 三分酒洗剉

黃蘗 四分酒洗剉

滑石 一分

澤瀉 三分茯苓 一分

右為細末每服半兩水三盞煎至一盞去滓稍熱服空心如

急不拘時候

治胃虛嘔噦吐逆膈咽不通

丁香 五分

吳茱萸 一分黃耆 一分

人參 一分

草豆蔻仁 一分

炙甘草 柴胡

橘皮

半夏 各五分

當歸身 一分半

升麻 七分

乾生姜 二分蒼朮 一分

黃蘗 二分

右剉如麻豆大每服半兩水二盞煎至一盞去滓稍熱服食

前忌冷物

治脾胃虛而心火乘之不能滋榮上焦元氣遺冬腎

虛寒



與膀胱之寒水旺時子能令母實致肺金大腸相輔而來剋  
心乘脾胃此大復其離也大勝必大復故皮毛血脈分肉之  
間元氣已經於外又大寒大燥二氣併乘之則苦惡風寒耳  
鳴及腰背相引膏中而痛鼻息不通不聞香臭額寒腦痛目  
時眩目不欲開腹中為寒水反乘痰唾沫食入反出常痛  
及心胃痛脇下急縮有時而痛腹不能努大便多瀉而少秘  
下氣不絕或腸鳴此脾胃虛之極也膏中氣亂心煩不安而  
為霍亂之由膈咽不通噎塞極則有聲喘喝閉塞或日陽中  
或暖房內忽發口吸寒風則復作四肢厥逆身體沉重不能  
轉側頭不可以迴顧小便澀而時躁此藥主秋冬寒涼大復  
年之藥也

葶豆蔻仁一分四分麩裹

吳茱萸八分湯洗去苦

橘皮八分益智仁八分白殭蚕八分或六分生甘草六分

熟甘草六分青皮六分桃仁湯洗去皮澤瀉一分小

黃耆八分半夏一分神麴四分人參八分麥蘖麴炒一分

姜黃四分當歸身柴胡二分或四分詳脇下多少用

右一十八味同為細末桃仁另研如泥一處研勻湯浸餅  
為丸如桐子大每服三五十九白湯送下斟酌加減

**神聖復氣湯**

治復氣乘氣足太陽寒氣足少陰腎水之旺子能

令母實羊太陰肺實反來侮土火木受邪腰背膏膈閉寒疼  
宜善嚏口中涎月中泣鼻中流涕或如息肉不聞香臭咳嗽  
痰沫上熱如火下寒如水頭作陣痛目中流火視物眩暈耳  
鳴耳龍耳并口鼻逆寒喜日陽夜卧不安常覺痰寒膈  
塞不通口失味兩脇逆而痛牙齒動搖不能嚼物陰汗前



陰冷行步歌側起居艱難掌中寒風痺麻木小便數而晝多  
夜頻而欠氣短喘喝少氣不足以息卒遺失無度婦人白帶  
陰戶中大痛捧心而痛紫黑失色男子控睪捧心腹陰陰而  
痛面如赭色食少大小便不調煩心霍亂逆氣裏急而腹反  
色白後出餘氣腹不能努或腸鳴膝下筋急肩胛大痛皆此  
寒水來復火土之難

柴胡

一分

藁本

八分

防風

半分

羌活

一分

乾姜

炮為末一分

人參

半分

甘草

八分

升麻

七分

半夏

湯洗七分

白葵花

五朵去心細

當歸身

六分酒洗到

郁李仁

五分另

里附子

炮製去皮臍一分

右件用水五盞同煎至二盞入

黃耆

一分

草苴

薤仁

無異燒熟

橘紅

五分

右入在內再煎至一盞再入下項藥

黃蘗

酒浸

黃連

酒浸

枳殼

生地黃

酒洗各

已上四味預一日另用新水浸又以

華細辛根

一分

川芎

細末

蔓荊子

二分

預一日用新水半大盞分作二處浸此二味并黃蘗等煎正  
藥作一大盞不去滓入此浸者藥再上火煎至一大盞去滓  
稍熱服空心又能治齟齬頰齟唇齟舌舌根強硬等證如神忌  
肉湯宜食肉不助經絡中火邪也大抵腎與膀胱經中有寒  
元氣不足者皆宜服之於月生月滿時隔三五日一服如病  
急不拘時分









