

外臺秘要方

九

外臺祕要方卷第九

欬嗽二十三門

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院上護軍丘林億等上進



欬嗽方三首

五嗽方四首

新久嗽方三首

卒欬嗽方八首

暴熱嗽方二首

冷嗽方三首

欬失聲方四首

氣嗽方八首

呻欬方二首

熏嗽法六首

積年久欬方二十一首

久欬坐卧不得方二首

欬嗽短氣方七首

十欬方七首

久欬嗽上氣唾膿血及濁涎方五首

欬嗽膿血方一十一首

久欬嗽膿血方四首

欬嗽唾粘方二首

許仁則療欬方一十二首

雜療欬方三首

欬嗽方三首

病源欬嗽者由肺感於寒微者成欬嗽也肺主氣合於皮毛邪之初傷先客皮毛故肺先受之五藏與六府為表裏皆稟氣於肺以四時更互五藏六府皆有欬嗽各以其時感於寒而受病故以欬嗽形証不同五藏之欬者乘秋則肺先受之肺欬之狀欬而喘息有音声甚則嘔血乘夏則心先受之心欬之壯欬則心痛嘯中介如哽甚則咽腫喉痺乘春則肝先受之肝欬之狀欬則兩_左_右脅下痛甚則不可轉側兩胠下滿乘季夏則脾先受之脾欬之狀欬則右脅下痛陰引於肩背甚則不可以動則欬乘冬則腎先受之腎欬之不已傳与六府脾欬不已則胃受之胃欬之狀欬而嘔甚則長出肝欬不已則膽逆之膽欬之狀欬而嘔膽汁肺欬不已則大腸受之大腸欬之狀欬而遺糞心欬不已則小腸受之小腸欬之狀欬而失氣失氣

与欬俱出肾欬不已則膀胱受之膀胱欬之狀欬而遺溺久欬不已則三焦受之三焦欬之狀欬而腹滿不欲食飲此皆聚於胃屬於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也又有十種欬一曰風欬欲語因欬言不得終是也二曰寒欬飲令食寒注入於胃從肺脉上氣内外合因之而欬是也三曰支欬心下硬滿欬則引四肢痛其脉反遲是也四曰肝欬欬而引脅下痛是也五曰心欬而唾血引年少陰是也六曰脾欬而涎出續不止下引少腹是也七曰肺欬引頸項而唾涎沫是也八曰腎欬則耳聳无所聞引腰并膝中是也九曰膽欬而引頭痛口舌是也十曰厥陰欬欬而引舌本是也診其右手寸口氣口以_上兩脉平陽明經也其脉浮則為陽实者病苦腹滿善喘欬脉微大為肝脾欬引少腹欬脉浮大者生沉伏匿者死又云脉浮直者生沈硬者死欬且嘔腹脹且泄其脉弦欲絕者

死欬脫形發熱脉小硬急者死欬且羸瘦絡脈大硬者死欬而
尿血羸瘦脈大者死出第一四卷中

小品療欬嗽紫菀七味湯方

紫菀半

五味子一

桂心二

杏人七十枚去皮
尖兩瓣

乾姜四

麻黃四

甘少

二月

右藥切以水九升煎取二升半去滓溫服七合日三服經
心錄古今錄驗同已海藻菘菜生葱蒜麪腥膩出第二

卷中

延年紫菀飲主欬嗽方

紫菀

貝母

茯苓

杏人去皮尖
兩人者

橘皮一

兩

右七物切以水五升煮取一十五合去滓分溫三服如人行
七八里更進一服是葛根芩連張文仲處古今錄驗同出第

五卷中

古今錄驗天門冬煎療欬嗽方

天門冬

六兩去心

杏仁三升去双皮
皮去核

桂心

厚朴

炙

杜仲

苦參

各三

附子

炮

六兩

乾姜

六

烏頭

二枚

人參

升

蜈蚣

一枚

去足

右七味別擣杏人其餘者合擣下筛以五斤膠餡和擣千
杵服加大棗一枚日三忌冷水猪肉生葱鯉魚出第九卷中

五嗽方四首

深師^春嗽一日上氣嗽二日飲嗽三日鮮嗽四日冷嗽五日
邪嗽四滿丸方

乾姜

桂心

瀉石花

芎藭

紫菀

芫花根皮

三個人參

細辛

甘草

半夏洗

鬼督郵

分

蜈蚣一枚去足

右十二物擣篩蜜和服如大豆五丸米飲下日三不知加之至七八丸服此丸無不差方祕不傳忌羊肉鴨生葱生菜海藻菘菜

又方

特生譽石一兩泥包燒半日欬冬花一錢三百枚

巴豆十六枚去皮髮別停如脂

右四味擣篩蜜和服如大豆米飲下二丸不知稍增至四五丸忌野猪肉芦笋並出第十八卷中古今錄驗療五十年效

備急華佗五嗽丸方

皂莢灸 乾姜

桂心

右三物等分擣篩蜜和丸如梧子服三丸酒飲俱得日三忌葱出第三卷中

古今錄驗四滿丸療五嗽一為氣嗽二為癆嗽三為躁嗽四為邪嗽五為冷嗽悉療之方

蜈蚣一枚 芫花根五分 蘭躅花分 乾姜

芎藭

桂心各四錢

人參

細辛各二分

右八味擣篩蜜和為丸一服米飲下五丸如大豆許日三稍加至十丸忌生葱生菜出第十九卷中

新久嗽方三首

深師療新久嗽喉膜血連年不差晝夜肩息麻黃湯方

麻黃去節四兩

桂心

甘草

兩

大棗十四枚擘

右四味切以水九升煮取三升去滓分溫三服日三數用有効忌海藻菘菜生葱等物

又療新久嗽前胡丸方

前胡六分

烏頭炮三分

桔梗

乾姜各二分

桂心八分

蜀牀汗分

右六味擣篩蜜和如櫻桃大一丸含化稍沸之汁日三又療久欬晝夜不得卧咽中水雞声欲死者療之良是猪肉冷水生葱並出第十八卷中

千金療新久欬嗽欬冬花煎方

欬冬花 乾姜末 芫花根熟熬為末
五味子 紫菀各二兩

右五味先以水一斗煮三物取三升半去滓內芫花乾姜末加白蜜三升合投湯中今謂於銅器中微火煎令如餡可一升半服東北校大含之日三服曾數用甚良忌蒜麴腥膩深師同出第十八卷中

卒欬嗽方八首

肘後療卒欬嗽方

金月下土分 攵七分

右二物熬擣蜜凡如梧子大米飲服十四丸曾用有驗
又方

飴糖六分 乾姜末分 攵一升

右三味先以水二升煮鼓三兩沸去滓內飴糖消後內乾姜末分為三服

又方

生姜汁 百部根汁

右二物合煎服二合並出第一卷中

張文仲辛欬方

百部根四

右一物酒一斗煮之再宿火溫服一升日再服之効肘後同

又方

溫清酒升 駆膏升

右服之亦療上氣並出第三卷中

備急卒欬嗽方

芫花熬二兩

右一物水二升煮四沸去滓內白糖一斤服如棗大勿食鹹酸物亦療久欬時後同

又方

爐中取鈎屑分桂心二皂莢皮子去二刀去

右三物擣篩蜜和丸如梧子許大人米飲下服十五丸小兒五丸日二服心生葱肘後同並出第三卷中

深師療卒欬逆上氣肩息晝夜不止欲絕麻黃湯方

麻黃去節

細辛各二兩

甘草半兩

桃人三十枚去皮

右四味切以水七升煮取二升去滓分三服秘方忌海藻菘

菜生菜出第十八卷中

暴熱欬方二首

千金療暴熱欬杏人飲方

杏人四十枚去皮

紫蘇研炒

桔梗四兩

此紫蘇子升橘皮

右四味切水一升本方无紫蘇

萸取三升分三服常服飲之不妨出第十

八卷中本方无紫蘇

子有乾姜

延年貝母前主暴熱欬方

貝母三兩

此紫菀

五味子

百部根

杏人去皮尖兩

人者研

甘草炙各三兩

右六味初以水五升煮取二升去滓和地黃汁三升生麥門冬汁一升白蜜五合好蘇二合生姜汁一合又先取地黃麥門冬及湯汁和煎減半內蘇姜汁掩不得停手又減半內蜜煎如稠糖煎成取如棗大含嚥之日三夜再蔣孝璋處忌海藻菘菜鹹物出第五卷中

冷欬方三首

深師療冷欬逆氣乾姜湯方

乾姜四兩

此紫菀一兩

杏仁七十枚去皮

火双人切

麻黃四兩去節

桂心

甘草二兩炙各

五味子一兩

右七味切水八升煮取二升七合分三服平脉人加射干一

代乾姜忌海藻菘菜生葱等

又療冷欬效茺花煎方

茺花二兩

乾薑二兩

白蜜半斤

右三味擣篩二味內蜜中掩令相和微火煎令如糜服如枣核一枚日三夜一欲痢者多服並出第十八卷中千金王新久欬

千金療冷嗽方

乾姜三兩末

膠餎一斤

右二味掩令和調蒸五升米下令熟以棗大含化稍搗之

日五夜三出第十八卷中

欬失聲方四首

廣濟療咽喉乾燥欬嗽語无声音桂心散方

桂心三兩

杏人三兩去皮去核搗

右二味擣篩為散以蜜和錦裹如棗大含之喫汁日三夜二

忌生葱油膩出第二卷中

古今錄驗療暴中冷傷寒鼻塞喘欬喉中痙攣失音声者方

取茺花根一虎口

根切曝

右一味令病人以薦自蒙就裏春茺花根令飛揚入其孔中當眼淚出口鼻皆羅刺即畢耳勿住令茺花根尽則止病必於此差

又療忽暴欬失声語不出杏人煎方

杏人一升去皮去核

通草四兩

此紫菀一兩

五味子各三

貝母四
生姜半兩

桑白皮五
蜜半升

清糖一升

右九味切以水九升煮五味取三升去滓內杏人脂姜汁蜜糖和攪微火上煎取四十升初服三合日再夜一稍加之千金同忌蒜麴炙肉等

又通聲膏方

五味子

款冬花

通草各三
兩

杏人

一升去尖皮
兩人者熬

人參

桂心

細辛

青竹皮

昌蒲

酪酥各二
升

麦膏升

白蜜升

姜汁一升

右十三味細切以水五升微火煎三上三下去滓內姜汁蜜膏煎令調和酒服如棗一枚忌生菜生葱羊肉餚並出第十九卷中千金用蘇升半
膏蜜各二升餘同

氣嗽方八首

病源夫肺主氣候皮毛大有運動勞役其氣外洩腠理則開因乘風取涼冷氣卒傷於肺即發成嗽故為暴氣嗽其狀嗽甚而少延沫出第十四卷中

此紫菀

貝母

百部根

款冬花

五味子

半夏各五分

射干

四分切

乾姜

橘皮各四分

杏仁

八分去皮尖
蘇子四分

白石英研

鐘乳研

右十四味擣篩以蜜和為丸如梧桐子酒服十九日再稍加至三十九忌羊肉餚諸生冷等物

又方

乾地黃

桂心

山茱萸

五味子各三
兩

茯苓四

甘草炙

鐘乳研各

丹參

澤鴻

右十味擣篩蜜和酒服十五丸如梧子日增至三十丸忌海藻生葱醋物菘菜蕪荑

又酒方
丹參
牛膝
防風
桂心
乾姜各三
乾地黃四
黃耆
獨活
附子炮
白朮
秦艽
石斛
蓆蓉各四
右十五味切以酒三斗浸七日初服二合日再稍稍加之忌食桃李雀肉生葱豬肉冷水蕪荑

又丸方

乾地黃四 防風

蓆蓉

澤鴻各三

五味子

茯神各三丸一
酥合

山茱萸
丹參
桂心半兩

右九味擣篩蜜和丸如梧子酒服二十丸日再稍加至三十丸忌醋物生葱蕪荑並出第十九卷中

延年杏仁煎生氣嗽方

好杏仁一升去皮尖者蜜合

生姜汁合

貝母八合別篩未

蘇子汁一升以七升水研和瀝取

右七味先擣杏仁如泥內後六味藥合煎如稠糖取如枣大含嚥之日三但嗽發細細含之忌豬肉荷孝瑜處

又療氣嗽前方

貝母

紫苑

百部根炙 款花冬

甘草炙各

桂心

右六味切以水六升煮取一升五合去滓內後藥

生地黃十三升生麥門冬汁合生姜汁十五合白蜜五合

酥合

白糖五合

杏人三合去皮尖双人熬擣作膏

煎如糖一服一匙日三稍加至三匙嗽定則停忌海藻生葱
菘菜薰羨蒜醋鹹食猪肉等

人療氣嗽杏人煎方

杏人五合去皮尖擣碎生姜汁合酥合

右四味以水三升研杏人取汁內銅鑄中煎搊可減半內
姜汁煎如稀糖內酥蜜煎令如稠糖一服日三服夜一
服稍加至兩匙忌猪肉

又杏人煎主氣嗽方

杏人一升去尖皮兩升者研漬取汁酥合

白蜜三合

右三味以水三升研漬杏人令味盡內銅鑄中煎可減半內
酥蜜煎二十沸內貝母末四分紫苑末三分甘草炙末一

分更煎搊如稀糖一服一匙日三夜一服以嗽止為度大
驗忌猪肉並出第五卷中

呻欬方二首

病源呻欬者猶是欬嗽也其脅膈痰飲多者欬則氣動於痰上
搏咽喉之間痰氣相擊隨欬動息呀呷有声謂之呻欬其與欬
嗽大體雖同至於投藥則應加消痰破飲之物以此為異耳出

第十四卷中

崔氏三十年以來呻欬並療之方

葛芙蓉子

新南青木香

真熏黃

無石

臭者

右三味等分擣篩為散以羊脂塗青紙一張以散藥著紙
上卷裏之平旦空腹燒裏頭令烟出吸取十吸日中時復吸
十吸日晚後吸十吸七日内禁生冷醋滑三日則差出第六
卷中

古今錄驗療呻欬書墨凡方大神驗万年縣令席君懿送

書墨分

甘遂分

葶苈子分前胡分

大黃分

巴豆分

心皮葵分

右六味擣篩為散巴豆葶苈別細研蜜和丸如梧子以白蜜
粥清飲旦空腹服三丸人弱服二丸則利水或吐三日以後
更一服還如上法不過三服愈療三十年欬如利不止者以
冷白飲止之吐利止後食禁生冷醋滑猪魚雞面油酒冷水
蒜芦筍此藥宜春夏服之有毒毋之棄寧從少起出第十九

卷中

廣濟療痕嗽上氣
喉中作水雞鳴

熏欬法六首

千金療欬熏法

細熟艾薄三布紙上廣四寸復以石硫黃末薄布艾上務令
調自以荻一枝如紙長卷之作十枚先以火燒纏下去荻其

煙從荻孔中出口吸取煙嚥之取吐止明日復熏之昨日餘
者後日復熏之三日止自然差惟得食白糜餘皆禁之古
今錄驗同

又法

熏黃研令細

以搣一紙并上熏黃令与搣相入調勻卷之如前法裏之亦
如上法日一二止以吐為度七日將息後羊肉羹補之

又法

欄青布廣四寸上布艾艾上又布青葵石末葵上布少熏黃
末又布少鹽又布少豉末急卷之燒令著內燥罐中以紙蒙
頭作小孔以口含取煙嚥之以吐為度間時復息煙盡止日
一三用三卷用不尽差三七日慎油膩並出第十八卷中

崔氏療久欬本草重法

欵冬花

右一味每旦取如雞子許用少許蜜挿花使澗內一升鐵鑄中又用一毫椀合鑄椀底鑽一孔孔內挿一小竹筒無竹蒂亦得其筒稍長作椀鑄相合及挿筒處皆趁涼之勿合漏烟氣鑄下著炭火少時欵冬烟自從筒中出則口含筒吸取烟嚙之如覓心中少悶湏暫牽頭即將指搘捻筒頭勿使漏烟氣吸烟使尽止凡如是三日一度為之待至六日則飽食羊肉餌飪一頓則永差出第六卷中

古今錄驗療欵冬花呼合切煙法

鍾乳研

白石英研

人參

丹參研

雄黃各七

水艮研

鳥羊脂

一
具

津紙張

右八味各擣篩為末以水艮投藥裏細研使入諸藥羊脂熬取置紙中令均平使厚一分散藥令周徧翦紙一張作三分

瘦弱婦人五日用半寸熏未服藥前齊五百日服藥後一百日忌五辛酒肉此一劑得療五十人上氣悉皆愈忌生血物又療欬腹脹氣上不得卧身躰水腫長絳振熏法

蠟紙一張熟艾薄布滿紙上

熏黃末三分

欵冬花未二分

右三味並遍布艾上著一葉筒卷之寸別以繩繫之燒不須欲烟嚙之亦可三十嚙飲訖則差飲盡三劑一百日斷鹽醋日一每欬三寸三日尽一劑出第十九卷中

療欬方一十四首

深師療欬方

巴豆

炮去壳勿傷肉

右宇吞初日飲服一枚日三服良忌野猪肉戶戶千金同

又方

雞子白皮

十四枚
熬令黃

麻黃三兩

去節

右二味擣成散每服方寸匕日二食後飲下之无所忌

又方

麻黃二兩

去節
紫菀兩

貝母三兩

去心

右三味擣篩蜜和丸如杏核綿裹含稍嚥汁尽更作日四五度

又方

杏人一百二十枚

去皮大熟
豆熬令干

乾棗四十枚

去核

右三味合擣如泥丸如杏核含嚥令尽日七八度尽更作出

古今錄驗百部湯

療欬晝夜不得眠兩眼突出方

百部半

生姜半

細辛

貝母

兩

甘草

二升
炙

杏人四升去皮

大兩人者

紫菀

三

桂心

二

白朮

二升
炙

麻黃

六升

去節

五味子

二

右十一味切以水一斗二升煮取三升分三服忌桃李雀肉

海藻菘菜生葱

千金元

杏人

紫菀餘同

又療欬噙散方

細辛

紫菀

天雄炮

石膏

欬冬花

鍾乳

合

右六味擣篩作散如大豆七聚以小竹筒噙服日二不得食生魚醬醋生菜但食糜七日欬愈乃止若大豆聚不如亦小益勿多甚良忌生菜冷水猪肉千金同又療欬麻黃五味子湯方

麻黃四兩

去節

五味子

五

合

乾姜合

細辛

二

桂心

二

甘草

二升

半夏

三升

洗

杏人

大兩人者

三月去皮

煎之如糜一服如半枣日三不知加之一方不用干姜取芫花汁蜜和煎令可丸服如梧子三丸日三

又療三十年欬氣奔上守死醫所不療海藻丸褚仲堪方

海藻三
分

麦門冬
五分

昆布

乾姜

細辛

文蛤

桂心

蜀椒汗合二分

右八味擣篩蜜和服如杏人許夜卧一丸著舌上稍噙汁
尽更著一丸忌生葱生菜等

又療三十年欬嗽上氣短氣久冷五藏客熱四支煩疼食飽則
劇時有發甚不能行步夜不得卧多夢香豉丸

香豉四分熟

杏人皮兩分去尖

細辛三分

桂心三分

甘草八分

乾姜二分

吳茱萸二分

紫菀六分

右八味擣篩蜜和服如梧子四丸日三不知增之能含嚼噙汁

亦佳忌海藻菘菜生葱生菜

又療三十年上氣欬嗽欬冬花丸方

欬冬花六分桂心四分

紫菀六分

杏人四分去尖

皮兩分去尖

甘草七分

細辛三分

吳茱萸二分

桂心三分

比肩者在前

蜀椒八分

罗子一粒心

右十三味擣篩蜜和丸如梧子服三丸稍加日三服忌生葱
辛鹹醋猪肉冷水海藻菘菜生菜狸肉等一方十四味此方

又療三十年欬嗽上氣咽喉如水雞鳴或唾腥血師藥不能療

者方

香豉三升熟

蜀椒汗一升

乾姜斤

猪肪三斤

右四味擣篩內防藥中以水五升合豉等物熟煎每以二合
服之大効

又療三十年欬嗽七星散方

煎之如糜一服如半枣日三不知加之一方不用干姜取羌

花汁蜜和煎令可丸服如梧子三丸日三

又療三十年欬氣奔上守死醫所不療海藻丸褚仲堪方

海藻三

麦門冬

去心昆布

乾姜

細辛

文蛤

桂心

蜀椒汗合

右八味擣篩蜜和服如杏人許夜卧一丸著舌上稍、嗽汁
尽更著一丸忌生葱生菜等

又療三十年欬嗽上氣短氣久冷五藏客熱四支煩疼食飽則
劇時有聲甚不能行步夜不得卧多夢香豉丸

香豉四分

杏人

二分去尖皮兩人熬

紫菀三分

桂心三分

甘草八分

乾姜二分

細辛三分

吳茱萸二分

右八味擣篩蜜和服如梧子四丸日三不知增之能含嚼嚥汁
亦佳忌海藻菘菜生葱生菜

又療三十年上氣欬嗽欬冬花丸方

欬冬花六

桂心四分

紫菀六分

杏人四分去尖皮兩人熬

附子炮三分

藜芦四分

乾姜六分

甘草七分

細辛六分

防風八分

芫花六分

蜀椒八分

野葛四分

去心

右十二味擣篩蜜和丸如梧子服三丸稍加日三服忌生葱
辛鹹醋猪肉冷水海藻菘菜生菜狸肉等一方十四味此方
忌酢忌有芥苓

又療三十年欬嗽上氣咽喉如水雞鳴或唾膿血師藥不能療

者方

香豉三升

蜀椒一升

乾姜一斤

猪肪三斤

右四味擣篩內防藥中以水五升合豉等物熟煎每以二合
服之大効

又療三十年欬嗽七星散方

右八味切以水一斗煮取四升去滓分温五服日三夜二忌

海藻菘菜羊肉餚生菜生葱

又療欬羊肺湯太醫史脫方

欬冬花一
紫菀

桂心

甘草炙各半兩

羊肺一枚細切

右十味切以水八升合煮取三升去滓一服三合日三禁食

鹽蒜生菜海藻菘菜生葱並出第十九卷中

積年久欬方二十一首

病源肺感於寒微者則成欬久欬是連滯歲月經久不差者也凡五藏皆有欬嗽不已則各傳其腑諸久欬不已三焦受之其狀欬而脰滿不欲食飲此皆寒氣聚於胃而關於肺使人多涕唾而变面浮腫氣逆故也出第十四卷中

深師療五藏欬積年劇則上氣不得卧候中如有物醫所不療五愈丸方

桂心

細辛

乾姜

白菀

甘草炙各三錢

蜀椒汁

代赭

通草

欬冬花

芫花熬各一分

伏龍肝

紫菀

牡砺各二分

細熬

右十三味擣篩以飴糖和之擣合調和如枣核一丸含之稍稍嚥其汁尽復含令口中熱為候不知以意加之其久病重者晝夜二十餘丸若一歲欬者一月愈十歲欬者百日愈忘海藻菘菜生葱生菜等

又療三十年欬芫花煎方

芫花二兩

乾姜三分

右二味以水五十煮芫花取三升去滓內姜末加蜜一升合

蜀林汗

桑根白皮 芫花根皮 款冬花

細辛 伏龍肝各

兩

紫菀

代赭

細辛

伏龍肝各

右八物擣為散取作七星聚如碗豆大以竹筒口當藥上
一一噙嚥之令藥入腹中先食訖即服藥日三服後三日不差
復作七聚以一脔肉炙令熟以轉展藥聚上令藥悉在炙肉
中仰卧咬咀炙肉汁令藥內飲：比毒蛇咽中藥力足吞肉
前後所療皆不至食肉便愈若不愈復作如初法必愈乃止
羊牛鹿肉皆可用勿用猪肉忌生羨並出第十八卷中

千金延年

千金療三十年效軟方

蜜一斤 生姜二斤

取汁

右二味先秤銅鉤知斤兩訖內蜜復秤知斤兩次內姜汁以
微火煎令姜汁盡惟有蜜斤兩在止旦服如枣大含一丸日

三禁一切雜食

又療三十年效方

此紫菀而

款冬花三
兩

右二味為散先食飲服一錢七日三七日愈張文仲古今錄
驗深師同

又療三十年效方

百部根三

右一味擣取汁煎之如飴以溫粥飲服方寸匕日三服深師
方白蜜二升更煎五沸服三合有驗
又療久效不差方

兔矢四十枚

胡桐律一

砂硝三

右三味擣篩蜜和為丸服如梧子三丸令吐冷物尽則差並
出第十八卷中

延年療久效不差方

猪肾一具去脂膜 树二十八顆開口者

右二味取腎一顆上作十四孔取林內孔中兩腎摠著二十
八顆了以水緩煮令熟割破細切散之令尽有驗張文仲處
出第五卷中

崔氏療積年欬喉中啞声者

芫花根白皮六分切熬今焦黑

百部根八分切熬 杏人十分去皮尖熬

蜈蚣半枝

桑白皮六分

麻黃八分去節

紫菀八分

貝母十二分

款冬花六分

皂莢四分去皮子炙

五味子六分

右十一味擣篩蜜和為丸如梧子一服五丸日再服加至十
五丸煎姜汁送之出第六卷中

必効療欬嗽積年不差若背膈乾痛不利方

紫菀兩大 杏人四十九枚去皮熬酥一大

蜜一斤合

右四味紫菀及杏人各別擣先煮酥蜜攪令和內紫菀杏人
研破塊煎十餘沸藥成出空器中每日空腹服一禪丸細
含嚥之忌酒麯及猪肉等凌空道士得此方傳効不復可言

又方

蕘菪二分以水淘去浮者水煮
令牙出燒干炒令黃黑色 酥一雞子許

大棗七枚

右二味取姜刮去皮如筭子切之置餳中微火煎姜使熟

食使尽則差後待御用之極効

又方

款冬花

右一味和蜜大燒含取煙嚥之三數度則差

又方

取良若子二指撮吞唾嚥之日五六度先補李丞自服之極神効並出第一卷中

古今錄驗療人三十年寒冷欬逆上氣麻黃湯方

麻黃八分

去節

蜀牀汗

四分

細辛三分

藁本分

杏人五十九去皮

尖兩人者碎

右五味切以水七升煮取三升分為三服日三忌生菜

又許明療人久欬欲死方

取厚榆皮削如指大去黑刺令如鋸長尺餘內候中頻出入

當吐膿血則愈

又香豉丸療上氣三十年欬氣久寒冷痺脾中客熱變為冷方

食茱萸一

甘少刀

香豉校

細辛

杏人者熬各一兩紫菀二

右六味擣爲末別擣杏人如膏乃內末攬合勻蜜和丸如梧子服三丸日三不知增之至五丸暮卧時含十九著咽喉中嚥之忌海藻菘菜生菜出第十九卷中

久欬坐卧不得方二首

集驗療久憲氣嗽幹時奈端坐卧不得并喉裏牙声氣欬絕方

麻黃節

杏人去皮尖兩

人者碎

紫菀各三

柴胡

去皮

橘皮各四

右五味切以水六升煮取二升半去滓分三服一劑不差

兩三劑從來用甚驗張文仲同出第四卷中

備急療久欬奔喘坐卧不得并喉裏牙声氣絕方

麻黃節

四

乾蘇葉

橘皮各三

杏人四分去尖皮

人者碎

右五味切以水六升煮取二升半分三服兩劑必差甚効

張文仲同出第三卷中

欬嗽短氣方七首

病源肺主於氣候於皮毛氣虛為微寒客於皮毛傷於肺氣不足則成欬嗽大氣得溫則宣和得寒則痞滿虛則氣不足而為寒所迫併聚於肺間不得宣發故令欬而短氣也出十四卷中深師療傷中欬嗽短氣腸中痛流飲厥逆宿食不消化寒熱邪癖五內不調肉蓯蓉湯方

肉蓯蓉五刀 干地黃四刀

大棗三十枚擘

烏頭一月炮

甘少灸各二刀

桂心

繁花

五味子各二刀

生姜

石膏碎帛裹

麦門冬去心各三刀

右十一味切以水一升五升煮取七升去滓分為七服日四夜三方用大棗五十枚水一升二升煮取九升忌海藻生葱菘菜蕪荑猪肉冷水

又療上氣咽喉塞短氣不得卧倚壁而息腰背苦痛臂滿不能食面色痿黃貝母飲方

貝母

石膏綿裹碎帛

桂心

麻黃附

甘少灸各一月

杏人三十枚去尖皮兩入者

生姜五刀

半夏五刀洗

右八味切以水一斗煮取三升去滓分三服忌海藻菘菜羊肉生葱鴨等

又療欬而下利肺中痞而短氣心中時憚四支不欲動手足煩不欲食肩背痛時要寒海藻湯方

海藻四刀

茯苓六刀

半夏五合洗

五味子五刀

細辛二刀

杏人五十枚去尖皮兩入者

右六味切以水一斗煮取二升分三服忌羊肉鴨生葱醋物十

全同出第十八卷中一方有生姜一月

古今錄効五味子湯療達氣欬嗽腎膈中寒熱短氣不足方

五味子
桂心

紫菀

甘芍矣

前胡
生姜各二分

枣三十枚擘

山茱萸三分

右八味切以水一斗煮取七升绞去滓服一升日三夜三忌生

葱海藻松菜

廣濟方用
橘皮不用菜莖

又胡椒理中丸療欬嗽逆氣不能飲食短氣方

胡椒

畢撥

乾姜

款冬花

甘草炙
白术五分

橘皮

高良姜

細辛三分

右九味擣篩塞和丸如梧子一服五丸日再忌桃李雀肉生
菜海藻松菜

又泻肺湯療欬逆短氣方

人參三分

生姜細

半夏十五分

甘芍炙

橘皮十二分

竹葉三分

甘草炙

細辛三分

右六味切以水六升煮取二升分三服此方亦療霍亂忌羊
肉鴆海藻松菜
又療欬嗽及短氣脅痛姜林湯方

生姜

根去目汗
各一分

右六味切以水五升煮取二升每服一合並出第十九卷中
九種欬嗽方一首

千金九種氣欬嗽欲死百病方

乾姜三分

半夏洗

細辛

吳茱萸

芫花

茯苓

紫菀

防葵

甘芍矣

人三分

烏頭炮

大黃

葶苈子熬巴豆去皮

厚朴炙

杏仁者熬各至五味子

遠志去心法

皂角子矣

當帰

桂心

前胡

菖蒲

大戟

蜀林各半

白薇

右二十八味擣合塞丸先食服如梧子二丸日三以知為度不知增之忌海藻菘菜羊內餠生葱酢物野猪肉芦笋出第十八

卷中一方元巴豆有

塵末半分必非

欬逆及厥逆飲欬方七首

病源欬逆者是欬嗽而氣逆上也氣為陽流行府藏宣發腠理而氣肺之所生也欬病由肺虛感微寒所成搏寒於氣不得宣胃逆聚还肺則脹滿氣逆不下故為欬逆其狀欬而胃滿氣逆脾皆痛汗出尻墮股膝脇筋足皆痛也其湯熨鍼石別有正方補米宣道守令附于後養生方導引法云先以鼻內氣乃閉口效還復以鼻內氣欬則愈向晨去枕正偃卧伸臂脰瞋目閉口无息極脹腹兩足再息頃間吸腹仰兩足倍拳欲自微息定復為之春三夏五秋七冬九蕩滌五藏津潤六腑又云還向

反望側望不自七通療欬逆月中病寒熱出第十四卷中深師療欬嗽短氣不得息發熱冒苦滿不得飲食五味子湯方

五味子

桂心

甘草炙

細辛

各一

乾姜

三

紫菀

二

大枣

二十

麻黃

二

去節

右八味切以水八升煮取三升分三服无干姜生姜亦得忌海藻菘菜生菜生葱出第十八卷中

千金竹皮湯生欬逆不吐血不息方

生竹皮

三

紫菀

二

鈴糖

一

生地黃

十

百合味切以水六升煮取三升分三服忌益羨深師同效連上氣喉咽不利止逆下氣麥門冬湯主之方

麥門冬

二升

去心半夏

洗

人參

甘草

各二

梗米

大枣

十四枝

右六味切以水一斗二升煮取六升服半升日三夜一忌羊

肉鴆海藻菘菜並出第十八卷中此本仲景

傷寒論方

古今錄驗療厥逆藏氣有餘寒氣虛勞裏氣驚氣其人善
悸晝中或寒上下無常多悲傷流四肢脅四邊常有核遊腫
大便不利遊氣湯方

厚朴四兩

人參

甘草炙

牡蛎各二兩

茯苓四兩

桂心

半夏各一兩

梔子炒

生姜八兩

黃芩三兩

甘草炙

桂心

半夏各一兩

梔子炒

右十味切以水九升煮取三升半去滓分服七合日三夜再
若腹痛去黃芩加芍藥三良驗是海藻菘菜生葱羊肉鴆
醋物等

又療欬逆上氣丸方

乾姜四兩

桂心

欬冬花酪

附子四節炮

五味子兩

巴豆

六十枚老者三十枚去皮心熬

右六味先擣上五味下節別擣巴豆如膏內藥末以蜜和丸
如麻子以一丸著牙上咬咀常暮臥時服亦可日三服忌生葱
豬肉芦筍

入小胡桃丸療寒冷欬逆晝中有冷咽中如有物狀吐之不出方

胡桃五兩

乾姜六兩

欬冬花三分

右三味擣篩蜜和丸如梧子大米飲服三丸日再服以知為
度禁如前法並出第十卷中

十欬方六首

千金問曰欬病有十何謂也師曰有風欬有寒欬有支欬有肝
欬有心欬有脾欬有肺欬有腎欬有膽欬有厥陰欬問曰十欬
之証何以為異師曰欬語因欬言不得終謂之風欬飲冷食寒
因之而欬謂之寒欬心下堅滿欬則支痛其脈反遲謂之支欬
欬引臂下痛謂之肝欬而唾血引手少陰謂之心欬而涎

出續：不止下引少腹謂之脾欬、引頸項而唾涎沫謂之肺
欬、則耳无所聞引腰并脅中謂之腎欬；而引頭痛口苦謂
之膽欬、而引舌本謂之厥陰欬夫風欬者下之寒欬支欬肝
欬多足太衝心欬足刺手神門脾欬多足太白肺欬灸手太泉
腎欬多足太谿膽欬灸足陽陵泉厥陰欬灸手太陰留飲欬者
其人欬不得卧引項上痛欬者時如小兒瘻癰狀夫久欬為水
效而時發熱脈在九蔣一云辛弦者非虛也此為肓中寒實所致也
當吐之欬家其脉弦欲行吐藥當相人體弱无热乃可吐耳
又欬家其人脉弦為有水可与十枣湯下之不能卧出者陰不
受邪故也

又夫有支飲家欬煩肓中痛者不卒死至一百日一歲与十棗
湯方

芫花

甘遂

大戟並熟等分

右三味擣下篩以水一升五合煮大棗十枚取八合绞去滓
內藥末彊人取重一錢羸人半錢匕頓服之平旦服而不下
者明日更益藥半錢下後日補養古今錄驗同此方仲景傷寒論方

又欬而引脇下痛者亦十枣湯主之謂前

又夫酒客欬者必致吐血此坐久極飲过度所致也其脉沉者
不可發汗久欬數歲其脉弱者可療实大數者死其脉虛者
必苦冒也其人本有支飲在肓中故也治屬飲家上氣汗出而
欬屬飲家欬而小便利若失溺不可發汗、出則厥逆冷
又欬逆倚息不得卧小青龍湯主之

麻黃

芍藥

細辛

桂心

乾姜

甘草炙各三兩

五味子

半升

半夏洗半升

右八味切以水一斗先煮麻黃減二升去沫乃內諸藥莫得
三升去滓服一升若渴者去半夏加桔梗根三兩欬利者去

麻黃加芫花如雞子大熬黃若食飲噎者去麻黃加附子一枚炮去皮六片破小便不利少腹滿者去麻黃加茯苓四兩

若喘去麻黃加杏仁半升去尖皮兩人者數竿芫花不主利麻黃止喘今語反之疑非仲景意加減忌海藻菘菜生葱生菜

羊肉餚此本仲景傷寒論方

青龍下已多唾口燥才脈沉而尺脉微手足厥逆氣從少腹上撞肩咽手足痺其面翕熱如醉狀因復下流陰股小便難時復冒者可與茯苓桂心甘草十五味子等湯主之治其氣撞方

茯苓四兩

桂心一兩

甘草三兩

五味子半升

右四味切以水八升煮取三升去滓溫分三服忌海藻菘菜生葱以下金匱之亦脫此方

衝氣則抵而反更欬有滿者與茯苓甘草五味子去桂心加乾姜細辛以治其欬滿方

茯苓四兩 甘草炙 乾姜 細辛各三兩

右五味切以水八升煮取三升去滓溫服一升日三忌海藻菘菜生菜醋物等

欬滿即止而復更渴衝氣復作者即以細辛乾姜為熱藥此法不當逐渴而渴反止者為支飲也支飲法當冒者必嘔者復內半夏以去其水方

茯苓四兩 甘草炙 乾姜 細辛各三兩

五味子半升 半夏半斤

右六味切以水八升煮取三升去滓溫服一升日三忌海藻菘菜生菜羊肉餚酢等口齒酸楚

水去嘔則止其人形腫可內麻黃以其欲逐痺故不內麻黃乃內杏人也若逆而內麻黃者其人必厥所以然者以其人血虛

麻黃發其陽故也方

茯苓四兩

乾姜三兩

細辛三兩

五味子半

半夏半升

杏人皮半升去尖者甘草三兩

大黃三兩

右七味切以水一斗煮取三升去滓溫服

升日三忌海藻菘菜生菜羊肉餚酢等

若面熱如醉狀者此為胃中熱上衝熏其面令熱加大黃利之方

細辛

甘草炙

乾姜各三兩

茯苓四兩

杏人皮各半升

大黃

三兩

右八味切以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服忌海藻菘菜生菜餚醋羊肉並出第十八卷中

火欬嗽上氣唾膿血及渴涎方五首

病原火欬嗽上氣者是肺氣虛極風邪停滯故其病積月累年火不差則腎皆痛面腫甚則唾膿血也出第十四卷中

深師療肺氣不足欬逆唾膿血咽喉閉塞脅滿上氣不能飲食

卧則短氣補肺湯方

款冬花三兩

桂心二兩

鍾乳二兩

乾姜二兩

白石英二兩

麥門冬去心四兩

五味子三兩

粳米合

桑根白皮一斤大棗一百枚擘

右十味切以水一斗二升先煮桑根白皮盡去滓內藥煮取二升二合分三服忌生葱等干金同

又療欬遲上氣時：唾濁但坐不得卧皂莢丸方

長大皂莢一挺去皮子炙

右一味擣篩蜜和服如梧子一丸日三夜一以大棗膏和湯下之干金經心錄延年同

又療欬逆上氣吐膿或吐血脣滿痛不能食補肺湯方

黃蓍五刀桂心

乾地黃 茯苓

厚朴

乾姜

紫菀

橘皮

當歸

五味子

遠志

麥門冬

去心各三
月

甘草炙

鍾乳

白石英

各二分
根白皮

人參各三兩

大棗二十枚擘

右十八味切以水一斗四升煮取四升分溫四服日三夜一忌海藻菘菜生葱醋物千金同並出第十八卷中

古今錄驗療寒冷欬嗽上氣肯滿唾腥膿血四味石鍾乳散方

鍾乳碎

白礬石鍊

欬冬花

桂心各一

右四味擣合下篩以筒吸之如大豆許七聚先食日三不知稍增之數試有驗當作七聚還吸之忌生葱千金集驗同出第十九卷中

必効療上氣唾膿血方

炙兩乳下累白降各一百壯良千金同

欬嗽膿血方十一首

病源欬嗽膿血者損肺傷心故也肺生氣心主血肺感於寒微者則成欬嗽傷於陽脉則有血血與氣相隨而行欬嗽極甚傷血動氣俱乘於肺以津液相搏蘊結成膿故欬嗽而有膿血也出第十四卷中

廣濟療瘕嗽吐膿損肺方

人參分

瓜蒂二分

杜衡五

右三味擣篩為散平旦空腹以熱湯服方寸匕當吐淡水惡汁一二升吐已復煮白粥食淡水未尽停三日更進一服忌生冷油膩猪魚肉後古今錄驗用杜衡三分人參一分服一錢匕出第二卷中

深師療欬逆唾膿血雞子湯方

湯

雞子一枚甘草二分

甘遂分

大黃二分

黃芩二分

右五味切以水六升煮取二升去滓內雞子攪令調盞飲之

良忌海藻菘菜

又療傷肺唾血方

茅根

右一味擣篩為散服方寸匕日三亦可絞取汁飲之主熱渴出第四卷中

刪繁著療肺偏損腎中虛肺偏痛唾血氣欬欬冬花散方

欬冬花

當歸各二分

桂心

茅虧

五味子

附子炮各七分

細辛

貝母各四分

乾姜

乾地黃各八分

白朮

甘草炙各七分

右十四味擣篩為散清酒服方寸匕日二服忌生葱生菜

桃李薤肉海藻菘菜豬肉蕪荑出第五卷中
千金百部丸主諸欬不得氣息唾膿血方

百部根二分

麻肺

桂心

五味子

甘草炙

紫菀

乾姜各一分

右七味擣篩蜜和丸如梧子服三丸日三以知為度忌生葱海藻菘菜等物

又療肺傷欬唾膿血腸澀背氣不飲食惡風目闇眩足膝脛寒傷方

乾地黃切半

桑白皮切半

芍藥切一升

白朮五兩

桂心二分

人參

紫菀各二分

大棗二十枚

生姜五兩

飴糖一升

大麻一分

大麥三分

右十二味切以水一斗五升煮入麥瀝取一斗去滓內薑煎取三升分三服忌生葱

又療肺病欬嗽膿血及唾涕血出不止方

好酥五十斤

右三遍鍊停凝當出醍醐服一合日三以差止

入方

三遍鍊酥如雞子黃適寒溫灌鼻中日二夜一

又療欬嗽喘息喉中如有物唾血方

杏人二升去尖皮兩人者 猪脂二升 合

糖升

生姜汁升

蜜一斤

右三味先以猪膏煎杏人黃黑出以紙拭令淨搗如膏合五物令可丸服如杏核日夜六七漸加之並出第十八卷中古今錄驗鴻肺湯療肺中膿欬唾血氣急不安卧方

芎藭

麻黃

細辛

枳汗

當歸各一兩

右五味切以水七升煮取三升分為三服日三微汗或吐膿

血忌生菜一方有生姜一兩

入羊肺湯療欬晝夜无閑息氣欲絕肺傷唾血方

鍾乳

五升

牡蛎熬

桂心

六兩

射干

桃人

皮去尖

貝母

橘皮

百部根

款冬花

甘草

白石英

半夏

洗各五兩

五味子

各三升

生姜

射干

右十六味切先以水二斗三升煮羊蹄取一斗去肺內諸藥

煮取三升分四服日三夜一忌海藻菘菜羊肉鴨生葱出第十九卷中

久欬嗽膿血方四首

病源久欬嗽膿血者肺感於寒微則成欬嗽極甚傷於脛絡血液繫結故有膿血氣血俱傷故連滯積久其血黯癥與膿

經

甘中六分

欬冬花化破

生麥門冬八分

去心

葱白一握

枳郎子碎合

桔梗

升

地黃汁半升

右八味切以水六升者取二升绞去滓下地黃汁分溫三服
如人行四五里進一服不利忌生菜熟麴及肉海藻菘菜魚
蒜粘食猪肉薑夷出第二卷中

延年紫蘇飲療欬嗽短氣唾涕稠喘乏風虛煩損降无時者
宜服此方

紫蘇

貝母各二

此半茺牙

麥門冬一升

棗五枚

葶藶子一方

熬合

甘草一升

右十味切以水六升煮取二升分為四服每服如人行七里
禁猪魚肉蒜海藻菘菜出第五卷中

許仁則療欬嗽方一十二首

許仁則論欬嗽病有數種有热嗽有冷嗽有肺氣嗽有飲氣嗽

热嗽者年少力壯肺氣充滿將息傷熱積熱所成故致热嗽此
但飲食取冷兼以藥壓之自歇冷嗽者年衰力弱肺氣虛微如
復寢食傷冷故成冷嗽此亦但將息以溫兼進溫藥則當平復
肺氣嗽者不限老少宿多上熱後因飲食將息傷熱則常嗽不
斷積年累歲肺氣衰便成氣嗽此嗽不早療遂成肺癰若此
將成多不救矣飲氣嗽者由所飲之物停滯在肓水氣上衝又
於肺得此氣便成嗽火而不除漸成水氣若作此病亦難
療之热嗽之狀更无其餘但遇熱便發此者宜合生地黃等
七味湯服之方

生地黃一斤

生姜各

桑根白皮切射干二升

干葛切六合

紫蘇合

竹瀝升

右藥細切六味以水一斗煮取三升去滓內竹瀝攪調每食
後良久則服之分一劑作四服若竟可則重令服之病輕者

三數前則差忌蕪羨

又依前生地黃等七味飲雖得整差於後還發宜合紫菀等十味丸方

紫菀五分

桑白皮六分

射干四分

百部根五分

麻黃二分

乾葛五分

地骨皮

升麻三分

乾地黃六分

芒消六分

甘草四分

右藥擣篩蜜和丸如梧子以竹瀝下之初服十五丸日再服稍
稍加至三十丸忌藥羨

又冷嗽之狀但遇諸冷此疾便發有如此者宜合大棗等七味
湯主之方

大乾棗三十枚

桂心四兩

杏人三百枚去尖

細辛五分

吳茱萸

當歸各三分

杏人皮兩人研

細辛五分

右藥切以水八升煮取二升六合去滓溫分三服每服如人

行十里久服一劑覓得力至三四劑亦佳隔三四日服一劑

此湯尤欠一味忌生葱生菜

又依前大乾棗湯服之雖可未能斷其根

遇冷便發宜合當歸等十味丸服之方

當歸切

細辛

甘草五分

桂心

吳茱萸

人參三分

蜀牀三合

橘皮

乾姜各四分

桑白皮兩分

甘草五分

桂心

右藥擣篩蜜和丸煮乾棗飲下之初服十九日再服稍如
至三十九如梧子服此丸經三五日覓熱每服藥後良久吃

三數口粥食壓之忌海藻菘菜生葱生菜

又肺氣嗽延久將成肺痿其狀不限四時冷熱晝夜嗽常不斷
喉白如雪細末稠粘喘息氣上乍寒乍熱發作有時肩口喉舌
乾焦亦有時唾血者漸瘦憔悴小便赤顏色青白毛聳此亦成

蒸有此狀者宜合白前等七味湯服之兼有麻黃等十味丸藥
白皮等十味煎

又肺氣嗽經又有成肺癰者其狀與前肺痿不多異但唾悉成
膿出元多少有此病者於白前湯中加半夏五兩黃耆三兩以
水一升煮取二升八合於麻黃丸中加黃耆五兩苦參六兩芍
藥三兩於桑白皮煎中加黃耆切三升共桑白皮地骨皮同煎
又加水三升同煎忌心羊內餳

白前湯方

白前三
桑白皮三
地骨皮四
麻黃二兩
生薑一兩
茯苓五兩

右藥切以水八升煮取二升六合去滓加竹瀝五合分溫四
服食後服之晝三夜一劑得力重合服五六剂佳隔三日服
一劑忌醋蕪荑

又依前白前等七味湯雖服竟可根本未除宜合麻黃等十味
丸服之方

麻黃二兩
白薇三兩
橘皮三兩
白前二兩
百部根五兩
乾地黃六兩
射干四兩
桑白皮六兩
地骨皮五兩

右藥擣篩蜜和丸薑桑白皮飲下之初服十九日再服稍
加至十五丸丸如梧子大本穴一味忌蕪荑
又凡病在背膈上者宜飽滿而在夜肺既居上此是病在上已
晝服丸夜无憑準宜含桑白皮汁等十味煎每夜含嚥之方
桑白皮升
地骨皮切三

二味用水七升熟煎取二升去滓澄清
生地黃汁五升生麥門冬汁二升
生葛根汁七升白蜜升
牛酥合大棗膏升

右八味先於微火上取生地黃汁以下生葛汁以上和煎減半則內桑白皮等二物汁和煎之三分減一則內酥蜜枣膏攬之勿停手得如稠飴狀煎成訖置別器中服之每夜欲卧時取一胡桃大合之細嚼汁稍加至雞子大飲晝日間丸服亦得忌無美

又飲氣嗽經久不已漸成水病其狀亦不限四時晝夜嗽不斷遇諸動喫物便致困劇甚者乃至以眼突出氣即欲斷汗出大小便不利吐淡飲涎沫無復窮限氣上喘息肩息每日眼腫不得平眠有如此者宜合細辛等八味湯草莖子十五味丸服之方

細辛

半夏洗

桂心

桑白皮各五
丹

乾姜

當歸各四
兩

芒消六
兩

杏仁六合云安
兩人者研

右藥切以水九升煮取三升去滓內芒消分溫三服每服如人行十里以當得快利後好將息經三四日合丸服之忌生葱生菜羊肉餚

丸方

草莖子十六合細辛

五味子各五

乾姜

當歸各四

桂心

人參

丁香

大黃

商陸根各三

橘皮四

桑白皮六

皂莢肉二兩

大腹皮

二十枚

麻黃二兩

去節

右藥擣篩密和丸莫桑白皮飲下初服十日再服稍加至十五丸如梧子大若利則減祕則加以大便通滑為度時得鴨溏亦佳忌生葱生菜

又依前細辛等八味湯草莖子等十五味丸不竟可漸成水病餘一如前况更加大小便祕滯頭面目脣浮腫宜合大乾枣三味丸服之方

大棗六十枚
擘去核 草薢子一升
熬杏人 一升去尖皮

焚杏人
兩人者熱

右藥合搗令如膏可作丸如硬燥不相著細下蜜作丸依還以桑白皮飲下之初服七八丸日再服稍加之以大便通為度病重者時令鴨溏佳亦有以前三味煮湯服之又依前大棗等三味丸服雖覓氣整歇然病根深固藥力微弱耳停服大棗丸合巴豆丸五味細服之蕩滌宿病方

巴豆人二十枚
熬去皮 杏人一百粒去尖皮
熬皮兩人者熬 牽牛子五合
熬 莖歷子六合
熬

大棗六十枚
擘去核

右藥合搗一如前大棗丸法还以桑白皮飲下之服三四丸日再相加利即減祕即加常以大便調為佳病甚時取鴨

湯亦佳忘芦笋野猪肉羹同出下卷中

雜療欬嗽方三首

古今錄驗玉藏六府皆令人欬肺居外而近上合於皮毛皮毛喜

受邪故肺獨易為嗽也邪客於肺則寒熱上氣喘汗出欬動肩背喉鳴甚者唾血肺欬經久不已傳入大腸其狀欬則遺糞腎欬者其狀引腰背痛甚則欬延腎欬經久不已傳入膀胱其狀欬則遺尿肝欬者其狀左脇痛甚者不得轉側肝欬經久不已傳入膽其狀欬則清苦汁出心欬者其狀引心痛喉中介如輒狀甚者喉痺咽腫心欬經久不已傳入小腸其狀欬則失氣脾欬者其狀右脅痛陰陽則引肩背甚者不得動便欬劇脾欬經久不已則傳入胃其狀欬即嘔甚則長虫出久欬不已則三焦受之三焦欬之狀欬而腹滿不能食飲此皆聚於胃閑於肺使人多涕唾而面浮腫氣逆也又非特有風寒冷人觸冒解脫傷皮毛間入腑藏為欬上氣如此也又非時忽然暴寒傷皮膚中與肺合則欬嗽上氣或肩背又痛欬唾有血者是其熱得非時之寒暴薄之不得漸散伏結深喜肺癰也因欬眼溫藥

欬尤劇及壯熱吐膿血汗出惡寒是也天有非時寒者急看四時方也

又療欬嗽上氣時、嘔白唾味數十歲者方

吳茱萸

五味子

大黃

桂心

甘草炙

細辛

人參

紫菀

欬冬花各

一大戟

竹茹各三分

右十一味切以水一斗煮取三升分為三服亦療陰冷欬至良忌海藻菘菜生菜生葱深師同並出第十九卷中

深師療諸欬心中逆氣氣欲絕杏人煎方

杏人

四兩去皮末

豬膏

白蜜

生姜汁十三升

右四味著銅器中於微火上先煎姜汁次內蜜膏令如鴆置器著地乃內杏人末復令得一沸煎成服如東大一丸含之日三不知稍增之

又療氣上迫滿或氣不通煩悶喘嘔蘇子湯方

蘇子一升

乾姜兩

半夏四兩

桂心

人參二兩

橘皮

茯苓各三兩

甘草一兩

右八味切以水八升煮取二升半分為三服若虛熱去乾姜用生姜六兩加黃芩二兩忌海藻菘菜羊肉鴆年葱酢物等並出第十八卷中

外臺祕要方卷第九

朝奉郎提舉藥局兼太醫令醫學博士臣裴宗元校正

右迪功郎充兩浙東路提舉茶鹽司幹辦公事張寔校勘

