

濟生拔粹方

五

表八裏

小柴胡湯

調中湯

加減樞機湯

瀉黃湯

抵當湯

加減大柴胡湯

半夏湯

附子四逆湯

涼膈散

黃連瀉心湯

芍藥湯

麻黃湯

澤瀉散

香薷湯

補肺散

半夏丸

枳木湯

七氣湯

龍骨丸

五補丸

桂枝加附子湯

半薑湯



七聖散

豬苓湯

犀角地黄湯

加減桃仁承氣湯

大承氣湯

小柴胡湯

藿香半夏散

木附湯

小承氣湯

桂枝芍藥湯

調中湯

當歸芍藥湯

八物湯

橘皮半夏湯

羌活湯


桂枝加乾薑湯

桔梗湯

木附湯

五瀉寬中散

地骨皮散



已上屬七表

加減小柴胡湯

人參黃耆湯代麻

八物湯 胡中血痢

解肌湯 十一表

已上屬八裏九道脈

醫岐子七表八裏隨證藥目錄

六經

六二

風論

小續命湯

大秦丸湯

三化湯

羌活愈風湯

四白丹

二丹丸

天麻丸

破傷風論

羌活防風湯

白朮防風湯

芎黃湯

大芎黃湯

羌活湯

心風湯

蜈蚣散

左龍丸

獨活湯

當歸地黃湯

白朮湯

江蘇丸

沒藥散

厲風論

漆瘡散

湯寒論

麻黃湯

麻黃附子細辛湯

九味羌活湯

白朮湯

羌活散

石膏散

芍藥散

柴胡散

黃耆散

川芎湯

蒼朮白虎湯

桔梗湯

大神木湯

黃耆解肌湯

咳嗽論

水煮金花丸

小黃丸

白朮丸

玉粉丸

薑桂丸

金花丸

吐論

桔梗湯

木香散

厚朴丸



方論與東垣機要內相同者於此不復重附所不同者附于此

風門

風者百病之始善行而數變行者動也風本為熱熱勝則風動宜以靜勝其躁熱血是也治須少汗亦宜少下多汗則虛其衛多下則損其榮治其在經雖有汗下之戒而有中藏中府之分中府者宜汗之中藏者宜下之此雖合汗下亦不可過也汗多則止陽下多則止陰止陽則損其氣止陰則損其形初謂寒裏不和須汗下之表裏已和是宜治之在經也其中府者面顯五色有表證而脈浮惡風惡寒拘急不仁或中身之後或中身之前或中身之側皆曰中府也其治多易中藏者唇吻不收舌不轉而失音鼻不聞香臭耳聾而眼瞽大小便秘結皆曰中藏也中藏之病難治也六府不和留結為癰五藏不和九竅不通無此乃在經也初證既定宜以大藥養之當順時令而調陰陽安藏府而和榮衛少有不愈者也風中府者先以加減續命湯隨證發其表如兼中藏則大便多秘澁宜以三化湯通其滯初證已定別無他變以大藥和治之大抵中府者多着四肢中藏者多滯九竅雖中府者多兼中藏之證至於舌強失音久服大藥能自愈也有中風濕者夏月多有之其證身重如山不能轉側宜除風勝濕去熱之藥如不可用鍼灸治之

治八風五痺痿厥等疾以一歲為總六經為別春夏加石膏知母黃芩秋冬加桂附芍藥六經細分加減方在後

方在後

破傷風湯 方在發明內

天麻丸 方在發明內

白木丸 方在寶鑑內

天麻丸 方在寶鑑內

天麻丸 行榮衛壯筋骨 方在元戎方中

如風瀉病不能愈者其論云子補丸治之

如中風自行以膏其後熱不能安臥此是風熱煩瀉

青丸主之

如小便不利不可以藥利之既以自汗則津液外亡小便自

少若利之使榮衛枯竭無以制火煩熱愈甚當俟熱退行止

小便自行也

破傷風

羌活防風湯 方在機要中

白木防風湯 羌活湯 大羌活湯 羌活湯 西風湯

獨活湯 又名羌活湯

當歸地黃湯 已上數方皆在機要中

白木湯 治破傷風大汗不止筋攣搐搦

白木 葛根 芍藥 升麻 黃芩

甘草 各半

右咬咀每服一兩水煎服無時

江蘇丸 治破傷風驚而發搐藏府秘澁知病在裏可用下之

江蘇丸 野鴿糞 白殭蚕 雄黃

蜈蚣 一對 天麻 壹兩

右為細末分作二分一分用燒飯為丸桐子大朱砂為衣

青鎮丸

白木湯

金花丸

紫沉丸

木香白木散

熱論

木香金鈴散

大黃散

牛黃散

牛黃膏

瘡論

桂枝羌活湯

麻黃桂枝湯

桂枝黃芩湯

白芷湯

桂枝石膏湯

桂枝芍藥湯

雄黃散

麻黃黃芩湯

眼論

散熱散子

地黃湯

宣毒散

疔藥

當歸湯

柴胡散

抽痛散

點眼藥

八釧血論

門冬飲子

五黃丸

生地黃湯

八消湯論

人參石膏湯

順氣散

茴香湯

化水丹

八瘡瘍論

內疎黃連湯

內托復煎散

當歸黃連湯

回瘡金銀花散

雄黃散

木香散

當歸散

乳香散

膏藥方

化堅湯

消毒散

接骨丹

巴戟湯

...

...

分入巴豆霜一錢半亦以燒飯為丸桐子大每服朱文
十九加巴豆霜九丸第二服二九加至利為度再用朱文
病愈止

沒藥散 治刀箭傷止血定痛

定粉 另研乳香 另研各壹分

風化大灰 膏兩 拈白藥 另研

各研為細末和勻搽上

厲風論

此疾非止肺藏有之以其病發於鼻從俗呼為肺風也鼻準腫
赤脹大而為瘡乃阻隨氣化也氣既不施則血為之聚血既以
聚則使肉爛而生虫也生虫者厥陰主之以藥緩疎之煎局方
升麻湯下瀉青丸余病各隨經治之

交骨散 治薦風

蟬殼 地龍炒 白殭蚕 全蝎焙 桑 凌霄花 半兩

右為極細末每服一錢酒調下於浴室內常在湯中住一時
許服藥效

傷寒論

治傷寒之法并諸方加減如

芍藥湯 **麻黃湯** **麻黃附子細辛湯** **白朮湯** **羌活散**

九味羌活湯 **石膏散** **柴胡散** **黃耆湯** **川芎湯** 并論

養木己身湯 **桔梗湯** **大神木湯** 已上數方皆在難知內

治婦人妊娠傷風自汗

黃耆 當歸 川芎 炙甘草 絡石

加蒼朮生地黃亦可

右為鹿末每半錢水煎溫服無時

咳嗽論

傷於濕冬必嗽大抵素秋之氣宜清而肅反動之則氣必
傷於熱咳甚而動於脾濕發而為痰也其有痰也寒少而熱
多散於濕在肝經謂之風痰濕在心經謂之熱痰濕在脾經謂
之濕痰濕在肺經謂之氣痰濕在腎經謂之寒痰宜隨證而治
之咳而無痰者以辛甘潤其肺咳而嗽者治痰為先故從南星
半夏勝其痰而咳嗽自愈也

天麻丸 治風痰咳嗽其脉弦面青四肢滿悶便溺秘澀心
多躁怒局方川芎防風丸亦可

南星壹兩 半夏壹兩 天麻五錢 雄黃貳錢 白麩叁兩

右為細末滴水為丸每服五十丸至百丸先煎漿水沸下藥

煮令浮為度攪出淡漿水浸另用生姜湯下

小續命丸 治熱痰咳嗽其脉洪而面赤煩熱心痛唇口乾燥多喜笑

南星壹兩 半夏壹兩 杏仁壹兩

右為細末姜汁浸飯餅為丸桐子大每服五七十丸生姜湯
下食後小柴胡湯加半夏亦可

白朮丸 治痰濕咳嗽脉緩面黃肢體沉重嗜卧不收腹脹而食
不消局方中防已丸亦可

南星壹兩 半夏壹兩 白朮壹兩

右為細末湯浸飯餅為丸如桐子大每服五七十丸生姜湯

下食後

天麻丸 治氣痰咳嗽脉澀面白氣上喘促洒淅寒熱悲愁不

南星壹兩 半夏壹兩 桑白皮貳兩

右為細末湯浸餅為丸桐子大每服三十九人參生薑湯下食後局方中桔梗湯亦可

姜 治寒痰咳嗽肺沉面色黧黑小便急痛足寒而逆心多恐怖

南星洗 半夏洗各壹兩官桂壹兩去麋皮

右為細末餅為丸桐子大每服三十九生薑湯下食後局方中胡椒理中丸仲景吳茱萸湯亦可

如心下痞悶者加枳實五錢

如身熱甚者加黃連五錢

如體重加茯苓白朮各壹兩

如氣逆上者加苦葶藶五錢

如氣促者加人參桔梗各五錢

如浮腫加郁李仁杏仁各五錢

如大便秘加大黃五錢

如痰而不能食者大棗壹兩下之

如痰而不能食者厚朴湯主之

夏月嗽而發寒熱者謂熱嗽

小柴胡湯三兩 加石膏柒分

知母叁分

冬月嗽而發寒熱者謂之寒嗽

小青龍湯加杏仁

水 治有痰而吐利不止甚則嘔而欲吐利下而不能

本方風痰羈絆脾胃之間

半夏壹兩天南星壹兩

天麻半兩寒水石壹兩

石陸兩 一方改寒水石為輕粉少許

右為末滴水為丸桐子大每服百丸先沸漿水內下藥煮令
浮為度漉出生姜湯下食前

吐論

吐論并

猪苓湯

木香散

厚朴丸

貝在機要中

青鎖丸

治上焦吐頭發痛而有汗脉弦

柴胡壹兩 黃芩半兩 甘草五分 半夏壹兩青黛貳分
人參五分

木湯

治胃中虛損及痰吐者

半夏翅兩 白朮壹兩 芎藭半兩 木香 炙甘草各壹分
茯苓貳分

右為末每服二錢生姜湯調下食前

藥方

治吐食而脉弦者 肝乘於脾而吐乃由脾胃虛宜

治風安脾

半夏兩 檳榔貳分 枳實半兩

右為末薑汁浸餅為丸桐子大生姜湯下小兒另丸

藥方

治中焦吐食由食積與寒氣相假故吐而痛

半夏翅壹兩 代赭石半兩 縮砂仁貳分 烏梅去核壹分 杏仁去皮尖壹分

丁香 檳榔各貳分 沉香 木香 白朮各壹分

橘皮伍分 肉苳蔻 巴豆霜各半分

右為末入巴豆霜令勻醋糊為丸桐子大每服二十丸食後
小量湯下

治嘔而吐食謂待實繫強是以腹中痛當和之

名可實于夏湯

丁香 俗名 丁香 俗名 半夏 麴 白朮 五斤 檳榔 一斤

茯苓 五斤 炙甘草 四斤

一處末濃煎為藥生薑湯調下一二錢

熱論

病在表而熱者謂之表熱無表而熱者謂之裏熱有暴熱者病在心肺有積熱者病在腎肝治暴熱者局方雄黃解毒丸積熱者局方妙香丸暴熱心肺上喘者謂之高喘木香金鈴散主之上焦熱而煩者大黃散主之藏府秘者牛黃散主之有焦熱而無他證者括便湯主之有病久憔悴發熱者所謂之五藏毒以此熱之膏煎之 巨自虛煩腸癖下血皆蒸勞也治法宜以血氣之熱能自 謂不治而治也錢氏地黃丸主之

大黃 一斤 金鈴子 一斤 小香 參斤 輕粉 少許 朴消 一斤

右為末每服三四錢水煎食後微利則已
則已
右為末每服三四錢水煎食後微利則已

大黃散治上焦虛煩燥熱不能睡卧

梔子仁 大黃 蔚金 各半 甘草 一分半

右為末每服三四錢水煎食後微利則已

治上焦熱藏府秘結

大黃 壹兩 白牽牛 頭末五斤

右為細末有厥冷用酒調下二錢無厥冷而手足煩者蜜湯

方在檢要中

麻黃羌活湯

麻黃羌活湯

麻黃桂枝湯

前數方具在機要中

治瘧身熱目痛執多寒少脉長睡卧不安先以大柴胡湯之微利為度如下過餘邪未盡當服此以盡其邪

白芷壹兩 知母壹兩 石膏四兩

右為末水煎

麻黃石膏湯

治瘧先寒後熱執多寒少

桂枝五分 石膏 知母各壹兩 黃芩壹兩

右為末分三服水煎

麻黃芍藥湯

治瘧寒熱汗出不愈知為熱也此陽盛陰

虛當實內治外熱又傳入陰經也

桂枝參分 黃耆 知母 石膏 芍藥各壹兩

右為末水煎

麻黃散

治久瘧不能食中鬱鬱欲吐而不能吐者宜此吐之

雄黃 芫蕪 豨薟豆

右為細末每服半錢酒水調下以吐為度

麻黃杏仁湯

治太陽證夜發晝差

麻黃去節 黃芩去心 炙甘草各半兩 桂枝貳分

右咬咀每服一兩水三盞煎服

眼論

眼論并

散熱散

具在機要中

治眼久病昏澁因發而又不能愈者

防風 羌活 黃芩 黃連 地黃

人參 茯苓各等分

右為細末鼻內噴之

治目發赤腫痛毒氣侵睛服痛

雄黃 乳香 沒藥 各等分

右研細末每服少許鼻內噴之

備藥

薄荷葉 青黛 石膏 芒硝 川芎 各半

細辛 蔓荊子 各二分

右為細末鼻內噴之

治腎水補益及瞳子散

當歸身 黃連 生地黄 各半 酒洗陰乾

炙甘草 柴胡 各二分

右以咀水煎服

治目益腎水

柴胡 羌活 防風 生地黄 芍藥

各等分

右以咀水煎服

治兩額角痛目睛痛時見黑花及目赤腫痛脈弦欲作

內服之於飢飽勞役

炙甘草 當歸 各半

黃芩 四兩 一半剉炒火色一半酒濕過日乾 生地黄 壹兩

右以咀水煎服三錢水一盞半生薑二片棗一枚臨卧熱服

小便不利加茯苓澤瀉各半兩

除有遺翳亦定矣

細辛 半斤 生甘草 壹斤

右劉郊巨大水一大椀文武火熬滿小巾不散為度入土漆
熟蜜少許點用

衄血證

治衄血不止

麥門冬去心

生地黃善分

右煎水煎

治衄血不止大便結燥者下之

大黃伍分芒硝叁分甘草壹分生地黃叁兩枳實壹兩

黃芩壹分黃連壹分

右為細末油煎...溫水下

治衄血不止

生地黃熟地黃 枸杞子熟地黃皮

黃芩善分 黃耆善分 芍藥善分

天門冬

論曰消渴疾二焦受病有上消有中消有腎消上消者一焦受
病又謂之高消肺也多飲水而少食大便如常或小便清利知
其藥一焦也治宜流濕以潤燥消中者胃也濕而飲食多小
便赤黃二焦熱能消穀知其熱在中也治法下至不欲食而愈
腎消者病在下焦初發為膏淋謂淋下如膏油之狀至病成而
面色黧黑形瘦而耳焦小便濁而有脂液治法宜養血以肅清
分其濁而愈也治上焦高消而不欲多食小便清利宜小柴胡
湯或小柴胡加白朮湯或錢氏地骨皮散加芍藥黃耆石膏黃

本桔梗之類是也

人參石膏湯 治高消上焦燥渴不欲多食

人參 半兩 石膏 壹兩 知母 壹分 甘草 四分

右為鹿末水煎食後 東垣加黃芩杏仁

消中者熱在胃而能飲食小便黃赤以此下之不可多利微微利至不欲食而愈

厚朴 製 大黃 四分 枳實 三分

右剉水煎食遠服

黃香湯 治腎消病在下焦初澄小便如膏油之狀

茴香 炒 苦練 炒各等分

右為細末每服二錢溫酒一盞調服食前

淡丹 治手足少陰渴飲不止或心痛者

川烏頭 大者四個 炙甘草 兩 牡蠣 貳兩 蛤粉 六兩 用厚

右為細末醋浸餅少糊為丸桐子大每服十九十五丸新水下心痛者醋湯下其疾立愈

瘡瘍論

論并 內托復則散 當歸黃耆湯 木香散

四珍散 治諸瘡已破未破疥腫痛甚不可忍 效方具在機要中

當歸 黃耆 括萎 木香 黃連 等分

右為末水煎服無時

如痛而大便秘者加大黃

治瘡口痛甚

滑石 壹兩 乳香 沒藥 各伍分 腦子 少許 寒水石 壹兩

研為細末同和勻搽瘡口上

百病藥

清油半斤 當歸半兩 杏仁四十九个 去皮尖 桃柳枝各四十九枝 新綿壹葉

又挑柳枝二大枝用綿裹藥繫於一枝上外一枝攙於鐵器內煎成入黃丹三兩一匙熬水中滴成珠子為度

化腐湯

治瘡難消又不能作膿神效 地骨皮壹兩 木香半兩 川山甲貳分 半炮 麝香壹字

右為細末溫酒調下及治小兒癩瘡後生癰腫以米湯調下

丁香 乳香各壹錢 蟬殼 管仲 紫花地丁各半兩

右為細末溫酒調下

接骨丹

治打撲傷損皮骨者 蘇木壹錢 定粉壹錢 南鵬砂另半兩 錢燒紅醋碎為末各壹分

右為末同勻作一服煎當歸酒調二服痛止勿服

治從高墜下及打撲內損昏冒嗜睡不能飲食此謂血

閉及藏府不通

巴戟去心 當歸 地黃 芍藥 川芎各壹兩

大黃半兩

右為鹿末水煎以利為度

治男婦人陰濕淹瘡

角蟻不計多少 乳香 麝香不計多少

右研為極細末熱動前頭搽藥於瘡口內

治男婦人陰濕淹瘡

五倍子 細研伍分

白礬 壹分 銅綠 少許 輕粉 壹分

乳香 半分

右為極細末洗淨摻之

治項側少陽經中疙瘡不辨肉色不問大小及日月深淺或赤

硬腫疔

生山藥 挺去皮 草麻子 壹个

右搗爛攤在帛上貼之如神

治瘡托裏或已成者速潰

芫荽 新者一个去皮 沒藥 通明者一分 研 金銀花

甘草 生姜 各半兩

右為細末用好無灰酒二升於銀石器內煎至一升分作三

盞二次飲盡病微者只一服如托裏藥不能發散必作瘡者

用此

治疥瘡止瘡痛令瘡不移

蜜陀僧 沒藥 乳香 各壹兩 乾胭脂 壹兩 膩粉 半兩

右為細末次入龍腦少許若多更妙燒葱與羊骨髓生用同

研如泥攤在絳帛上貼

天南星 木 欒梔子 三兩 沒藥 半兩 官桂 壹兩 乳香 半兩

右為細末生薑一片去皮爛研取自然汁入米醋少許白麩

為糊同調攤帛上貼傷處以綿繫之用篦子篦定麻索子纏

待疾瘳

為二焦相火而制湯明煨金鼓木相侮木主生五虫所以

中有虫也因多食熱物生夫熱者濕三焦火熱退則使

木既受毒見五虫不生而自愈矣

木瀉丸

蒼朮去皮澤瀉各兩枳實各兩地榆壹兩皂角子壹兩炮
蒸芫貳兩

右為末燒飯為丸桐子大食前溫水下

白朮

白朮四兩澤瀉貳兩地榆壹兩枳實麩炒皂角子各壹兩

右為細末燒飯為丸桐子大食飲或白湯或溫酒下

五倍子散

五倍子散治小兒脫肛
地榆各等分

右為細末每服半錢一錢米飲調下空心

虛損證

論與

- 四君子湯
- 八物湯
- 牛膝丸
- 八味丸
- 和胃丸

在錢要中

人參黃耆湯

人參貳分黃耆參分白朮壹分陳皮去白甘草半分炙
當歸貳分茯苓壹分

右以咀水煎空心熱服胃熱不能食者加姜棗煎

益氣丸

益氣丸治語言多預氣懶語補上益氣
麥門冬去心人參各貳分橘皮去白桔梗
炙甘草各半分
五味子壹分去子

右為極細末水浸油餅為丸如雞頭仁大每服一九細嚼津

唾嚥下

瀉痢證

瀉而惡風增寒是太陰傳少陰也若用除濕白朮茯苓
芍藥加官桂破血黃連也大腸經氣不宣通宜加檳榔
木香上焦不和治以生薑橘皮中焦不和治以芍藥當歸茯苓
官桂下焦不和寒微以輕執藥熱甚以重寒藥如大便虛滑以
不愈太陰傳少陰為痢為賊邪宜以厚朴枳實湯治之

白朮 芍藥 茯苓各等分

右為末水煎

如發熱或惡熱或腹不痛而脉疾加黃芩為主

如未見膿血而惡寒乃太陰而傳少陰加黃連為主桂枝佐之

如腹痛甚者加當歸倍芍藥

如見白膿加黃芩為主

如見血加黃連為主桂枝當歸佐之

後重者治腎洩久不愈脉沉細無力者効

破故紙炒 肉苁蓉酒裹煨各等分

右為末棗肉為丸桐子大米飲下空心

瀉血痢久不止腹中不痛不裏急後重

青皮 槐花 荆芥穗各等分

右為末水煎空心熱服

治膿血痢無度小便不通腹中痛

當歸壹分 甘草壹分 芍藥壹分 青皮壹分 槐花壹分

生地黃壹分半或二分酒浸陰乾

右為末水煎食前溫服

如後重加木香檳榔各二分澤瀉半錢 如小便利去澤瀉

水腫證

如水腫因以氣為腫者加橘皮

如因以濕為腫者前防已黃耆湯調五苓散方在活人

如因熱為腫者八正散方在寶鑑中

如以熱燥於肺為腫者乃絕水之源也當清肺除燥水自生矣

於梔子豉湯中加黃芩

如熱在下焦陰消使氣不得化者當益陰而陽氣自化黃蘗內

加黃連是也

如鼓脹之病治之以雞矢醴酒調服

如水脹之病當開鬼門決潔淨府也

白茯苓湯主之

白茯苓 澤瀉各貳兩 郁里仁伍分

右以咀作一服水一椀煎至一半入生姜自然汁服無時後用

白朮丸

白朮 澤瀉各等分

右為細末煎服或為丸煎茯苓湯下之未治之法黃耆為藥建中之類以調養之忌房室魚酒等物

補實子治水氣鼓脹潔淨府

褚實子 一斗五升熬成膏 白丁香壹兩 茯苓貳兩

右為末用褚實子膏為丸桐子大服至小便清利及腹脹消為度後服中治調養藥疎管其中五補七宣即其理也

治水腫腹大如鼓或遍身皆腫

白牽牛頭末 木香各等分

右為細末每用二錢以酒調服一對批開搽藥在內燒動

心食之如食左腰子塌左臂右腰子塌右臂如腫不能全去
於腹通臍塗目遂細末飲甘草水少許其腫盡去

胎產證

論在機要中 大抵外和於榮衛內則調於清便同傷寒壞證
治之

加減四物湯

方在元戎中

黃龍湯

一黃散

方在機要中

地黃當歸湯

治婦人有孕胎痛

當歸 壹兩

熟地黃 貳兩

右為末作一服水三升煎至一升半去滓頓服之

半夏湯

治胎乾而不能產

半夏 麴

壹兩半

大黃 五兩

桂枝 各半

桃仁 叁

不微炒

右為末先服四物湯一二服次服半夏湯生薑二片水煎

續命湯

秦艽湯

方在機要中

如產後風氣在表面目四肢浮腫宜局方中七聖丸白湯下
日加以利為度

如浮腫漆喘嗽加木香檳榔倍之謂氣多也

如浮腫加頭痛昏冒加羌活川芎謂風多也

如只浮腫依七聖丸本方服之

三之一湯

治產後虛勞雖日久而脈盛浮疾

柴胡 八分

黃芩

人參

半夏 洗

甘草 炒

川芎

芍藥

熟地黃

當歸 各叁分

右為末依小柴胡湯煎服

如日久虛勞微有寒熱脈沉而遲宜柴胡四物湯方在元戎

八分散

方在機要中

十全散

方在發明中

血風湯

方在機要中

補氣湯 治產後頭痛血虛氣弱痰厥皆能頭痛

羌活 川芎 防風 附子炒 熟地黄各壹兩

白芷壹兩 石膏貳兩 細辛貳分 當歸五分 甘草五分炒

蒼朮去粗皮壹兩

右為鹿末每服一兩水煎服無時

如有汗者是氣弱頭痛也前方中加芍藥三兩桂一兩半生

姜煎

如痰癱頭痛加半夏三兩茯苓一兩半生薑煎

如執頭痛復加白芷三兩石膏三兩知母一兩半

如寒厥頭痛加天麻二兩附子一兩半生薑煎

荆芥散 治產後血風眩暈精神昏昧

荆芥穗壹兩 參朮 桃仁伍分炒去皮尖

右為細末溫水調下三錢

如微喘加杏仁炒去皮尖 甘草炒二分半 同煎

芎藭散 治產前證胎不動如重物所墜腹冷如冰

川芎 當歸各等分

右為細末水煎食前大溫服

養血湯 治婦人胎漏下血及因事下血

枳殼麩炒去穢 黃芩各半 白朮壹兩

右為末水煎食前溫服

養血湯 具在元戎方中

養血湯 治帶下赤者熱入小腸白者熱入大腸皆任脉經虛也

苦練碎酒 茴香炒 當歸各等分

右為細末酒糊為丸每服五十九丸空心溫酒下

氣散治喘痛

山梔子 熟地黄 茯苓 細辛 桂

川芎 各等分

衣為末羊脂煎服

小兒四時用藥

假令春分前風寒也宜用地黃當歸羌活防風或地黃丸瀉青丸相間服是也

春分後風熱也羌活防風黃芩或瀉青丸用導赤散下之

立夏之後熱也宜三黃丸導赤散

夏至後濕熱也導赤散瀉黃散合而服之或黃芩甘草白木茯苓之類為勝濕去熱也

立秋後宜益黃散陳皮厚朴人參木香之類是也

秋分之後瀉白散

立冬之後地黃丸主之謂腎不受瀉也

黃耆 一兩 人參 貳分 地骨皮 伍分 桑白皮 貳分 甘草 貳分 半

右吹咀水煎放溫時時溫清

人參利肺散 治身熱痰嗽膏膈不利宜下膈去熱

人參 半兩 荆芥穗 兩 大黃 貳分

右為細末水前調檳榔木香細末半錢輕粉一字乳後服如身熱潮熱宜服清涼飲子去大黃三服之後一兩日却入

大黃服之令疎利則愈不可使先動藏府

雜方

牛乳煎散 見血無寒衄血吐血下血弱血皆為熱

生地黃 熟地黃 枸杞子 地骨皮 黃耆

天門冬 芍藥 甘草 黃芩 各等分

右咬咀每服一兩水一盞半煎至一大盞去滓溫服
如脈微身涼惡風每一兩加桂半錢吐血者多有此證

黑地黃丸 治男子婦人面無血色食少嗜卧肢躄困倦

蒼朮 壹斤 熟乾地黃 半斤 乾姜 炮夏月五分冬月壹兩春秋各半

右為末水煎麵糊為丸桐子大每服五十九溫水下食遠

下散 治蝎螫痛

半夏 壹字生用 為細末 雄黃 壹字另研 巴豆 一個去皮研如泥

右三味同和勻上之

治小便淋瀝經驗 **葵根丸**

葵花根洗淨剉水煎三五沸服之立愈

失笑散 治腎腫

荆芥穗 壹兩 朴硝 貳兩

右為鹿末羅薑蔥同煎湯淋洗

百杯丸 治酒停腹中膈氣痞滿面色黃黑將成癰疾飲食不進

日漸肌瘦如飲酒者先收此藥百杯不醉亦無諸痰

生薑 壹斤去皮切片子 薑或兩掩一宿無乾 紅皮 叁兩去白粉

廣茂 炮叁 乾姜 叁兩 益智仁 叁斤 丁香 五十 甘草 貳斤

京三稜 炮縮砂仁 木香 茴香 炒各 白豆蔻仁 叁斤

右為細末煉蜜為丸每一兩作五丸朱砂為衣生薑湯下細嚼無時

治風秘大便不通

枳殼 心炒去穢 川芎 各等分 蘇仁 壹斤

七、... 枳實丸 枳子 大泄水下食前

治大頭病如神

黑烏蛇 白化蛇 去頭尾酒浸 雄黃 貳分 大黃 兩

右為極細末每服一二錢白湯調下無時

治脾胃虛弱六脈俱弦而指下虛食少而渴不

止心下痞腹中或痛或窄狹如繩束之急小便不利大便不

調精神短少此藥專治大渴不止腹中窄狹而食減少神効

白茯苓 陳皮 乾生姜 人參 各壹兩

如脉弦或腹中急甚加甘草 叁分 秋減姜一半

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一九白湯煎化下食空

凡藏府之秘不可一例治療有虛秘有實秘胃實而秘

者能飲食小便赤當以麻仁丸七宣丸之類主之胃虛而秘

者不能飲食小便清利此湯主之 實秘物也虛秘氣也

厚朴 姜製 白朮 五兩 半夏 兩 枳實 肆兩 陳皮 叁兩

甘草 叁兩

右為塵末水煎溫服空心

治咽喉

青黛 白殭蚕 甘草 馬牙硝 板藍根

紫荷車 薄荷 桔梗 各等分

右為細末乾糝煉蜜為丸噲化亦可

脈中小有力浮則似止管中元氣不及也

人參 麥門冬 沉香 白豆蔻 五味子

益智 丁香 川芎 之類是也

治以服熱藥過多小便不利諸藥莫能効者或積下悶

痛不可忍

黃連炒

黃蘗炒

甘草各等分

右咬咀水煎溫飲之食前

如晝不通加知母 此藥助陰使氣得化則通矣

治痢

天實大蒲心腎高起氣塞不通者為結也

蟾酥

麝香

輕粉

巴豆

少許另研

右再研至細以兒孩兒乳汁為丸黍米大二粒姜湯下無時

治痢法

石硫黃

榆白皮各壹兩

白芨

白欬各半兩

右為用之

海蛤丸 治癩疔

海蛤醋碎

當歸

海金沙

膩粉

硃砂各壹分

海藻

粉霜各半兩

水蛭干一

青黛

滑石

乳香各壹分

朱砂式分

地膽貳拾壹分

右為細末鹽煮麵糊為丸如小豆大朱砂為衣每服十九煎

燈草湯空心服之小便下冷濃惡物乃効却以黃連紫荷車

板藍根各一錢煎湯漱口以救牙齒去板藍根加管仲

補黃心 治時疾不相染

雄黃壹兩

赤小豆炒

丹參

右為細末煉蜜為丸桐子大每日空心以溫水下五丸可與

病同床傳着衣服亦不相染矣

神效散 治吃逆

柿錢

丁香

人參

各等分

右為細末水煎食後服

毒以男子婦人及小兒一切積毒不解停飲作毒
壅熱咽吐不利口乾多渴伏暑毒困悶霍亂不寧或山嵐瘴
氣及食毒酒毒吐逆不定遊風雅毒迷感昏困不省人事虛
煩發燥赤目口瘡善解四時傷寒之疾驅散瘟疫毒邪之氣
及四方人不伏水土一切諸毒並皆解之常服此藥補真益
氣化毒除風神効不可細述

滑石 黃芩 貫衆 茯苓 山梔子

乾姜 草龍膽 大豆 青黛 甘草

薄荷 寒水石 各壹兩 益智仁 縮砂仁

大黃 山豆根 生地黄 桔梗 百藥煎

紫荷車 粉花巨粉 馬勃 板藍根 黃藥子 各半兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸新汲水化下細嚼

或噙化亦得小兒半丸如婦人血暈不省生薑薄荷水磨下

一丸

養粉丸 治白淫夢泄遺精及滑出而不收

黃蘗 壹斤新瓦上燒令通赤炒勻 真蛤粉 壹斤

右為細末滴水丸桐子大每服一百丸空心溫酒下陽盛毒

陰故精油也黃蘗降火蛤粉鹹而補腎陰也

治身痛

露蜂房 小椒 去目炒各等分

右為鹿末煎漱禁語言

取膏

風化 二灰壹兩 花鹹 半兩

右為細末一吹如天色冷湯用

治漏頭 連時

石膏 黍粘子炒

右為末 茶酒調下 食前

乾洗頭藥

什松 百藥煎 五倍子 川芎 薄荷

香白芷 草烏頭 藿香 毛香

右為末 摻髮上 揉搓木梳梳之

出刀青方

水蛭 雞子一枚 搗開小頭內水蛭以皮兒蓋合封者

直至水蛭食盡雞青乾死自死

眼稍赤藥

黃連 白礬 銅綠 蜜陀僧 輕粉 少許

右為極細末 少少貼之

又方

黃丹 白礬 各等分

右為末 如前方用

紫古家



