

三因極一病證方論

七



三因極一病諸方論卷之十

勞瘵叙論



夫骨蒸瘵端復連死非勞瘵瘵蟲瘵毒瘵熱瘵冷瘵食瘵鬼瘵等皆曰瘵死者以瘵者注也病自上注下与前人相似故曰瘵其變有二十二種或三十六種或九十九種大略令人宗批益汗夢與鬼交遺泄白濁髮乾而登或腹中有塊或腦後兩邊有小結核連復數个或聚或散沉二默二咳嗽痰涎或咯膿血如肺痿肺癰狀或復下利羸瘦困乏不自勝持積月累年以至於死二後乃瘵易傍人乃至滅門者是也更有蠶尸遺尸宗尸喪尸尸注等謂之五尸及大小附着等證不的知其所苦无處不惡乃挾諸鬼邪而害人以三因收之內非七情所并外非四氣所襲若麗乎不內外因素其證多端瘵變汗移難以推測故自古及今愈此病者十不得一所謂狸骨癩肝天靈蓋銅鑑鼻徒有其說未嘗見效唯膏肓俞俞崔氏穴若蘭早灸之可否幾半晚既不濟也近集得經效方有人服之頗驗錄于左餘缺以俟明哲

勞瘵諸證

病者增寒發熱自汗面白目乾口苦精神不守恐畏不能獨卧其傳在肝病者增寒發熱面黑鼻燥忽二喜忘大便苦難或後泄瀉口瘡其傳在心病者增寒發熱面青唇黃舌本強不能噦飲食无味四肢羸瘦吐涎沫傳在脾病者增寒發熱面赤鼻白乾燥毛折咯嗽喘急時吐白涎或有血線傳在肺病者增寒發熱面黃目輪焦枯肝骨痠痛小便白濁遺溼骨痛傳在腎所謂勞瘵者二十四種隨證皆可考尋毛折髮焦肌膏甲錯其蒸在皮外人竟熱自反惡寒身振瞶劇其蒸在皮髮焦鼻衄或後尿血其蒸在血身熱煩燥痛如針刺其蒸在

在肺爪甲焦枯眼昏兩脇急痛其蒸在筋脈齒黑燥大打酸
疼其蒸在骨背脊疼痛筋骨酸痲其蒸在髓頭眩熱悶口吐
濁涎眼多眵淚其蒸在腦男子失精女子白淫其蒸在玉房
下寒下熱中脫與膈中煩悶其蒸在三焦小便赤黃頻澀如
膏其蒸在膀胱溼道不均或秘或泄腹中雷鳴其蒸在小腸
大腹隱痛右鼻乾疼其蒸在大腸口鼻乾燥腹脹睡卧不安
白汗出其蒸在胃口舌口耳聾脇下痛其蒸在膽裏急後重肛
門澀閉其蒸在回腸小腹疝痛筋脈縱緩陰器自強其蒸在
宗筋眼昏淚下時復眩暈燥怒不常其蒸在肝舌焦黑氣短
煩悶洒二浙二其蒸在心唇乾口瘡胃腹脹悶畏食不食其
蒸在脾咳嗽喘滿咯痰吐血舌嘶音遠其蒸在肺耳輪焦枯
脚氣酸疼起居不得其蒸在腎情想不寧无故精泄白物綿
綿而下其蒸在右腎心主胞絡心曠噎窒空攻擊疼痛恍仰煩
寃其蒸在耳諸證雖曰不同其根多有由醫其心肺治之不
可不絕其根也

勞瘵治法

取勞瘵方

青桑枝

柳枝

石榴皮

桃枝

梅枝各七莖每
長四寸許

青蒿一小握

右用童子小便一升半葱白七莖去頭葉煎及一半去
滓別入安息香阿魏各一分再煎至一盞濾去滓調辰
砂末半錢攪擲末一分麝香一字分作二服調下五更
初一服五更三點時一服至巳牌時必取下虫色紅者
可投青者不治見有所下即進軟粥飯溫煖將息不可
用性及食生冷毒物合時須擇良日不得令猫犬孝服
噉惡婦人見

神授散 治諸傳尸勞氣殺虫方得之於清源郡王府

川椒二斤 去子并

右為末每服一錢空心米湯調下通痺重悶少頃如不能禁即以酒糊為丸如梧子大空心服三五十九昔人嘗與病勞婦人交婦人死遂得疾遇一異人云勞氣已入臟遂與此方令急服二斤其病當去如其言服之幾尺大便出一虫狀如蛇自此遂安續有人服之獲安濟者多矣

潤神散 治勞瘵增元發熱口乾咽燥自汗疲劇煩躁

人參 黃芪 甘草炙 桔梗

麥門冬各半

右為末每服二錢水一盞煎七分不以時自汗入淡竹葉小麥同煎

溫金散 治積勞咳嗽喘悶咯痰中有血

甘藷生用 黃芩 桑白皮 防風去叉

杏仁去皮尖以五味各一兩 麥門冬去心 茯苓半兩

右為末每服一大錢水一盞入黃臘一片如指大同煎至七分食後服

蛤蚧散 治積勞久咳失音方

蛤蚧一兩 去口足 阿膠炒

熟地黃 麥門冬去心 細辛去苗 甘草炙

右為末蜜丸如皂子大每服一九含化不拘時候服

香九 治傳屍骨蒸瘧瘧肺痿疰鬼氣心忪霍亂時氣瘴癘等方方見九病門

此方盛行於世大能去氣却邪凡病自內作不曉其名者服之皆效最治氣厥氣不和吐利禁衛關格甚有

神效

疰疔中惡證治

病者卒心腹脹滿吐利不行如乾霍亂狀世所謂衝惡是也
由人精神不全心志多恐遂為邪鬼所擊或復附着沉二擊
默寢言語謬誤罵詈訐露人事不避談嫌口中好言未然
禍福及至其時髮無失人有起心已知其肇登高涉險如
履平地或悲泣呻吟不欲見人其狀万端如醉如狂不可禁
卒此皆鬼神及諸精魅附着惑人或復觸犯忌諱土地神靈
為其所作非有真寔但隨方俗攷驗治之方列于后

○**調湯**治卒中惡感忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絕无復竟知或
已死絕口噤不開去齒下湯或湯入口不下者分病久髮
左右捉踏肩引之藥下後取尺一升須臾立蘇

麻黃二兩 桂枝二兩 甘草一兩 杏仁一百粒

右剉散每服四大錢水一盞半煎七分去滓不以時服
○**桃奴圓**治心氣虛有恍惚不常言語錯亂尸疰客忤厥夢
不祥小兒驚癇並宜服之

桃奴七枚 辰砂研 桃仁十四枚 牛黃一分 龍腦一分
雄黃一分 安息香一分 琥珀一分 黑犀一分

右為細末和入煎膏丸如雞頭大陰乾密罈封閉淨室
安置煎入參湯研下一丸食後煖卧服

○**蘇合香圓**治卒中惡忤疰方見丸痛門

毒毒叙論

江南閩中山間人以蛇虺蜈蚣蠍蟻等百蟲同器畜之

使其自相食啖勝者為靈以事之取其毒雜以菜菓飲食之類以害人妄意要福以圖富貴人或中之證狀万端廣如治百蠱說或年歲聞人多死又有人家香火伏事如家先者亦謂之蠱能病人世謂之蠱注以姓類屬五音謂之五蠱此皆邊鄙邪僻之地多有此事中都則蔑聞也

中蠱證治

夫中蠱毒者令人心腹絞痛如有物嚙吐下血皆如爛肉若不即治食入五臟即死驗之令病唾水沉即是蠱有人行蠱毒以病人若欲知其姓名者以敗鼓皮燒作末飲服方寸匕須臾自呼蠱家姓名可語令呼喚將去則愈治之亦有方

丹砂圓治蠱毒從酒食中着者方端午日合

辰砂別研 雄黃別研 赤脚蜈蚣 續隨子酪一

麝香一分

右為末糯米飲為丸如雞頭大若竟中毒即以酒下一丸蛇蝎所螫醋磨塗之

凡例

凡諸蠱毒是假毒藥以投之知時宜煮大豆甘草蒼尾汁飲之通除諸藥毒

藥灰散治中諸物毒

晉礬 建茶 各等分

右同為末每服三錢新汲水調下得吐即效未知再作

解毒圓治誤食毒草并百物毒救人於必死

板藍根 四兩 乾薑 一兩 青黛研 甘草 生各

右為末蜜丸梧子大以青黛別為衣如稍竟精神恍惚惡心即是誤中諸毒急取藥十五丸爛嚼用新水送下即解此方傳得異人京師陳道士用水浸炊餅為丸

妙如常服可三五九大醉暑毒

凡中毒嘔吐黑口不醒嚼白礬味甘者皆中毒無疑

凡始食中毒及蛇虫咬癩疽癩作即服此今毒

氣不聚

上好青黛 雄黃 各等分

右為細末新汲水調下二錢

蛇虫傷治法

白芷散治惡蛇咬傷賴仆不可療者

香白芷

右一味為末水調下頃刻咬處出黃水及腫消皮合

白礬散治蝎螫痛不可忍

白礬

半夏 各等分

右為細末嚴醋調貼之

五絕治法

凡屬寐產乳自然壓溺五者令人卒死謂之五絕

半夏散治屬寐卒死及為墻壁竹木所壓水溺金瘡卒致悶

絕產婦惡血衝心諸暴絕證

半夏 七次湯洗去

右為末每一大且許吹鼻中即活但心頭溫者一日可治

白礬散治產乳血暈悶絕狼狽若口噤則拗開灌之必效

方見婦人門

救自急法

徐二抱解不得截繩上下安被卧之一人以脚踏其兩肩手少挽其髮常弦絃勿縱之一人以手按據膺上數動之一人摩捋臂脛在伸之若已強但漸屈之并按其腹如此一炊頃氣從口出呼吸眼開而猶引按其臍心勿苦勞之須臾可少

桂湯及粥清含之今濡喉漸二能嚥乃稍三止耳內令兩
人以管吹其兩耳弥好此法最善尤不活者自旦至暮虫豸
亦可暮至巨少雜

救急方

以死人安善將手袖掩其口鼻眼上一食頃活眼開仍与批
小便若初竟氣絕而不能言可急劈口開以批小便灌之打
撲悶絕者亦用此

夫壓死折傷心礼法君子守巖窟與堂之戒固无是事然安
車良馬時有足奔輪步砌焮流未免虛舟飄瓦况行商征
賈捕獵與人運涉况多不測尤其其如竟讎加言凶險劫持
打撲金瘡皆致狂六治之不可不急也

雞鳴散治從高墜下及木石所逐凡是傷損血凝積氣絕
欲死并久積瘀血煩躁痰腫叫呼不得並以此藥利去瘀
血即愈此藥能推陳致新方見折傷門

大慈活血散治男子婦人外傷內損狗咬虫傷駝馬撲墜手
足傷折一切疼痛腹中瘀血刺腸築心及左攤右緩走注
疼痛癰腫痔漏婦人冷氣入腹血脉不通產後敗血灌注
四肢吹好腫痛並宜服之

花桑枝細如指大者以炭火煨赤連皮
細墨半斤用酒二兩煎去其渣
赤芍二兩用酒二兩煎去其渣
大黑豆一斤用酒二兩煎去其渣
乳香四兩用酒二兩煎去其渣
右六味為末入乳香膏內和柱三寸下丸如彈子大如

乳香少更入醋糊痛者一服一九輕者半九以无灰酒
一盞乳香一豆大先磨香及以磨藥及煎三五沸臨卧

時溫服必痛效就床卧如欲出汗以衣被覆仍用藥塗
磨損效忌一切動風物應婦人諸疾服者更用當歸末
一錢依法煎服有忌不得服

跌撲

治跌撲脚手胛骨腕折

水腫不拘多少

右於新瓦上熬令香熟勿令太過為末每服一錢執酒
調仍入麝香半錢服折處不可手腫藥行良久竟痛折
處漸痒如蟻啣之遂要人捻揉骨折處相接即用杉木
夾縛兩三日去之骨全矣

花柳

治一切金瘡打撲傷損猫犬咬傷方見失

救急

竈中灰兩石

右以灰堆聚急將溺者埋灰中從頭至足水出壯即活

驚悸證治

夫驚悸与松搏二證不同驚悸則因事有所大驚或問虛響
或見異相登高涉險夢寐不祥驚悸心神氣与涎鬱遂使驚
悸名曰心驚膽寒在心膽經屬不内外因其脉必動松搏則
因汲二富貴戚二貧賤又思所愛遽失所重觸事不意氣鬱
涎聚遂致松搏在心脾經意思所主屬内所因或冒寒暑者濕
室閉諸經令人忽二若有所失恐二如人將捕中腕松搏此
乃外邪非因心病况五飲停蓄閉於中腕最使人松搏治屬
飲家除飲悸与外内因所治各見本門驚悸治方備列于后

溫膽湯

治心膽虛怯觸事易驚或夢寐不祥或異象惑遂致

心驚膽怯氣鬱生涎二与氣搏變生諸證或短氣悸之或

復自汗四肢浮腫飲食无味心虛煩悶坐卧不安

半夏湯

竹茹

枳實 枳殼 橘皮 白

甘草炙 白茯苓半一兩

右為散每服四大錢水一盞半姜五片棗一個煎七分去滓食前服

鎮心丹 大治驚悸方見癰癩門

定志圓 治心驚膽攝方見健忘門

寒水石散 治因驚心氣不行鬱而生涎二結為飲遂為大疾
松栝煇煇不自勝持少小遇驚尤宜服之但中寒者不脛

寒水石煇 滑石水煇各 甘草生一分

右為末每服二錢批則新汲水下快茶則煎姜棗湯下
入龍腦少許尤佳小兒量歲与之

自汗證治

夫自汗多由陽傷風傷暑及喜怒驚恐房室虛勞皆能致之无
問昏醒浸二自出者名曰自汗或睡着汗出即名盜汗或云
寢汗若其飲食勞役負重涉遠登頓疾走因動汗出非自汗
也人之氣血猶陰陽之水火平則寧偏則病陰虛陽必湊故
發熱自汗如水熱自湧陽虛陰必聚故發熱自汗如水溢自
流考其所因風暑涉外喜怒驚恐涉內房室虛勞涉不內外
理亦甚明其間如麻節陽痿脚氣產後等病皆有自汗治之
當推其所因為病源无使温温如經脉別論所載但原其汗
所出處初非自汗證也不可不知

正元散 治下元氣虛膝酸脹滿心脇刺痛泄利嘔吐自汗陽
氣漸微手足厥冷及傷寒陰證霍亂轉筋又下冷利少氣
羸困一切虛寒並宜服之當服助陽消陰正元氣温脾胃
進飲食

人參 白茯苓 白朮略 黃芪一兩
甘草炙 烏藥去木 山藥煇 附子炮

川芎

乾葛 各一兩 桂心

烏頭 各半兩

紅豆炒

乾姜炮

捕皮 各二錢

右為末每服二錢水一盞姜二片棗一個鹽少許煎七分食前冷服白汗加浮麥

汗 治諸虛不足及新病暴虛津液不因體常自汗夜卧

即甚久而不止痛脊枯瘦心忪驚惕氣煩倦

牡蠣米泔浸去

麻黃根

黃芪 各一兩

右為剉散每服二錢水一盞半小麥百餘粒同煎至八分去滓不拘時一方為細末每二錢水三盞葱白三寸

煎一盞半分三服

汗 治榮衛不調夜多盜汗四肢煩疼飲食進退肌瘦

蘇朮二兩

柴胡去土二兩

大鱉甲去殼二兩

黃芩去土二兩

乾漆炒

人參

茯苓

乾葛

川烏炮

玄參 二兩

右為末每服二錢先用小麥三七粒煎湯一盞去麥入藥煎七分食後溫服或臨卧服如久患後亦宜服此以

退其勞倦調理經絡

汗 治傷風自汗 方見傷風門

汗 治傷暑自汗 方見傷暑門

汗 治傷濕自汗 方見傷風濕門

汗

用川芎白芷藥末為末各一分入米粉二分綿裹撲貼上

消渴叙論

夫消渴皆由精血耗津液枯乏引飲所多小便必利復衰

微肌肉脫削拍脈不榮精髓內竭推其所因涉內外与不內

外古方不原病本但出禁忌似屬不內外因藥中乃用麻黃

遠志得非內外兼非况心虛煩悶最能發渴風寒暑濕病冷作熱入于腎經引水自救皆明文也不知其因施治錯謬醫之大患不可不知

三消脉證

渴病有三曰消渴消中消腎消渴屬心故煩心致心火散蔓渴而引飲經云脉軟散者當病消渴諸脉軟散皆氣實血虛也消中屬脾瘴熱成則為消中消中復有二有寒中熱中強中寒中陰勝陽鬱又必為熱中經云脉洪大陰不足陽有餘則為熱中多食數溲為消中陰狂具盛不交精泄則為強中二三消病至強中不亦危矣消腎屬腎盛壯之時不自謹措快情縱慾極意房中長腎衰多服丹石真氣既喪石氣孤立唇口乾焦精溢自曳不飲而利經云腎實則消不渴而小便自利名曰消腎亦曰內消

三消治法

真珠圓治心虛煩悶或外傷暑熱內積熱煩酣飲過多皆致煩渴口乾舌燥引飲无度小便或利或不利

知母一法川連一法苦參一法玄參一法无

鐵胤粉一分牡蛎一分朱砂一分麥門冬去心

天花粉各半金箔一法銀箔一法白扁

右為末煉蜜入生括樓根汁少許丸如櫻子大用金銀箔為衣每服二十九至三十九先用括樓根汁下一服次用麥門冬煎水下病退日貳服忌炙博酒色次投從

從表圓

從表酒浸 磁石 熟地黃 山茱萸
桂心 山藥 牛膝 茯苓

黃芪益湯浸澤瀉

鹿茸去毛切遠志去心

石斛

覆盆子

五味子

車前

破故紙炒

巴戟酒浸

兔絲子

酒浸龍骨

杜仲

去皮切

附子

炮去脂

右為末蜜丸如梧子大每服五十九粒空腹米飲下

姜湯散治消中多因外傷燥熱內積憂思喜啖鹹食及麪致脾胃乾燥飲食倍常不為肌膚大便反堅小便无度

生薑切粉

右投勻每服二錢匕長流水調下齒浮是效次投猪肚

丸補

附子猪肚丸

附子

檳榔

鯨甲

當歸

知母

木香

川練剉

秦艽去苗

大黃

龍脛草

白芍藥

破故紙酒浸

枳殼各半

右為末分作三分將二分入猪肚內縫定令蜜酒三升

童子小便五升同入砂鉢內熬乾爛研細入一分末同

搜搗為圓如梧子大每服五十九粒温酒米湯下

烏金散治熱中多因外傷燥熱內用意傷脾飲啖肥膩熱積

留胃中致多食數減小便過於所飲亦有不渴而飲食自消

為小便者

黃丹

細墨

石研勻每服二錢食後先用水一兩梳漱口持心中熱

索水便以冷水調下

爛金圓治熱中消渴上後將補精血去諸虛解勞倦去骨節

間熱寧心強志安神定魄固臟腑進飲食免生瘡瘍

大猪肚一个 黄連二兩 蜜 生薑酪二

先將猪肚淨洗復以葱麩醋椒等洗控乾用藥同水酒入銀石器內煮半日漉出黃連洗去蜜酒令尽判研為細末再用酒調成膏入先洗猪肚內縫定入銀石器內水熬爛研為膏搜下項藥

人參二兩 黃芪四兩 五味子 山藥

杜仲去皮剉碎 山茱萸 石斛

車前子 鳖甲醋炙 熟地黄 新蓮肉去皮

當歸各一兩 槐角子炒 白茯苓 磁石煅研各

川芎一兩 沉香半兩 麝香分入 兔絲子酒浸

右為末用猪肚膏搜和得所膏少則添熟蜜杵數千下元如梧子大食前温酒糯米湯任下五十九一法有白木二兩陽起石一兩

石子煮爛治強中多因耽嗜色慾及快意飲食或服丹真氣死脫藥氣陰發致煩渴引水飲食倍常淫器常與不交精出故中焦虛注於下焦三消之中最為難治

蒼朮 石膏各三兩 人參 伏神

栝樓根 磁石煅研 知母 乾葛

黃芩 甘草各二兩

右為劑散每用水三盞腰子一个去胎膜黑豆一合煮至盡半去腰子大豆入藥四錢煎至七分去滓食後服下焦執則夜間服渴止勿服次投補藥

黃連猪肚圓治強中消渴服石子蒼朮湯差退可服此補養

黃連去麩 梁米 栝樓根 伏神各四

知母 麥門冬去心

右為末用大猪肚洗極淨入藥末縫定饒中炊極爛取

出藥別研指鹿為膏搜前藥得所乾即添少蜜拌數千
下丸如梧子大飲服五十九食前服

胡桃圓治消腎亦云內消多因快精縱慾極意房中年少權
不能房多服丹石及失志傷腎遂致唇口乾焦精溢自出
或小便赤黃五色浮濁大便燥實小便大利而不甚渴

白茯苓 胡桃肉湯洗淨附子
右等分為末蜜丸如梧子大米飲下三五十丸或為散
以米飲調下食前服

古瓦湯治消腎消中飲水无度小便頻數
乾葛 天花粉 人參 雞脂雞脂
右為末每服二大錢用多年古瓦碎煎湯調下不以
時候服

鹿茸圓治失志傷腎二虛消渴小便无度
鹿茸去毛切 麥門冬去心 熟地黃 黃芪
雞脂雞脂 茯苓 山茱萸 破故紙炒
牛膝酒浸 五味子鹽 茯苓 玄參
地骨皮酒 人參三分

遠志圓治心腎虛煩渴引飲胃間短氣小便自利白濁泄遺
人參 白茯苓 川姜炮 牡蛎煅
遠志心 射干

右為末用茯苓一兩酒製成膏圓如梧子大每服五十
圓糯米湯下

六神湯治三消渴疾

蓮房 乾葛 批把藥去毛 甘草
栝樓根 黃芪去

右為劑散每服四錢水一盞煎七分去滓溫服小便不利加茯苓

五寶湯治三消渴病或飲多利少或不飲自利肌膚瘦削四肢倦怠常服補虛止渴利

童根桑白皮未多成者去

茯苓

人參

麥門冬法

乾葛

乾山藥

桂心略一

甘草半兩

玄兔丹治三消渴利初藥常服其精止白濁延年

兔絲子補腎通氣

白茯苓

乾蓮肉各二兩

五味子酒浸別為末

右為末別碾乾山藥末六兩將所浸酒餘者添酒煮糊搜和得所搗數千杵丸如梧子大每服五十九丸米湯下空心食前服

梅核湯治三消渴利神

糯谷蒸炒作

桑根白皮細切

右每用科一兩許水一大椀煮取半椀渴則飲不拘時

猪苓湯治三消渴疾

大棗四十九枚

新蓮肉四枚

西木香一分

甘草二兩炙

右用雄猪脊骨一尺二寸同前藥用水五椀於銀石器煮去肉骨濃滓取汁一椀空腹任意呷服忌生冷鹽葷等物以滓減去甘草一半焙乾為末米湯調服不以時

八味圓治消渴小便多以飲水一斗利小便反倍之

澤瀉

茯苓

牡丹皮略二

桂心

附子諸去皮臍

山藥各四

熟地黄一兩

右為末蜜丸梧子大每服五十九米湯下食前服

大補丸 治渴欲飲水不止

文蛤 五倍子 最能回津 本草在條 其文 其根 其刺 其骨 皆自生之

右一味為末以水飲任調方寸匕不以時

烏梅木瓜湯 治酒食過度中焦蘊熱煩渴枯燥小便併多遂

成消中兼治瘴渴所謂瘴渴者北人往南方瘴地多有此疾

木瓜乾 烏梅去仁 麥蘖炒 甘草

草蘖去殼各

右剉散每服四大錢水盞半姜五片煎七分去滓不以

羊乳圓 治嶺南山瘴風熱毒氣入腎中變寒熱脚弱虛滿而渴

黃連不以 生括樓根汁 生地黄取汁

羊乳 一斤 羊乳 牛乳 各 八 升 得

右以三汁攪和為丸如梧子大每服米飲下三五十元

一法 濃煮小麥粥飲下

渴疾 有人依山山谷方單用兔絲子酒浸透直尔抄服甚効亦

有將黃芪陸兩苜草一两作六一湯服之尤效又渴入病

愈須預防發癰疽宜服**忍冬圓**

忍冬草不以多 少 根 莖 花 葉 皆 可 用 一 名 老 翁 鬚 一 名 蜜 蟻 花 一 名 金 銀 花 以 洗 淨 用 之

右以米麴酒於瓶內浸以糠火煨一宿取出曬乾入甘

草少許為末即以所浸酒為糊元如梧子大每服五十

元至百丸酒飲任下不以時此藥不特治癰亦能止渴

并五痔諸漏

安門參煎 治諸渴

麥門冬洗 人參 黃芪略 白茯苓

山茱萸 山藥 桂心各半 黑豆二合 煮去 皮 別 研

右為末地黃自然汁二椀牛乳二盞熬為膏元姑梧子

大麥煎飲下五十九

治消渴

五靈脂半兩黑豆半兩生

右為末煎冬瓜子湯調下二錢

治三消渴疾神妙

牡蛎粉 苦參 蜜陀僧 知母

水銀以白蠟半分為 括樓根半兩 黃丹一兩 同研

右為末男子用雌猪肚一个女人用雄猪肚一个入藥

在內以線縫定用繩縛在新塼上別用生括樓根半斤

切碎同煮早晨至午時取藥出不用括樓根只爛研猪

肚和藥為丸如梧子大每服二十粒食前米湯下日二

服十日可去病根

料簡

或云渴无外所因且傷天脉浮而渴屬太陽有汗而渴屬陽
明自利而渴屬少陰及陽毒傷天倍重燥盛而渴其者有中
暑伏挑累取不差而渴者有瘡毒氣染天熱而渴者得非外
因治法如傷天論中不復繁引酒煮黃連元治中暑熱渴最
妙又有婦人產後去血過多而渴者名曰血渴非三消類不
可不審

五疸叙論

古方叙五種黃病者即黃汗黃疸谷疸酒疸女勞疸是也觀
別錄則不止於斯然疸與黃其實一病古今立名異耳黃汗
者以胃為脾表屬陽明陽明畜熱喜自汗汗出因入水中熱
必鬱故汗黃也黃疸者比由暴熱用冷水洗浴熱留胃中所
致以與諸疸不同故用黃字目之又云因食生黃氣上薰
所致人或疑其不然古賢豈妄語也必有之矣谷疸者由失

脫發壯大食傷胃氣衝鬱所致酒疸者以酒能發百脉挾由
大醉當風入水所致女勞疸者由大熱交接竟入水水流濕
入于脾因腎氣虛勝以所勝剋入致腎氣上行故有額黑身
黃之證世謂脾腎病者即此證也其間兼渴與腹脹者並難
治發於陰必嘔發於陽則振寒面微熱由本於胃氣鬱發土
色上行然發於脾則為肉疸發於腎則為黑疸若論所因外
則風寒暑濕內則喜怒憂驚酒食房勞三因悉備世醫獨麗
於傷寒論中不亦以兵卒者宜識之

黃汗證治

病者身體腫發熱不得狀如風水汗出染衣色正黃如糜汁
名曰黃汗

桂枝湯治黃汗身腫汗出出已輒輕久久必身
腫骨中痛腰以下无汗腰腹疼痛如有物在皮中刺者不

能食煩燥小便不利

桂枝去皮

芍藥各二兩

甘草二兩炙

黃芪五兩

右為劉散每服四錢水盞半姜五片棗三枚煎七分去
滓溫服仍飲熱粥以助藥力溫覆取微汗未汗又服

黃芪湯

治身體洪腫發熱自汗汗如藥汁其脉沉

黃芪五兩

芍藥三兩

桂心三兩

右為劉散每服四錢苦酒三合水一盞半煎至七分去
滓不以時服初服當心煩以苦酒阻故也至六七日稍
自愈

黃疸證治

病者發黃身面眼悉黃如金色小便如濃菹葉汁名曰黃疸
茵陳蒿湯治傷寒瘀血不解發於表發為黃疸其脉浮緊
者以汗解之

赤黃 二兩去節

右一味以醇酒五升煮取二升每服一盞溫服汗出愈秋冬用酒煮春夏用水煮

谷疸證治

病者發黃內挾食則腹滿眩暈谷氣不消胃中苦濁二氣下流小便不通陰被其水挾流膀胱身體尺黃名曰谷疸

治胃毒挾挾氣濁食谷不消大小便不利脹滿不

下食跌陽脈緊而數亦治因勞發挾 鬱發黃

苦參 二兩 龍膽草 二兩 梔子 半斤 人參 三分

右為末以猪膽汁入執蜜少許搜和丸如梧子大以大麥煮飲下五十九日三不知稍加之

酒疸證治 方見霍亂門

酒疸證治

五疸唯酒疸變證最多蓋酒之為物隨人性量不同有盈

而而不醉者有濡吻而輒亂者以醞釀而成有大熱毒滲

入百脈為病則不特發黃溢于皮膚實為黑為腫流于清氣

道中則眼黃鼻腫二不同故方論中酒疸外有內疸黑

疸癯疸勞溢乃至今人恍惚失常等數證不同

治酒疸發黃身无挾靖言了了腹滿欲嘔心煩足

熱或成癢癢心中博懷其脉沈弦或緊細

半夏 龍膽 茯苓 白朮 各二兩 前胡

枳殼 枳實 甘草 炙 大戟 炒 醋 黃芩

茵陳 當歸 各一兩

右為劉散每服四大錢水一盞半姜三片煎七分去

滓空腹服

二石散 治肉疸飲少小便多如白泔色因酒所致其脉

疑水石_{服水}白石脂_服

括樓根

桂心各一分

兔絲子_{別研}知母各二分

右為末每服二錢大麥飲調下

白朮湯

治酒疸因下後久久為黑疸目青面黑心中如啖蒜

蒸狀大便正黑皮膚赤仁其脉微而數

桂心

白朮各一兩

京歧

乾薑

杏仁

甘草各半兩

右為劉散每服四錢水一盞煎七分去滓食前服

白朮湯

治酒疸發黃結飲癖在心胃間心下縱橫堅滿

骨肉沉重逆害飲食小便赤黃此由本虛飲食生冷與脾

胃痰結所致其脉弦滿方

白朮

茯苓各二兩

黃芩

茵陳各一兩

枳實

甘草

杏仁_{湯洗七次}半夏_{湯洗七次}

右劉散每服四大錢水一盞姜七片煎七分去滓食前

人參飲

治飲酒房勞酒入百脉令人恍惚失常

人參

白芍藥

括樓根

枳殼

茯苓

酸棗仁

甘草

熟地黄

右劉散每服四大錢水一盞煎七分去滓食後焙服

神散

治酒毒不散發黃久久浸漬流入清氣道中宜引藥

內鼻滴出黃水愈

苦瓠子_{去皮}苦胡方子_{去皮}黃黍米_{三升}安息香_{二兩}

右為末以一字搗入鼻中滴出黃水一二升忌勿吹或

過多即以黍稷燒灰麝香末各少許搗鼻立止

女勞疸證治

夫女勞輸瀉必動三焦上焦屬心中焦屬脾下焦屬腎動則

熱二則慾火熾因入水中中焦執鬱故能發黃下焦氣勝故額黑上焦走血隨痰執行大便溏黑貴勝人有男女同室而浴者多成此病攝生之人不可不知

滑石 治女勞疸身黃額黑日晡發熱惡寒小腹急足下熱其脈弦緊腹或滿者難治

滑石

石膏

右為細末以大麥粥飲調下二錢
七日三四小便極利則差

消石 治女勞疸其腹腫脹膀胱急欲作水狀大便黑者非水其脈滑腹滿者難治

消石

礬石

右為末每服一大錢大麥汁調下日三重衣覆取汁病隨大小便出大便黑小便黃是効

雜考疸證治

五疸之外有時行瘡瘧風寒暑濕等證疸不同

茵陳 治時行病急黃及瘡瘧疫疔

茵陳

梔子

芒消

杏仁

豆豉

拍山

雷甲

巴豆

大黃

右為末錫飴為丸如梧子大每服二九飲下吐利為效
末知加一丸竟體氣有異急服之妙

文國回 治因傷風痰熱不解發於風疸身皆黃小便或黃或白赤熱好卧不欲動其脈陽浮陰弱

生艾

生艾

大黃

黃連

括樓根

凝水石

苦參

葶藶

右為末以艾膏和得所丸如梧子大初服六九漸加

至二千九有熱加苦參湯加枯樓根小便澁加葶藶小
便多加凝水石小便白加黃連大便澁加大黃所加並
倍之

五苓散治伏暑鬱發黃小便不利煩渴用茵陳煎湯調下
方見傷暑門

養心湯治濕痺始得之一身尺痠發熱面色黑黃七八
日後壯熱二在裏有血下如猪肝狀小腹滿者急下之身
目尺黃小便不利其脈沉細

礬石湯
滑石絡手

右為末每服一大錢大麥粥飲調下日三服食則便利
如血者效或汗愈

苦參散治人元漸熱熱振寒皮膚癢塵出小便赤澁大便時
秘氣无異食飲不妨服諸湯不除因為久黃方

苦參 黃連 瓜蒂 黃蘗去皮

大黃一錢 葶藶炒半兩

右為細末每服一大錢飲調服當吐下隨時消息加減
小半量湯治黃疸小便色不異欲自利腹滿而喘者不可除
熱二去必瘥

半夏湯洗七次

右為剉散每服二錢水一盞姜
十片煎七分去滓不拘時

養心湯治五疸胸弱心松口淡耳響
微寒發熱氣急小便白濁當作虛
勞治之方見傷暑門

三因極一病證方論卷之十

三因極一病證方論卷之十一

脹滿論

內經有鼓脹大素依谷脹治法由而不論其所因原其脹滿之端皆皆與大腸二陽明為二陰之長大抵陰為之上陽為之下或減氣不平勝於乘故此或相因致陰陽失序遂有止證假如然傷肝射射脾二氣止必脹於胃名曰勝剋或怒乘肺二氣不傳必脹於大吐名曰乘剋夏思聚結不臟氣鬱或頭或面推其感涉表裏心之皆內所因或冒氣暑風濕隨其經絡傳至陽明致脹滿也此皆內所因飲食飢飽生冷甜膩聚結不散或作熱塊腦脹也此皆外所因當知脹滿該法二因須以人迎氣口分其內外氣虛實審其溫利詳而調之無失機要亦勿刻意睡心應疾坐受困臨不可不謹

張滿論治

論云五積之中心腹脹滿五積以五臟氣不平肝為肥氣心為伏氣脾為息氣腎為逆氣腎為逆氣皆聚結於塊隨所注所積之目分推而究之皆喜怒憂思乘剋相因相感如前等類從五積法治之可也但內所因不特成積即為脹滿亦宜隨其臟氣而平治之所謂虛其神瀉太過不致以

經調治

天竺黃治肝氣不平勝心於脾一鬱不行結聚涎沫閉於厥氣鬱氣不舒胃則脹滿其脈弦遲故知中虛胃冷脹滿服此可下氣進食

半夏 桂心 附子 人參

甘草 厚朴 當歸 茯苓

枳實 芍藥 黃芩 白朮 白芍 白朮 白朮

古為物... 藥... 五斤... 二個... 直七

分去滓食前服

千金湯 治夏月熱症如脾肺氣凝陽不能止大腸與胃氣不平脹滿衝數食不相下脉虛而緊瀉

附子一枚 當歸四兩 厚朴二兩 人參

橘皮 白朮藥 甘草二兩 乾姜一兩

川椒炒 白朮二兩

右為散每服四大錢水二盞煎七分去滓食前服

附子湯 治夏月熱症如脾肺氣凝陽不能止大腸與胃氣不平脹滿衝數食不相下脉虛而緊瀉
主傳導使諸陽不舒反逆為逆中宗氣脹腸鳴勿痛胃弱逆病嘔吐不食

附子一枚 半夏二兩 硬米各二升

甘草二兩 乾姜二兩

右剉散每服四大錢水二盞煎七分去滓食前服

七物湯 治腹滿發熱以陽井陰則陽亢而陰虛陽盛生外熱陰虛生內熱熱必消浮則為虛數則為抑陰虛不能宣導飲食如故致脹滿為抑脹

厚朴二兩 甘草二兩 大黃二兩 枳實二兩

桂心一分

右剉散每服四大錢水二盞煎七分去滓食前服

上證多則服嘔者如半真一分刺者去大黃宗多加生

姜十片煎

宣泄散 治腹虛脹滿潮熱不寒服諸藥不差惡風不能

宣泄散二散 鼓脹

右研細令勻每服一大錢濃煎薄荷湯調下酒服尤

佳不以時一法有乾漆炒煙出量虛實用之虛

霍亂治虛人老人飲淡生公多致腹脹心下痞滿有妨飲食或刺痛泄利氣痞悶

厚朴去皺

甘草剉

生姜洗切

青州棗切各

右上一二件搗令得所方入生姜又杵令勻取出同棗焙令溫二微燥却入鍋內慢火炒至紫色又焙乾為細末每服一大錢擦生薑少許泚湯點空腹服以知為度氣味殊美兼能愈疾又易修合

料簡

上件諸方如內因與不內外因皆可選用若外因傷風傷寒傳至陽明經腹脹可以大承氣杏子湯等各見本門濕脹木附湯加茯苓桂心氣脹黃丸九皆良藥也更有脚氣支滿脾瀉泄及五疸石水婦人腸覃血臃或單二腹脹之證治之各見本門孝者當審詳為治无致混濫失其機要也

霍亂論

夫霍亂之病為卒病之最者以人起居无亡擗霍之間便至變亂悶絕不救甚為可畏痼深履危不足以諭有生之流不可不達其日趣蓋其病因涉於內外不內外二種具備而讀傷寒論者見有本是霍亂今是傷寒之說便謂霍亂即傷寒殊不知因傷寒致霍亂只是外因一證尔况風暑濕皆有此證殊不知喜怒哀思飲食飢飽皆能致霍亂之證故不得不備論

霍亂諸證

霍亂者心腹卒痛嘔吐下利增忒發熱頭痛眩暈先心痛則先吐先膈痛則先下心腹俱痛吐利並作其則轉筋入腹則斃霍亂惡證无越於斯此蓋陰陽反戾清濁相干陽氣暴升陰氣頓墜陰陽痞隔上下奔逸扶救不先治之唯宜溫煖更

詳別三因隨內外以調之不尔則坐視困路也

霍亂外因證治

諸惡風惡寒有汗无汗重着煩毒皆外所因蓋傷風則惡風有汗傷寒則惡寒无汗冒濕則重着傷暑則熱煩此由常論揮霍之間倉卒不辨遂致錯誤亂經反常爲害不淺豈止本爲霍亂今是傷寒而已哉當隨外所因治之乃可

理中湯治霍亂吐下脹滿食不消心腹痛

人參

乾姜

白朮

甘草

右爲散每服四大錢水一盞煎七分去滓食前遠行防霍亂煉蜜如丸如梧子大每服三五丸如作散每服方寸匕酒調下亦得若轉筋者如石膏煨二三兩若臍上築者腎氣動也去朮加桂心四兩腎惡燥故去朮恐作奔豚故加桂吐多者去朮加生姜二兩下多者復用

朮擇者加茯苓二兩湯欲得水加大人豆煎成四兩半腹中加人參合煎成四兩半若寒者加乾姜合煎成四兩半腹滿者去朮加附子服藥後食頃食熱粥一盃微自溫覆勿發揭衣被噦則加丁香吐利止身體痛不休者審其元因以和解之如初因傷風用桂枝之類所謂治有本也

外因科簡

凡外所因必自經絡傳入臟腑須以脈證推其所因隨經調之惡寒善寒假如傷寒在太陰經當用四逆湯少陰經當用附子麻黃湯厥陰經當用理中湯若在太陽經還用麻黃湯陽明經養胃湯少陽經小柴胡湯風暑濕亦然風則桂枝湯暑則香薷飲五苓散濕則苓朮湯陰虛湯皆可於諸門隨證換用不復繫引

霍亂內因證治

諸大喜傷心則氣散大怒傷肝則氣激憂傷肺則氣鬱思傷脾則氣結恐傷腎則氣如驚傷膽則氣劫。賊氣染毒聚結涎飲痞滿不通遂致瀉悶逆其勝後必作吐利當辨其所以因也。

大氣場 治喜怒憂心悲恐驚七氣鬱發致五臟互相刑克陰陽反戾揮霍入亂吐利交作寒熱眩暈痞滿咽塞。

半夏湯洗 厚朴製 桂心各二兩 茯苓

白芍藥各四兩 紫蘇葉 檳皮各二兩 人參一兩

右為劉散每服四錢水盞半姜七片棗一個煎七分去滓空腹服。

胃氣心 治憂思過度脾肺氣閉聚結涎飲留滯腸胃氣鬱於陰凝於陽陰陽反戾吐利交作四肢厥冷頭目眩暈或嘔或泄兼治老人胃弱大便反秘姪娘藥阻全不納食。

流黃各一兩 白茯苓各一兩 人參各一兩 石膏各一兩

右置米生薑自然汁釋放餅糊為丸如梧子大每服五十丸至二百丸空腹米湯入少生薑汁下。

霍亂 治霍亂不常憂思兼并致氣鬱結留積涎飲留腹滿悶或積疔痛攢突發吐利交作。

附子各一兩 半夏湯洗 滑石
成煉鐘乳各半兩 辰砂三分 別研

右為末每服一錢水二盞姜七片藿香芍三葉心葉半匙煎七分食前冷服小便不利加大通茅根煎。

不內外因證治

霍亂合陰寒於陰乳酪水陸跡品脯醢雜食快飲未將水強逆自酒醲醲積於下即以胃為五藏海因脾氣以運行胃統。

脾氣停滯氣不行必致發變成吐利當從不外內因

治之
不調衝胃氣急忽作霍亂吐利并作心腹絞痛腸胃纏刺
茯苓不勝

蓬朮制 二枝 各一兩 同以
青皮 二兩 炒 阿魏 小 胡椒 一兩

古為末醋化阿魏入陳米粉為糊丸如子大礬末為
衣每瓶一百丸至二百丸煎生薑甘草口下

治霍亂吐利為佳
胡桐子 糖 薑薑 二十七粒

古為末煎木瓜湯調下

調下散 治之如霍亂吐利 服取效 方見九 通門

霍亂凡例

轉筋者以陽明養宗筋屬胃與大腸今暴吐津液頭上
火瀉四氣以類七情飲食甜膩攻閉諸脈枯削於筋宗筋失
養必致坐急無則外瀉之暴為難治

大心散 治霍亂吐下不止已至轉筋入腹則絕

大心散 一兩 只姜更 糖湯 尚香 一分 甘草 一
右為散每服四大錢水一盞許三斤紫蘇十葉煎七
分去滓分前服

煩渴者以陰陽反疾清濁相干清氣干濁水與谷併小便秘
溢既走津液腎必枯燥引水自救煩渴必矣

茯苓 八兩 澤瀉 四兩 甘草 一 桂心 二兩

白朮 三兩

右為劉散每服四大錢水一盞姜三片煎七分去滓食
前服一方有小麥五兩

水瀉治伏暑傷冷一熱不調霍亂吐利口乾煩渴

黃丹一分 巴豆一分 去皮

右同研勻用黃蠟一分 蛤粉一分 作一和為丸如梧子大每服五丸
以水浸少頃別以新汲水吞下不以時候

乾霍亂者忽然心腹脹滿絞刺相疼壅毒煩冤欲吐不吐欲
利不利狀若神靈所附頃刻之間便致悶絕亦涉三因或臟
虛或腸胃素實故吐利不行

霍亂治乾霍亂及壅毒宿食不消積冷心腹煩痛鬼氣

至鹹湯二升熱飲一升刺口令吐宿食使不吐更服
吐訖復飲三吐乃止此法大勝諸治俗人以為田舍淺近
鄙而不用守死而已凡有此病即先用之

嘔吐 叙論

嘔吐由本於胃然所因亦多端故有寒熱飲食血氣之不同
皆使人嘔吐據論云氣在上憂氣在下 一氣並爭但出不
入此亦 一室未為尺論且如氣屬內因則有七種不同云涉
外因則六淫分異皆作逆但鬱于胃則致嘔豈拘于憂氣而
已况有宿食不消中滿溢出五飲聚結隨氣番吐相冷積熱
及瘀血凝閉更有二佳漏氣走嘔吐利吐血皆有此證不可
不詳辨也

寒嘔 證治

病者胃中安心下淡二四肢厥冷食即嘔吐名曰寒嘔或因
傷食多致傷胃氣或因病曾汗下致胃氣虛冷之所為也

四逆湯 治寒嘔脈弱小便復利身有微熱見厥者難治

甘草一分 乾姜一分 附子一分 去皮

右爲判散每服二錢重水二盞煎七分去滓食前溫服
生硫黃丸治同前

硫黃不拘多少

右一味以柳木槌研細生薑汁搗成餅糊爲丸如梧子
大每服五十九米湯下食前

靈液丸治胃中虛寒氣積痰飲食飲不化噫醋停酸大便反
堅心胃脹滿惡聞食氣婦人妊娠惡阻嘔吐不納食者

硫黃打碎 附子去皮臍心 藜蘆各 桑葉且 細辛用酒

右爲末生薑自然汁煮麩糊爲丸如梧桐子大每服五
十九米湯下食前服

吐瀉證

病者胃中熱吐煩躁聚結涎沫食入即吐名曰吐瀉或因胃
熱伏暑及傷天伐熱不勝濕拒之類皆吐之所爲也

小兒吐瀉治吐瀉方見後

治法口吐者宜發汗今陽微隔氣虛脈 乃數二爲客
吐不能消合胃中虛冷故吐當作氣嘔治之不可用此

痰瀉證治

病者素盛入之腹中漣漣有聲食入即嘔食與飲並出名曰
痰瀉或因氣鬱結於胃口或因酒食甜冷聚飲之所爲也

大半夏湯治心氣不行鬱生涎飲聚結不散心下痞鞭腸中

漣漣有聲食入即吐

半夏二升 白朮一升 茯苓一升 甘草一升

右分四服每服半二盞蜜一錢重和水搗令勻入藥煎
至六分去滓溫服一法有生薑七片 治法曰嘔家先

湯今反不渴者以心下有支飲故也治屬支飲

茯苓澤瀉湯治同前

食嘔證治

病者胃脘脹則四肢厥冷悲聞食臭食入即嘔朝食暮吐暮食朝吐者胃食嘔由飲食傷脾胃宿食不化之所為也

大寒治飲食傷脾胃宿食不化朝食暮吐暮食朝吐上氣復逆即取冷押三焦不調及胃虛寒氣在下寒氣在下二氣並爭吐出不入嘔不得食

厚朴去皮

生姜略切

肥棗三兩 白朮

通草切

人參

川芎

橘皮

當歸

五味子

藿香

甘草炙

細細無名 黃芪略

右五藥切每服四錢水一盞半姜三片棗一個煎七分

去滓於上服服或為細末米湯調下亦快

痛嘔證

人參

白朮

乾姜切

甘草炙

青皮

陳皮切

右為散每服四大錢水一盞半煎七分去滓大便秘

入大黃基子大兩枚

血嘔證治

病者心下痛食入即嘔血隨食出者曰血嘔此由瘀蓄於血聚積胃口之所為也

痰飲治寒熱兼其氣攻血以溫通胃管受調血凝嘔吐食飲及痰熱中脘宿食

半夏切 茯苓

熟地黃切 橘皮

細辛

人參

芍藥

川芎

桂枝

桔梗

甘草炙

上為散每服四大錢水二盞姜七片煎七分去滓空
腹服有寒熱煩渴口瘡者去橘皮細辛加前胡知母腹
冷下利者去地黃入桂心此胃中虛熱大便燥小便澀
去地黃加大黃一兩八錢黃芩六錢

此治三焦虛損或上下發泄吐衄血虛從三焦起或因
此相驚或因酒數悉主之

常湯

乾姜白

熟地黃

藥皮

小麥

於羊角

阿膠炒各二

白朮

芍藥

黃芩

甘草炙

右為散每服三錢水二盞竹茹一握如指大煎至八
分去滓入伏龍肝半錢匕頭髮灰半錢匕蒲黃半錢匕
又煎至七分不以時服

氣逆證治

病者心膈懸滿氣逆於會膈食入即嘔二尺為快名曰氣嘔胃
若不足腸明入胃於足今隨氣上逆結於胃口故生嘔病也

宋東人治氣嘔管痛不納食嘔吐涎沫頭疼

吳茱萸

湯洗數次

人參二兩

右為散每服四大錢水一盞半姜五片棗二枚煎七

分不以時服

此治心下虛痛飲食不入時嘔吐酸二短氣或大病
將起不復胃氣无以養日漸羸弱

薑

人參

桂心

桔梗

白朮

茯苓

枇杷葉去心

半夏

用

右為散每服五錢水二盞入炒姜絲一分煎七分去

滓食前服

漏氣證治

病者身背皆熱肘臂疼痛其氣不續腸間厭悶食入則先吐而後下名曰漏氣此因上焦傷風開其腠理上焦之氣慄悍滑疾遇開即出經氣失道邪氣以着故有是證

治上焦伏熱腹滿不欲食食入胃未定汗出身背皆熱或食入先吐而後下名曰漏氣

- 麥門冬去心 生薑根 竹茹 白朮各五兩
- 甘草炙 茯苓各二兩 橘皮 人參
- 萎蕤各二兩

右為散每服四大錢水一盞半薑五片陳米一撮煎七分去滓熱服

走哺證治

病者下焦實熱大小便不通氣逆不續嘔逆不禁名曰走哺此下焦氣起於胃下口別入回腸注於膀胱并與胃傳糟粕而下大腸令大小便不通故知下焦實熱之所為也

治下焦伏熱氣逆不續大小便不通嘔吐不禁名曰走哺

- 人參 萎蕤 黃芩 知母
- 茯苓各三兩 白朮 橘皮 生薑根
- 梔子仁略半 石膏一兩

右為散每服四錢水一盞半煎七分去滓溫服

治乾嘔而不逆熱少冷多好唾白沫清涎噫氣吞酸此由上焦閉塞

- 厚朴姜製 白茯苓 川芎 白朮
- 玄參 吳茱萸 桔梗 附子炮
- 人參 橘皮各三分

古方爲劉散每服四大錢水一盞半薑五片煎七分去滓
溫服

白濁治嘔吐病在膈上思火者是欲解也

猪苓去皮 白茯苓 白朮各等分

右三味末之飲服方寸匕

凡例

凡先嘔却渴者此爲欲解先渴却嘔者爲水停心此屬飲家
又復寒差後餘熱在胃嘔者依傷寒後證治之若脚弱脾疼
而嘔者此物氣內攻宜急依脚氣門治之更有婦人懷娠惡
阻嘔吐亦各從其門類或中毒而嘔以解毒藥解之酒家嘔
吐當以解醒藥解之其如三焦漏氣走哺嘔吐則見上門泄
利則見下利門各從其類也 然嘔不得輕用利藥唯腹滿
則視其前後向部不利利之即愈

噦逆論證

噦者噦逆也古方則謂之噦比吐利後多作噦大率胃實即
噦胃虛則噦此由胃中虛膈上熱故噦或至八九声相連收
氣不回至於驚人者若傷寒久病得此甚惡內經所謂環府
者是也楊上善釋云津洩者知監帶之漏声嘶者知琴瑟之
絕業發者知槁木之摧卒此三物衰壞之徵以比噦故知是
病深之候也亦有噦而心下堅痞眩悸者以膈間有聚水所
爲其他病則各有治法

噦治法

治噦逆嘔噦胃中不和每噦至八九声相連
收氣不回至於驚人

橘皮二兩 人參一兩 甘草二兩

右爲劉散每服四錢水一盞半竹茹一小塊薑五片棗

二一个煎七分去滓不以時服

羌活散止咳逆

羌活 附子炮裂 茴香炒 枳實炒 木香

乾姜炮 丁香略

右為末每服二錢水七分盪鹽少許煎數沸空腹服

丁香散治宿食吐噎

丁香 柿蒂各一分 甘草炙 良薑各半分

古為末用熱湯點二錢乘熱服不以時

又一方產後吐逆方見婦人門

醋酒證治

夫中脘有飲則噯有宿食則酸食後意醋吞酸皆宿食證俗謂之噯酸是也

治中脘有宿食留飲酸噯心痛口吐清水噯宿腐

神麴炒 二兩 蒼朮炒 三兩 陳皮一兩

右為末生薑汁別煮神麴末為丸如梧子大每服二

五小丸姜湯下不以時服

治宿食留飲積中脘噯臭吞酸心腹疼痛并療中

虛積聚乃腸腑殄泄赤白痢下

丁香 巴豆法 縮砂仁 胡椒

烏梅去核

右件各一伯个為細末炒餅糊為丸如黍且大每服五

七丸熱水下食後臨卧服

穀氣叙論

夫穀氣之邪從口入者宿食也蓋五味入口所以滋養五臟得之則生不得則死傷之則反為生害所以宿食為雜病之先若五臟不立食不輸化血凝氣滯起皆宿食所為

此治之當量其氣賦將虛實淺深為治養生方戒不得用巴豆
令服青木香丸如有食癖非巴豆不克所謂接乎可接之亦
无接

二精微安日如心之其痛頭痛惡寒小腹脹滿下利不欲
食心腹脹滿氣若胃實執食尸留滯其脈數而滑宜下
之無宜而口便其脈浮大按之反濇尺中亦微濇宜溫藥消

藥水煎法

治氣脹聚結微嘔胃物悶痛或吐酸水食後噯
作生嘔氣脹泄瀉及四肢浮腫

木香

胡砂

蓬朮

胡椒

半夏

乾漆

縮砂仁

桂心

青皮

附子

丁香

白姜

右為末黃丸如梧子大每服三五丸生薑搗皮湯下
空心服

治虛中積冷氣弱有傷不能傳化心下堅痛
五瀉虛脹心腹以痛噎宿腐氣及霍亂吐瀉或復瀉瀉久
利赤白膿血相雜米谷不消久病形羸面黃口淡不能飲
食

肉豆蔻

川姜

百草霜

木香

黃沙

京三棱

巴豆

杏仁

酒

油

丁香

右除巴豆杏仁外並為細末次下巴豆杏仁等和勻先
將油煎蠟令熟化傾在藥末內和成劑入臼內研十餘
下旋丸如黍豆大每服三五丸熱水吞下食後臨臥
小兒如黍米大式三五丸

泄瀉叙論

方書所載瀉利為經中所謂洞泄殄泄溇泄溢泄濡泄水穀注下等其實一也仍所因有內外不外內外差殊耳經云寒甚為泄春傷風夏食泄論云熱濕之氣久客腸胃滑而利下皆外所因喜則散怒則激憂則聚驚則動氣膈絕精神奪散必致溇泄皆內所因其如飲食生冷勞逸所傷此不外因以此類推隨證主治則不失其病源也

虛寒泄瀉治法

危篤禁法

附子炮去

肉苁蓉炮

白茯苓各一 桂心

白姜炮

木香炮

丁香一分

右為末糊丸如梧子大米湯下五十九空腹服

香薷丸

治腸胃虛冷泄瀉注下无度脾虛氣閉不進飲食

厚朴炮

白朮三兩

茵香炮

陳皮各三兩

訶子炮

赤石脂炮

右為末麩糊丸如梧子大空腹米湯下五十九常服暖腸胃

建脾丸

治虛勞羸瘦身重胃冷飲食不消洩瀉不止或作滯

下火交五生無臭

鍾乳粉

赤石脂炮

乾姜炮

茯苓炮

石斛炮

五味子

桂心

澤瀉

桑寄生

遠志去心 人參

栝子仁

當歸

酸石榴皮

龍骨炮

天雄炮

牡蠣粉

白頭翁去苗

甘草炙

右為末蜜丸梧子大米湯下三十九空腹服

者

宜靈分藥散

治臍疝虛寒泄瀉腹極及婦人產後痢瀉危篤

藿香葉

草薺薤仁

青皮

各四兩

甘草炙

丁香各半兩

肉苳蔻

烏梅

各半兩

右判散每服四分水二盞糯米一撮煎七分去滓空腹服

羊肉補丸

治脾胃不和進飲食減胸虛滑老人虛人尤

宜服之

精羊肉

一斤半

白姜

各一兩

川椒

去目炒

肉苳蔻

各一分

附子

炮

神麴

半兩

右等分煮粟米飲為丸如梧子大食前米湯下五十九

川椒丸

治臍疝泄瀉无度

黃連

烏梅肉

當歸

川椒

桂心

乾姜

炮各等分

右等末糊丸梧子大每服三五十九丸米湯空腹服

實熱泄瀉治法

小兒氣湯

治不利證證者有燥屎故也

方見傷寒論

夫泄瀉

却用大黃者乃通因通明也非大實熱勿輕用之

冷熱泄瀉治法

獨活散

治久患脾泄瀉

生薑四兩

黃連一兩

右皆判如豆大一處煖火炒令姜焦赤去姜根黃連為細末每服一分空腹酒茶清調下或將姜為末米飲調

治白痢亦效

連理散

治五泄或青白五色種種下休作死時

烏頭

厚朴

甘草

乾姜

各

右為末每服二錢水一盞薑三片煎七分執服

止瀉神效

川烏頭各半片 半夏各半片 蒼朮各半片 米

右為末姜汁糊為丸梧子大空腹米湯下五六十九

疝已也 治脾胃受濕泄利不止及米食不化小兒疳痢並宜

服之

黃連 吳茱萸 湯洗 白芍藥 各等分

右三味同炒為細末米糊丸如梧子大每服二五十九

米湯空腹下小兒量与之

治泄不止食積不消癥瘕塊結大腸滑泄瀉毒下

利脹痛鳴

交藤炒二兩 神麩炒二兩 茴香炒 草果剉用

厚朴剉 乾姜炮 陳皮各一兩 木香生半兩

甘草炙半兩

右為末脾泄瀉訶子湯入鹽調下二錢脾虛腸鳴氣不

和瀉不止炒姜酒調下常服鹽湯點空心食前服

料簡

凡治瀉須先理中焦如理中湯丸等是也次即分利水谷如

五苓散等是也治中不效然後斷下即用禹餘糧赤石脂等

是也玉機真藏論云五虛死謂脈細皮寒少氣前後泄利飲

食不入得此必死其有生者漿粥入胃注止則活也又金

匱云六腑氣絕於外者手足寒上氣肺縮五臟氣絕於內者

下利不禁其甚者手足不仁脈沉弦者為下空脈大者為未止

泄利手足厥冷无脈灸之不溫脈不還微喘者死有微熱而

渴自汗脈或微或數弱法並當自愈或脈沉遲而面少赤身

微熱發汗出而解必微惡所以然者以其面戴陽下虛故

也泄利後腹脹滿自疼者泄濕其裏宜四逆湯後攻其
表宜桂枝湯上件金匱節文雖於三因不甚分明其脈不可
不究既用四逆治瀉寒不妨用桂枝加附子治傷風木附加
桂治傷濕五苓散治傷暑皆可類推 又古方泄利与帶下
共爲一門千金又以省食不消在泄則類明類濕泄後多難
明不可甄別也

三因極一病證方論卷之十一



